




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
730/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
730/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
730/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
730/A

L. xxxiii. Bau

G, 14
8

730
A


1/2
x

First printer at
Offenbach - Germany

One of the earliest
books printed here -

First known to
Cotton was a
folio in 1609

Index
Medical
Machines K
33 B



CASPARI

68495

BAVHINI

D. ANATOM.

ET BOTAN. BA-
filiensis Ord.

DE COMPOSITIONE
Medicamentorum.

SIVE

MEDICAMENTORVM
componendorum ratio & methodus,

in

PRÆLECTIONIB.
PUB.

Proposita.



OFFENBACHÏ

Ysenburgicorum, Typis Conradi Nebenii, Impensis here-
dum Nicolai Bassai. Anno 1610.





MAGNIFICI, STRENI, AN-
tiquiss. Equest. Prosapia Herois

DOMINI

PREBERNI A GYLDEN-

Stern, Toparchæ in Wosburgh, Se-

reniss. Regis Daniæ à consil.

Arcis Bouling &c. Præ-
fidis,

F I L I I S

D. D. D.

CANVTO, HILARIO ET HENRI-
co Gyldenstern Fratribus Germanis,

Hunc

De Compos. Medicament. Librum

CASPAR. BAVHINVS
Observ. & amoris monum.

ΤΥΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΩ

Offert.




EPISTOLA DEDICAT.

QUAMVIS naturā MEDICA-
MENTA vulgo parata esse
voluerit, NOBILISS. IUVENE-
NES, inuentu sane facilia, ac
sine impendio, quibus tamen Arcades
vti recusarunt: nihilominus, Medicinæ
inventionem sibi Ægyptii tribuerunt:
alii vero per Arabum, Babylonis & A-
pollinis filium, repertam volunt: ipsam
vero Herbariam & Medicamentariam,
à Chirone, Saturni & Phylliræ filio, (Pli-
nio libr. 7. cap. 56. referente) inuen-
tam statuunt. Verum etsi ex quolibet
horto, aut herba, aut frutex in medicum
vsum peti possit: vt recte idem lib. 23. c.
24. scripserit, Medicamenta ex longin-
quis regionibus minime petenda esse, eo
quod nobis non gignantur, imo nec In-
dis, vel Arabibus, alioquin, addit, non
venderent: non tamen semper simpli-
cissi.

Dedicatoria.

cissimorum nostris in regionibus nato-
rum usu, scopum assequimur, idcirco &
mixtis ac compositis, propter rationes,
quas infra capite vndecimo, expressi-
mus, vti cogimur. Quis vero primus
Medicamentorum missionem veram
proposuerit, dubium est, laus tamen
maxima Mithridati Ponti regi debe-
tur, qui in Herbarum usu diligentissi-
mus, & primus Antidota inuenisse cre-
ditur: hinc Plinius lib. 25. cap. 2. Mithri-
dates maximus sua ætate regum, omni-
um ante se genitorum diligentissimum
vitæ fuisse, argumētis præterquam fama
intelligitur: vni ei excogitatum quoti-
die venenum bibere, præsumptis re-
mediis, vt consuetudine ipsa innoxium
fieret: primo inuenta genera Antidoti,
ex quibus vnum etiam nomen eius reti-
net. Quare ad illum Asclepiadis me-
dendi arte clari volumina composita ex-
tant, eum sollicitatus ex vrbe Roma præ-
cepta pro se mitteret: hæc Plinius. Et-
iamnum hodie in frequenti usu habetur
ipsius Antidotus, qua nunc vulgo cōtra
pestem præseruationis causa vtuntur, ab
ipso contra venena inuenta, & à Plinio
[?] 3 lib.



I N D E X

Capitulum.

P roæmium de Medicina diuisione.	
Medicamenti notatio & definitio. Cap. 1.	
Medicamentorum species.	2.
Medicamentorum materia unde sumantur.	3.
Medicamentorum facultas quid.	4.
Facultatum numerus.	5.
Facultatum ordines seu gradus.	6.
Medicamentorum differentia, & quæ prima vel secunda sint qualitatatis.	7.
Medicamenta tertia qualitatatis.	8.
Medicamenta quarta qualitatatis.	10.
Medicamenta cur componantur.	10.
Medicamentorum compositorum differentia.	
II.	
De suppositoriis & nodulis.	13.
De Clysteribus.	14.
De iniectionibus in aures.	15.
De iniectionibus in penem seu vrethram.	16.
De iniectionibus in uterum.	17.
De Syrupis.	18.
De saccharo eiusque differentiis.	19.
De Iulepis.	20.
	De

I N D E X.

De Apoſematis ſive Decoctis & de ſimplicibus ſingulis partibus conuenientibus.	20.
De potionibus purgantibus pituitam, bilem, me- lancholiam, & aquas ducentibus.	22.
De vomitoriis.	23.
De vinis medicatis & purgantibus.	24.
De pilulis.	25.
De Bolis.	26.
De electuariis ſeu Antidotis ſolidis ſive Tabellis.	27.
De pulueribus.	28.
De Antidotis mollibus, electuariis ſeu opiatis vulgo dictis.	29.
De conſeruis.	30.
De conditis.	30.
De Trochiſcis ſive paſtillis.	31.
De Eccleigmatiſ ſive Linctibus vel Looch.	33.
De Pandaleonibus.	34.
De Paſta regia ſive electuario Regio vel pane Martiato.	35.
De Pignolato.	36.
De Leucophago.	37.
De Reſtaurantibus deſtillatis.	38.
De emulſionibus.	39.
De Gargarifmatibus.	40.
De Apophlegmatiſ ſive Maſticatoriis.	41.
De Collyris aridis & humidis.	42.
De	

I N D E X.

De Errhinis siue Nasalibus aridis & humidis

43.

De Medicamentis externis , & primo de Oleis,

44.

De Linimentis & unguentis. 44.

De Ceratis. 46.

De Emplastris. 47.

De Telis emplasticis. 48.

De Cataplasmatis. 49.

De Pultibus. 50.

De Fomentis & Fotibus humidis. 50.

De Fomentis siccis siue sacculis aut cucuphis. 52.

De Epithematis. 53.

De Embrochis seu Irrigationibus. 54.

De Infectionibus seu semicupiis. 55.

De Balneis. 56.

De Lotionibus siue Balneis particularibus. 57.

De suffitibus. 58.

De pilis odoratis siue pomis Ambra. 59.

De Dropacibus siue picationibus. 60.


De Sinapismis. 61.


De Vesicatoriis. 62.


De Pyroticis siue cauteriis potentialibus siue Ru-


ptoriis. 63.

CASP-











CASPARI BAVHINI
DE COMPOSITIONE MEDICA-
MENTORVM

Inuocato Hygie & Panaceæ Parente
PROEMIVM.

MEDICINÆ partes ab auctore In-
troductorii a seu Medici (sive Gale-
nus sit, sive Herophilus) quinque re-
censentur, φυσιολογικὴ, αἰτιολογικὴ seu πα-
θολογικὴ, ὑγιεινὴ, σημειωτικὴ καὶ θεραπευτικὴ, quas Au-
cenna b ad Theoricam & Practicam reduxit. Et b in cant.
Theoricam ex tribus rebus perfici & compleri di-
xit: Vnde vulgata recentiorum totius medicinae tract. 1. tex. 2.
in tres partes distinctio: In res naturales septem,
Non naturales sex, & præter naturam tres, Textu e-
nim 3. Ex rebus, inquit, sunt septem naturales, (hæc
φυσιολογικὴ est) & ex eis sunt sex omnino necessarie. (has
Auerr. c non naturales vocat) Adhuc sunt (subiun- c in Comra.
git Auic. text. 4.) aliæ tres, scil. Morbi, Causæ & Ac-
cidentia. Hæ ab Auerroë res extra naturam, a Fer-
relis contra naturam, vulgo præter naturam di-
cuntur: Huc παθολογικὴ, ὑγιεινὴ & σημειωτικὴ pertinent.
Practicam Auicen. d in duas species diuisit, qua- d text. 5.
A rum

rum vna manibus exerceatur, & alia cum medicina, nec non eo, quod ex cibis ordinatur. Hæc Galeni est θεραπευτική, quam in διατητικήν, χειρουργικήν κὶ φαρμακευτικήν diuifit.

Ex his medicinae partibus ad institutum nostrum faciunt prima, quæ φυσιολογική, & postrema, quæ θεραπευτική. At cum φυσιολογική sub se res septem naturales contineat; Elementa quatuor, ex quibus tanquam primis elementis homo constituitur, vt sit cum rebus aliis à natura creatis secundum Hippocratem consensus: quibus probe mixtis Temperamenta exurgunt, Humoresq; quatuor primi, qui secunda sunt, at proxima partium corporis elementa, partibusque genitis, ne frustra genitæ sint, Facultates inditæ sunt, tanquam Actionum causæ, quo actiones obire possint, idq; beneficio Spirituum & caloris. Nostrum est tantum de Partium generatione, substantia, connexionem, magnitudine, numero, figura & usu agere. Hæc enim Galeno e monere in Anatome doceri debet. Quæ de re cum sufficienter egerimus, nunc ad alteram partem accedamus.

e 9 adm.
anat.

f de veteri
med. in lib.
meib.
g d. vet.
med.

At cum θεραπευτική seu curatoria pars, vt iam dictum, subdividatur in tres partes, docente Hippocrate f. Galeno, Herophilo, Διατητικήν, φαρμακευτικήν κὶ χειρουργικήν quæ de medicamentis agit, & quæ inuentione vltima existit, assumamus.

Διατητική namq; prius fuit inuenta, Hippocrate g autore. Rudes enim illi homines agrotantes, naturæ quod in ductu instigati ad contrariam vitæ rationem conuertebantur. Huic χειρουργική successit, (licet diuinus Plato h priorem facere videatur) quæ

quæ ad Homeri vsq; tempora, vt ex Iliadibus colligere est, ita floruit, vt illis temporibus Medici nomine solus chirurgus intelligeretur. Tandem *φαρμακευτική* apud Ægyptios inuenta, quod ea regio medicamentis semper abundarit. Hinc forsitan Herodotus *i* in Ægypto omnia medicamētis plena fuisse refert. Etenim vnguentorum & oleorum compositiones in Ægypto primo propositas Hippocratis & Galeni scripta docent, apud quos multa habentur vnguenta, Ægyptia dicta, vti videre est apud Galenū *k*. Quæ sane ars sub imperii Romani principatu exculta est, cum eo tempore ex uniuerso orbe optima medicamenta Romam fuerint delata, teste Galeno *l*. Recte ergo Galenus *m* eorum, qui ante ipsum vixerunt, medicamenta examinare & emendare cœpit, quem Arabes & nostro seculo plures secuti sunt.

iii Euterpe.

k 3. de com. med. f. g.

m 1 2. de antid.

m in lib. de comp. med.

Verum tractatio hæc de medicamentorum compositionibus in duobus consistit, in Simplicium cognitione, & cognitorum cōuenienti mixtione, tam quoad medicamenta, quæ intro sumuntur, quam quæ foris admouentur. Simplicium cognitio ex frequenti inspectione habetur, teste Galeno *n*. Quare veros Medicos non fieri ex libris scriptis Aristoteles *o*, quoniā sensibilibus cognitio sedula inspectione confirmatur, teste Galeno *p*. Itaque, vt idem Galenus, herbarum, fruticum & arborum materiam, priusquam è terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum videlicet fructus sunt futuri, dum augescunt, & dum vigent. Et Dioscorides *q* plantas pro diuersitate ætatum diuersis temporibus inspicere iubet. Nam, monē-

n. i. de antid.

o 10. Erb. 10.

p 2. de comp. med. f. g. c. 2.

q in proc. mio sui operis 1. de antid. 5.

te Galeno, Medicum oportet in vniuersum esse peritum omnium stirpium, aut saltem plurimarū: Siquidem compositorum medicamentorum virtus, vires simplicium sequatur, exigua quadam in ipsa compositione ratione differentia obueniente. Materias namq; medicamentorum qui nō nouerit, verbotenus methodum medendi scit: opus vero nullum ipsa dignum perficiet, vt loquitur Ga-

1 3. de comp. lenus. r
med. f. g. c. 2.

Quo vero tractatio hæc de medicamentorum compositione recte pertractetur, quid medicamentum significet, & quomodo sit definiendum, primo scire conuenit.

Nominis Pharmaci notatio.

C A P. I.

Φάρμακον generaliter quidem quoduis remedium notat, & interdum in bonam, interdum in malam partem sumitur, cum tria significet. Primo venenum, dum in malam partem pro medicina lethali, seu vulgo dicto veneno, sumitur. Tempore enim Platonis venenum pharmacum nuncupabatur. Hinc Medicus ἰητρὸς Homero dictus ἀπὸ τῆς ἰσῆς à venenis, eo quod tunc temporis toti quasi circa Alexipharmaca versarentur. Et apud Dioscoridem θανάσιμα φάρμακα dicuntur omnia illa, quæ in medicina vsum aliquem habent, per se autem lethalia sunt. Dein pigmenta seu fucos, quibus mulieres faciem pingunt, vt apud Poetas habetur: vel colores, quibus pictores vtuntur. Tertium notat medicinam salutarem; & interdum absolute, interdum adhibito epitheto ponitur, vt apud

α 3. Sympof. Plutarchum α φάρμακα ὑπνωτικά: apud Theocritum

φαρ-

ἢ φάρμακον ἔγκλεισον & ἐπίπασον : apud Homerum b 1. dyll. 11.
 φάρμακα κηλίοντα. Hæc triplex est nominis Pharma-
 ci significatio. Quod si pro medicamento salutari
 ponatur, tum dicitur, Eustathio monente, quasi
 φέρον ἄκος, id est, ferens remedium : si pro veneno,
 quasi φέρον ἄκος, dolorem seu tristitiam ferens.

Apud Latinos rarius medicamentum pro ve-
 neno, sicut venenum pro medicamento, sumitur.
 Aliquando eo, quod Græci vtrumq; φάρμακον vo-
 cant. Vnde Caius I. C. c qui venenum dicit, adice- c l. 236. D.
de verbor.
sign.
 re debet, vtrum malum, an bonum. Nam & me-
 dicamenta venena sunt, quia eo nomine omne
 cōtinetur, quod adhibitum naturam eius, cui ad-
 hibitum est, mutat : cum id, quod nos venenum
 appellamus, Græci φάρμακον dicāt; apud illos tam
 quæ prosunt, quam quæ nocent, medicamenta,
 hoc nomine continentur : Vnde adiectione alte-
 rius nominis distinctio oritur. Admonet nos sum-
 mus apud eos Poetarum Homerus d cum sic ait; d Odyss. 4.
 φαρμακα πολλα μὲν ἐσθλα μεμιγμένα; πολλα δὲ λυγρὰ : Ve-
 nena quidem, multa bona mixta, multa autem noxia:
 Idem habetur lib. 4. ad ll. 12. Tabular. Hæc de no-
 tatione nominis: Nunc ad definitionem rei.

Medicamenti definitio.

Medicamentum Galenus a sic definit: φάρμακον a 1. simpl. 1. 3.
de temp. 2.
 μὲν δὲ πᾶν ὅ, τι περὶ αὐτὸ ἀλλοιωτικὸν ἢ τῆς φύσεως; Medicamen-
 tum est omne id, quod naturam nostrum alterare potest.
 Quare 5. simpl. 1. Medicamentum alterare natum est,
 aut vna quapiam qualitate calefaciendo, refrigerando, hu-
 mectando, & siccando; aut dictarum coniugatione quapi-
 am, aut tota sua substantia diximus alterare, ad differen-
 tiam cibi, corpus non alterantis. Nam licet cibus cor-
 pus

A 3

pus

b. 1. simp. 1.

c. lib. de ver-
tig.

d. 2. pro-

plem. 34.

c. in cent.

par. 2. tract.

text. 26.

f. in comm.

pus augeat, & auctiorem præcedat alteratio: non tamen dicitur alterare corpus, quia terminus cibi est auctio, non alteratio. Quare Galeno *βροφή, ὅ, τι περ αὐτὸ ἀυξητικὸν ἢ τῆς ἐστίας*: Nutrimentum est, quicquid substantiam augere potest. Terminus vero medicinali est alteratio. Hæc vero proprie & immediate est in corpus, non in sensus & intellectum, ut voluit Theoph. c. & Aphrodisæus d. Verum hæc alteratio peruenit in animos propter corporis alterationes. Auinc. e. *Quod vincit & superat corpus, est medicina: Quod vero nutrit & auget, est cibus*. Dum dixit vincere corpus medicinam, voluit significare, ut Auerr. f. innuit, immutare corpus aut ad caliditatem, si calidum fuerit medicamentum, aut ad frigiditatem, si fuerit frigidum. Hæc de definitione.

Medicamentorum species.

C A P. II.

a 3. Temp. 2.

b. 3. Temp. 4.

3. simp. l. 19.

Medicamentorum quatuor sunt a species. Vel enim ut assumpta sunt, permanet, corpus tamen mutant & naturam corrumpunt, quare *δηλητήρια* dicta, cum venenosa sunt, & naturæ animalis corruptricia pharmaca. Talia sunt, quæ frigiditate sua necant. Necant autem sola quantitate b, ut hyoscyamus, cicuta, mandragora. II. Vel assumpta mutantur quidem, sed mox, ubi mutationis initium ab animalis corpore consecuta sunt, putrescunt, & simul corpus corrumpunt ac putrefaciunt, quæ etiam venenosa sunt; Talia sunt, quæ putrefactione & erosionem etiam minima quantitate necant; ita tamen, ut non perpetuo occidant, ut si antequam corpus afficiant, una cum excrementis

excer-

excernantur, aut si cibis eorum vim obtundenti-
 bus c mixta sint. Eiusmodi sunt chrysocolle, au- c 3. simpl.
20. 21. 23.
 ripigmentum, cantharides, aconitum &c. III.
 Vel corpus excalfaciunt quidem, mali tamen nil
 afferant: qualia sunt, quæ potestate sunt calida, vt
 origanum, abrotanum, absinthium, IV. Vel &
 agunt & patiuntur aliquid, sed tandem vincun-
 tur & corpori assimilantur. Et hæc tam medica-
 menta sunt, quam nutrimenta. Medicamenta qui-
 dem, quatenus corpus alterant; Nutrimenta qua-
 tenus in corpus nil agunt, sed à corpore alterata
 & assimilata calorem naturalem augent, cuiusmo-
 di est lactuca d. Hanc speciem medicamentorum d 3. Temp. 4.
 alimentū medicamentosum Fernelius e vocat. Cō- e lib 4 sua
meth 1.
 stituit nāq; differentiam inter alimentū, alimentū
 medicamentosum & medicamentum. Alimentū
 absolute, quod corporis substantiæ quodāmodo
 simile, (similibus enim nutrimur) nulla qualitate
 insigniter afficiat, in eam tandem conuertitur,
 quā alit, & interdum auget, vt panis, caro, ouum.
 Alimentum medicamentosum, quod corporis
 substantiæ quodammodo simile, exuperante ta-
 men qualitate corpus immutat, vt lactuca, vinum
 generosum, malum cydonium. Medicamen-
 tum, quod in substantia nobis prorsus dispari qua-
 litates nimium exuperantes obtinet, siue à tempe-
 ramento, vt hyoscyamus, pyrethrum: siue à mate-
 ria, vt thus, galla, alumen: siue à forma profectas,
 vt scammonium, arsenicum, & veneni atque de-
 leteriū genus vniuersum. Hæc ille.

Medicamentum proprie fsumptum vel ἀπλοῦς
 vel τὸ σύνθετον simplex est vel cōpositū. Simplex di-

A 4

citur

g 1. simp. 14.
h 3. simp. 15.

i 4. de tuend.
san. 5.

K 1. simp. 1.

l 5. simp. 1.

citur improprie & proprie: Improprie vel quatenus sensu simplex apparet, natura tamen est compositum, non ratione diuersarum substantiarum, sed ratione diuersarum facultatum. Exemplum, gallerum veterum huius ventrem lenit; at caro eundem sistere potest. In æris squama duplex qualitas & facultas, adstringens & mordicans. Adstrictione carnes ulceratas siccatas, cicatrice obducit: Mordicatione vero præhumidas colliquat. Vel simplex dicitur, non quod tale sit, quale natura produxit, sed quod paucioribus simplicibus constet, ut diatrion pipereon i simplex, ad differentiam alterius medicamentosi vocatur. Apud Actuarium & Mesuen oxymel simplex ad differentiam compositi: apud Mesuen oxymel squilliticum simplex ad differentiam compositi: sic apud Nicolaum oxysacchar simplex, & plura eiusmodi. Proprie simplex dicitur, quod secundum suam naturam syncerum est: Galenus sic definit: ἐστὶ δὲ ἀπλὸν φάρμακον, τὸ κατὰ τὴν αὐτῆς φύσιν ἔχον ἐιλικρινές, h. e. quod tale est, quale natura produxit sine alterius rei mixtione: vel quod nequicquam ex nostra industria assumpserit l ut rosa, absinthium.

*Medicamentorum materia unde
sumatur.*

C A P. III.

a 1. de comp.
med. f. g. c. 2.
6. simp. 1.
b 3. comp.
med. f. gen. 2.
c in cant.
par. 1. tract.
1. text. 25.

Medicamentorum materie desumuntur secundum Galenum a vel à stirpibus, vel à metallis, vel animalibus: vel ut alibi b à stirpibus, animalibus, metallis, & aliis terreis corporibus. Quare tres constituuntur à Galeno & Auicenna c fontes: Plantæ,

Plantæ, Animalia & Metalla; cum ab his potissimum medicamenta sumantur. Si velis, adde cum Fallopio elementa, ignem & aquam, quibus cum raro utamur, raro enim igne urimus, aut aqua refrigeramus, idcirco Galenus caput hoc omisit. A plâis, vel totis, ubi totæ in usum veniunt: vel partibus earum, uti sunt radices, stipites, surculi, rami, gēma, folia, flores, fructus, semina, cortices, ligna, succi, liquores, lacrymæ, gummata, resina & cineres. Ab animalibus, eorumq; vel partibus, vel excrementis: Partibus, iisque vel omnibus, ut hirundo, lumbricus: vel aliquibus, ut caro viperina, cerebrum leporis, pulmo vulpis, ventriculi gallinæ, tunica, testiculi gallorum, sanguis, adeps, pinguedo, medulla, coagulum, os de corde cerui &c. Ab excrementis, iisque vel veris, vel veluti excrementis: Veris, ut est fel, urina, saliva, lana succida, stercus luporum, canum, vnguis alcis, caprarum, asinorum, senecta serpentis &c. Velut excrementis, oua, lac, mel, cera.

A terreis corporibus: & vel metallicis, ut vena metalli, plumbi, argenti &c. Liquores metallorū, ex purgatis metallis facti, ut æs purum, plumbum depuratum: Metallorum excrementa seu rubigines, ut cæruſſa, quæ ærugo plumbi, ferri ærugo, æris flos: vel metallorum cineres, ut hydrargyrū, squama æris vſti: vel terreis, ut bolus, rubrica, terra Lemnia, terræ sigillatæ: vel lapidibus, iisq; vel pretiosis, ut quinque fragmenta pretiosa, hyacinthus, sapphyrus, granatus, smaragdus, sardus: vel minus pretiosis, ut pumex, hæmatides: vel denique maritimis & aquis, ut sunt sales, spuma salis, succinum

A 5

num

d 7. simpl. c.
de melle.

e 3. simpl.

num, bitumen, spongia, corallus. Hinc ergo desumuntur medicamentorum differentia. At Fallopius de quibusdam medicamentis dubitat, quæ ad nullum fontium à Galeno propositorum referri possunt, uti sunt mel, manna, saccharum, quod mellis speciem Galenus *d* vocat. Mel enim ex animalibus non est, nec ex plantis, licet à quibusdā ex plantis concretum dicatur, cui opinioni Galenus *e* contradicit. Quare vult Fallopius, non esse ex plantis, nec animalibus, sed esse alimētum apum, non autem excrementum: esse materiam, quæ cadat ex alto, quod ab apibus colligatur, & ad vsum nostrum seruetur. Sic Mannam nō esse ex plantis, licet mel sit aerium, cadēs super ipsas plantas. Quare si omnia complecti lubeat, dicendum esse, omnem materiam medicam aut esse à plantis, aut animalibus, aut metallis, aut elementis. Mel enim & mannam esse quid confectum ex elementis, quod super plantas & folia cadit, & ab apibus colligitur.

f 5. simpl. &
6. de comp.
med. f. 8.

Medicamenta corpus nostrum alterare dictum fuit. Alterationes autem has Galenus *f* triplices dixit, primas, secundas & tertias, quæ à facultatibus medicamentis infitis fiunt. Quare quid sit facultas, & quot sint, scire conuenit.

Medicamentorum facultas quid?

C A P. IIII.

a 1. simpl. l.

Facultas, quæ *δύναμις* Græcis, Latinis vero potentia, virtus & vis dicitur, est causa & quædam effectrix, quæ partim actu, partim potentia & in futuro tempore fit. Actu, ut calefaciendi in igne, refrigerandi in glacie; quæ facultas sine alio agit.

Poten-

Potentia autem, vt calefaciendi in pyrethro. ca-
storeo, pipere: refrigerandi in hyoscyamo, man-
dragora. His potētia hæc *δυνάμεις* insunt, & nisi aliud
accedat, quæ facultatem in actum deducat, ca-
lescere vel refrigerare non poterunt. Quæ huius
facultatis sit essentia, diuersæ sunt opinione, vt au-
tor est Galenus *b*. Alii enim censuere huius facul-
tatis essentiam cognosci non posse, vt Sceptici phi-
losophi, & inter Medicos Empyrici existimauerūt.
Alii cognosci posse voluerunt, & horum aliqui ad
magnitudines & figuras corpusculorum ac mea-
tum, quos *ὄγκους* & *σώματα* appellant, referunt. Alii,
vt Galenus, ad caliditatem, frigiditatem, humidi-
tatem & siccitatem pro prima elementorum con-
stitutione retulere, vt etiam 3. *temper.* ostenditur.
Dixit ergo Galenus, esse causam *quandam*, quoniā
facultas non est vere causa, sed qualitas quædam,
cuius medio causæ agant, & cum actio omnis à
forma proficiscatur, vt dixit Aristoteles, necessum
erit, vt causa, quæ per hanc facultatem agit, sit for-
ma quædam.

Forma ergo inquirenda, qua inuenta, quot sint
facultates, inueniemus. Corpora, quibus Medici
vtuntur, vel vitam habuerunt, (raro enim viuēti-
bus vtimur) vel vita caruerunt. Viuētia tres for-
mas habent: Animam, quæ forma est. Temperiem
ex quatuor qualitatibus; & totius compositi for-
mam, quæ forma substantialis vel tota substantia
dicitur. Anima proprias habet facultates, quibus
agit. At vegetatiua Aristoteli *c*, vel vt Galeno *d*, na-
turalis, habet attractricem, retentricem & expul-
tricem, quas Galenus alteratricis facultatis mini-
stras

b 1. simp. 1.

c 2. de anima 4.

d 3. temper. 4.

stras nominauit. Sensitiua etiam suas habet. De his facultatibus sermo nobis non est, cum hæc forma medicamenta non ingrediatur, sed tantum viuentium formam comitetur: Vel est temperies ex quatuor elementorum qualitatibus: Et sunt facultates, quæ inserviunt temperaturæ, suntque manifestæ. Est & tertia, quæ totius compositi forma est, quæ forma substantiæ vel tota substantia dicitur, quæ per suas qualitates operatur, & quia ignotæ, proprietates occultæ dicuntur.

De Facultatibus Medicamentorum Numero.

C A P. V.

Facultates manifestæ cum ex effectibus desumantur, tot erunt facultates, quot medicamentorum effectus, qui tres sunt: Primæ, ex primis elementorum facultatibus oriuntur, de quibus primus Hippocrates, mox & Aristoteles & Theophrastus, ut autor est Galenus *a*, docuere. At qualitates hæc vel sunt temperatæ, vel intemperatæ, ubi qualitatibus una excellit, à qua nomen habet; ut si in calore superet, dicitur calidum: si in frigiditate, frigidum &c. Hæ sunt facultates elementorum, & primæ ex Aristotele *b*, Galeno *c*, qui has facultates *σώας d* vocauit. Huc calefaciendi, refrigerandi, humectandi & siccandi facultates pertinent, primæque alterationes dicuntur.

Facultates secundæ licet primas sequantur immediate, tamen à propriis quoque facultatibus dependent, quæ secundæ dicuntur, uti est facultas emolliens, quæ sequitur humiditatem: densans,

quæ

a 1 & 2. de natural. facultat.

b 2. de part. 1. c 1. natur. facult. 6. d 1. simpl. 1.

quæ sequitur frigiditatem: rarefaciens, quæ sequitur caliditatem. Huc pertinet resolutio, attractio, concoctio, deteritio, putrefactio, apertio, obstructio, doloris mitigatio.

Facultates tertiæ, licet & hæ primas & secundas sequantur, diuersi tamē sunt effectus, quare & hi à propriis facultatibus, quæ tertiæ dicuntur, dependent. Huius generis sunt, vulnerum agglutinatio, cicatricum obductio, carnis generatio, lactis & pilorū restitutio &c. His Auerreoes e urinae & mē-
 struorum prouocationem, lactis generationem, c. 5. coll. 4. & 20.
 seminis auctorem, & pectoris expurgationem addit, quem secutus est Montanus f, quæ ex Gale-
 no g desumpta sunt. Verum Fallopius in suo de com-
 pos. med. lib. ad quartum genus retulit. At Fernelius, f libr. de simpl. & 5. simpl. 2.
 qui tres tantum facultatum ordines facit, duas, quæ à temperamento & materia dependent, & tertiam, quæ è tota rei substantia atque forma primum ac per se proficiscitur, quam occultam totius substantiæ proprietatem appellat, has, quas tertias dicimus, ad secundas reduxit.

Facultas occulta, quæ facultas medicamentorum quarta dici potest, à substantiali medicamentorum forma, vel eorum tota substantia dependet, quæ licet per qualitates operetur, cum tamen non satis sit cognita, proprietas occulta dicitur, & medicamenta à proprietate & propria substantia agere dicuntur, ut est facultas in Agarico pituitam educendi, in Rhabarbaro bilem, in Sena melancholiam, in cantharidibus vesicam exulcerandi. Hæ facultates ratione inueniri non possunt, sed experientia cognoscuntur. Huc omnia purgan-

purgantia & alexipharmaca referri debent; & Fallopius urinam prouocantia, spurum, menses, lac promouentia, nec non sudorem retulit, cum vñ humorem magis quam alium respiciant. Verum concludentes medicamentorum facultates quatuor esse dicimus (quamuis non desint, qui quinque faciant) cum Galeno, quem secuti sunt Arabes & ex posteriorib. Montanus, Fallopius, Mercurialis & alii. Iam vero licet hæc omnia suis facultatibus corpus alterent & immutent, horum tamen aliqua primario, alia secundo corpus immutant & alterant. Primario & per se agunt, quæ in primo ordine sunt, vt caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas. Sic & ea, quæ in quarto sunt genere, vt sunt purgantia. Secundo immutant reliqua omnia. Exemplum ex secundo genere de rarefacientibus. Cum opus est rarefacere corpus, primū opus est, vt humor incalescat, ac secundo corpus rarefaciat. Quare talis alteratio, quæ est rarefactio, primario facta non dicitur, sed secundo, quia ad humorum calefactionem sequitur. Sic cum carnem regenerari volumus, necessum est prius sordes amouere deterforiis medicamentis.

De gradibus seu ordinibus facultatum in medicamentis.

C A P. VI.

a 2. simpl.
17.

Facultatibus gradus sunt tributi, quos *αἰσθησις* & *φύσις* Galenus *a*, Latini gradus, excessus & ordines vocant. Sunt autem gradus maioris minusue intensæ actio. Cū enim aduerterent Medici, duo medicamenda calida corpori

corpori apposita id calefacere, sed diuersa ratione,
 gradus in qualibet qualitate constituere. Et qui-
 dem, monente Auerroë *b* per modum compara-
 tionis corpori temperato. In qualibet vero quali-
 tate *c* gradus quatuor constituuntur, qui in primis
 tantum facultatibus à temperatura dependētibus
 ordinati sunt. Sed qua ratione medicamentorum
 ordines inueniantur, explicandum. Licet ex Ara-
 bibus Alchindus peculiarem habeat sententiam,
 vti videre est apud Auerr. *d*, qui ex duplatione vni-
 tatis inuenire posse censuit: ea tamen sententia cū
 ab Auerroë refutetur, eo quod plures possint dari
 gradus, hac opinione relicta, Galenum sequamur.
 Quare inueniuntur ex effectibus sensui manife-
 stis, docente Galeno, quem Auerr. sequitur. Nam
 si medicamentum aliquod à temperato recesserit,
 vel paulum recessit, vt vix aduertatur, vel recessit
 sensibiliter. Exemplo caliditatis ostendamus.
 Quod si medicamentum aliquod calidum à me-
 dia temperie ad caliditatem paululum declinarit,
 ex primo erit ordine calefacientium, vt si chame-
 meleon applicetur parti, levis caliditas *e* persentietur.
 Si recedat sensibiliter, vel sit absq; dolore, vel
 cum dolore. Si absq; dolore, est secundus gradus,
 vt si sumamus semina anisi, & contusa corpori ap-
 plicemus, caliditatem persentiemus, sed absque
 dolore. Si cum dolore, vel lædet cum corruptione
 vel sine corruptione. Si sine corruptione, tertius
 erit gradus. A talibus enim licet dolor fiat, non
 tamen manifeste partem corrumpit, sed intempe-
 rie quadam occulta & non manifesta continuum
 soluit. Si cum dolore & corruptione afficiat, quar-
 ti erit

b 5. col. 3.*c* 3. simpl. 13.*d* 5. col. 58.*e* Galen. 2.
simpl. 27.

ti erit gradus, a quibus non solum dolor fit, sed & corpus corrumpitur & partes aduruntur. Sic de frigidis dicere licet. Primi gradus frigida sunt, quæ proxima videntur temperiei mediæ, vt loquitur Galenus. Secundi, quæ refrigerant sensibiliter, sed sine dolore. Tertii, quæ refrigerant sensibiliter, sed cum dolore absque corruptione. Quarti, quæ refrigerant sensibiliter cum dolore & corruptione, calorem natium extinguendo. Idem de siccis intelligas. An vero sicce dentur in quarto gradu sensibiliter, dubitari potest. Nam licet in tertio gradu sicca citra additum calorem vim exequantur suam: in quarto tamen genere ex se hoc præstare non possunt, nisi insigni calore adiuuentur.

§ 5. coll. 3.

Humida vero, cum humiditas sola dolorem non inferat, non videntur tertium gradum transire posse: assipulante Auerroef. Summam namque humectandi facultatem non habent, nisi frigore adiuncto actio augeatur, vt in argento viuo, cicuta, opio. At quærat aliquis, vtrum hi gradus, qui in simplicibus reperiuntur, etiam in compositis pharmacis dentur? Raimundus Lullius *libello de quinta essentia* multis argumentis de hac re disputat: *Quoniam*, inquit, *in caliditate & humiditate due qualitates intense & in summo dari nequeunt.* Sed hæc relinquamus.

Hos in medicamentis gradus primus Galenus inuenit, eorumque distinctionem proposuit, cum in iis sit latitudo, & agant in suo gradu vel intense, vel remisse, vel medio modo. Quare gradus in tres partes distinxit, in principium seu gradum incipientem, medium & finem, seu gradum intensum.

Exem-

Exemplum in calefacientibus in primo gradu, quæ calefaciunt remisse, dicuntur in principio primi gradus esse: Quæ medio modo, in medio: Quæ vero intense calefaciunt, in fine primi gradus sunt.

Verum non solum in primis, sed & secundis facultatibus cum Auerroë Fernelius *g* statuit, licet *g* 4. meth. 4. Fallopius *b* ob exiguam latitudinem reuera dari neget, quam ob causam earum distinctionem forte etiam Galenus omisit, vt exempli gratia: In adstringentium vel attenuantium genere primæ classis sunt, quæ obscure id agunt: Secundæ, quæ manifeste: Tertiæ, quæ vehementer: Quartæ, quæ summe & extreme. Rursus cuiuscunq; ordinis & initium quoddam est, & medium & finis. Concedendum quoque, alia magis, alia minus adstringere vel r̄refacere. Idem etiam de gradibus in tertiis & quartis facultatib. statuimus. At quomodo medicamentorum facultates ex coloribus, odoribus, saporibus inuestigandæ sint, Galenus *i* *i* 1. simpl. sufficienter docuit.

De Medicamentorum differentiis.

CAP. VII.

Medicamenta ergo alia simplicia, alia cōposita. Simplicia facultates suas habent vel ab essentia, vel ab accidentibus, hoc est, qualitatibus seu finibus. Ab essentia, *a* quæ vel tenuis est, vel *a* 1. simpl. 3. crassa, quæ vnā qualitatem continent, vel par- *g* 3. simpl. 3. tium sunt dissimilatum. Tenuis essentia sunt, quæ cum in corpus, tum in humores se prompte insinuant. Crassæ, quarum materia alte penetrare

R non

b 3. simpl. 4.
15. 16.

non potest. Simplicia vero partium similarium, non vt priora similia, vnam qualitatem continent, sed plures, licet sensu simplicia videantur, vt brassica duas habet facultates, habet expurgandi & adstringendi, de quibus Galenus b, quæ ab accidentibus seu qualitatibus dependent. Alia sunt qualitatis primæ, alia secundæ, alia tertiæ, alia quartæ.

Quæ qualitatis sunt primæ & simplicissime, vel sunt temperata, vel intemperata. Temperata, quæ vires non ita euidenter habent, vt vel calida, frigida, vel sicca dici queant, vt inter Herbas adianthum, radices, asparagus: Fructus vix passæ: Semina, lentes: Succos oleum: Resinas, therebinthina: Gummata, mastix: Axungias, humana: Excremeta, cera: Metalla, aurum: Gemmas, margaritæ: Terras, Lemnia. Intemperata vero, quæ sic calefaciunt, vel refrigerant, vel humectant, vel siccant, vt gradum aliquem in his contingant, suntq; alia calida, vt piper: frigida, vt hyoscyamus: humida, vt saccharum: sicca, vt acetum. Et sunt vel primi, vel secundi, vel tertii, vel quarti ordinis, horumq; ordinum est initium, medium & finis.

De Medicamentis secundæ qualitatis.

CAP. VIII.

Facultates seu qualitates secundæ, quæ primas immeditate sequuntur, vel sequuntur caliditatem, vt rarefacientia: vel frigiditatem, vt densantia: vel siccitatem, vel humiditatem. Quas quali-

qualitates vix solas, sed combinatas habent. Talia sunt medicamenta, quæ dicuntur emollientia, indurantia, quibus aliqui addunt laxantia, & tendentia, rarefacientia, densantia, attenuantia, in-
crassantia, detergentia, glurinantia, aperientia, ob-
turantia, dilatantia, coarctantia, attrahentia, dige-
rentia, discutientia, repellentia, maturantia, septi-
ca & denique anodyna.

Emollientia, μαλακτικά, Barbaris mollificatiua, sunt, quæ impacta & condensata calefaciendo soluunt, ac per halitum digerunt, quæ calida sunt tertio ordine, sicca secundo. Caliditatem enim & siccitatem sequi, autor est Galenus & cum eo Auerroes. *a*

a 5. collect.

Indurantia, σκληρωτικά, Barbaris congelatiua, prædictis contraria, frigida sunt secundo vel tertio, & humida primo gradu, cum fere frigiditatem & humiditatem sequantur, Galeno, b licet Auerro- *b 5. simpl. 10.*
es c contrarium statuere videatur.

Laxantia, χαλαστικά, Barbaris laxatiua: Hæc nihil proprii habere videntur. Tot enim sunt species laxantium, quot sunt tensionum species. Quæ enim tenduntur, aut tenduntur propter exsiccationem, tum laxanda sunt humectatione: aut tenduntur propter congelationem, tum laxantur emolitione: aut tenduntur propter repletionem, tum euacuantibus relaxantur: ita ut quædam laxent humectando, quædam vero calefaciendo, quædam molliendo, quædam mixto modo. Tendentia συντακτικά dicuntur. *c 5. coll. 7.*

Rarefacientia, αραιωτικά, sunt, quæ cutis poros ampliores reddendo materiâ parti impactam soluunt, *B 2*

uunt, quo diffilari possit. Quæ cum sequantur caliditatem & uiccitatem modicam, cum tenuitate partium, moderate calida sunt, vel in gradu primo.

Densantia, πυκνωτικά, illis contraria sunt, ut quæ cutis poros cōtinendo substantiam partis solidiorem reddant, ad impediendam spirituum dissipationem & nimium sudorem. Quæ cum sequantur frigiditatem aqueam, aqueæ naturæ sunt.

Attenuantia, λεπυντικά, sunt, quæ crassos humores incidunt & separant, suntque tenuium partium, siue sint calida, ut piper, siue frigida, ut acetum, quæ & intrinsecus & extrinsecus vsurpantur.

Incrassantia, παχυντικά, quæ fluidos humores condensant, & terrenæ crassæq; sunt substantiæ, & frigida.

Detergentia, ρυπτικά ἢ τμητικά seu repurgantia, abstergentia, exterforia, sunt, quæ viscidos ac lentos humores intrinsecus visceribus impactos, aut extrinsecus vlceribus præter naturam adhærentes abstergunt & adimunt, Galeno d, quem Auicenna secutus est. Hæc caliditatem sequuntur. Verum inter detergentia & deobstruentia hanc differentiam constituunt, ut deobstruentia internos meatus extergant, detergentia externos, hæcq; magis calida & tenuia sunt.

Glutinantia, illinentia ἐμπλαστικά, detergentibus opponuntur, quæ partem corporis cauam, poros cutis pingui obstruunt substantia. Eiusmodi sunt pinguia, in calore & frigore temperata, siccæ & terrestris consistentiæ.

Aperientia,

Aperientia, *ἀνασωματικά*, quæ interiorum partium ductus, ut intestinorum, dilatant, vasorum item oscula reserant. Hæc cum caliditate & acrimoniâ cum partium terrestreitate sequantur, calida sunt & modice sicca.

Obstruentia, occludētia & infarciētia *συνακτικά* Galeno, *συνγκρατικά* quæ corporis ductus coarctant, sequuntur frigiditatem vna cum siccitate & partium crassitie. Substantiæ igitur crassæ, frigida & sicca sunt.

Adstringentia, *συπτικά* Galeno, quæ contrahunt & constringunt oscula vasorum, idque adstrictione. Eiusdem fere sunt facultatis, cuius obstruentia.

Attrahentia, *ἐλκτικά* & *ἐπισπαστικά*, quæ imposita humores serosos & fuligines ex alto extrahunt, calida sunt ordine secundo completo, & sicca.

Digerentia *μελασυγκρατικά*, quæ non modo attrahunt, sed attracta dissipant, calida sunt ordine tertio.

Extrahentia: Huc pertinent, quæ festucas, spinas & alia qualitate occulta extrahunt.

Discutientia vel resoluentia, *διαφορητικά*, quæ vel leuiores, rarefacientia dicta, vel fortiores, proprie diaphoretica, nominata sunt, quæ assumpta attenuant, serosas humiditates, fuligines & tetros vapores à centro ad cutim propellunt, ut vel vapore, vel humore absumentur, quæ calida sunt & tenuium partium.

Repellētia vel repercutientia, *ἀποκρεστικά*, quæ fluentē humorē continent, & in aliam partē repellunt, quæ crassæ & terrenæ sunt substantiæ & frigida.

Maturantia, quæ corruptum humorem concoquunt, sunt duplicia, vel mitigantia, vel suppurantia. Mitigantia seu concoquentia *μεπιτικα*, quæ putridos humores non in pus, sed in aliam substantiam naturæ minus inimicam, mutant.

Suppurantia seu pus mouentia, *διαπυρτικα*, quæ putridum sanguinem in exquisitum pus conuertunt. Vtrumque duplex existit, vnum caloris nostri innati vim conseruat, vel etiã auget, quod temperate est calidum, quod & humori putrido, quo mutatur, addit calorem innato nobis similem. Alterum genus ex accidente maturat, dum poros cutis obstruendo, calorem parti innatum, ne dissipetur, conseruat, vt is auctus, vel pus conficiat, vel humorem corruptum concoquat. Conuersio enim in saniem, vt docet philosophus e concoctionis species est: concoctio vero à calore fit. Quare hæc facultas calorem & humiditatem sequitur, vtrumque calori innato similem. Huiusmodi autem medicamenta styptica, id est, viscida & crassa esse debent, vt monuit Auicennas. Cum namque suppurantia adherere debeant, & tenues humores, ne diffuant, continere, visciditatem & crassitatem habere debent. Hinc dum suppurare animus est, cataplasmata crassa applicare consueuimus. Fit autem suppuratio partim à calore natiuo, partim ab aduentitio, pro duplici suppurationis gradu. Vel namque suppurationis voce intelligimus totam illam actionem, quæ est à principio putrefactionis ad finem vsque: vel solum intelligimus extremam puris perfectionem, vbi album, læue & æquale fit. Hippocrates § enim optimum pus

e 4. Meteor.

2.

f 1. prognost.
aph. 46.

pus dicit esse, si candidum, æquale & læue sit, & quam minime foetidum: maxime vero contrarium huic deterrimum esse.

Si primo modo sumamus, tum efficitur id ab utroque calore, externo & interno. In materia namque aliqua in parte præter naturam collecta, propter illius copiam primo alienus excitatur calor, qui putredinem inducit. At quia in putrefactione partes suppurationi contrariæ euaporant, tum calor internus exurgit, & materiam residuam & dispositam ad maturationem perfectam perducere conatur. Hinc Auenzoar ^{g lib. 1. c. 9. tract. 9.} voluit, suppurationem fieri, & à calore externo & ab innato, qui simul agentes in humorem, eum partim maturant, partim dissipant.

Si secundo modo accipiatur, solum à calore natiuo fiet, & sic Galenus ^{h 5. simpl. 6.} intelligendus, dum voluit, suppurationem fieri a calore natiuo, ubi tres alterationis species constituit. Idem videtur voluisse Auerroes ^{i 5. collect. 5.}, dum statuit, medicamenta suppurantia temperata & natiuo calori similia esse debere. Quæ omnia videntur ex Aristotele ^{k 4. meteor. 2.} k de sumpta.

Putrefacientia, *ανηλεια*, corrumpentia medicamenta, ea dicuntur, quæ calore suo nostrum dissipant, aut in igneum conuertunt, & mala qualitate humidum radicale absumendo, tabem & putredinem cum foetore inducunt. Hæc sequuntur caliditatem summam, & siccitatem in substantia crassa, vt videmus in cathæreticis, & escharoticis. minus tamen intensus est calor in septicis quam cathæreticis.

B 4

Cathæ-

l 5, coll. 17. Cathæretica medicamenta, καὶ σαρκωτικά, quæ Barbaris corrosiua, de quibus Auerroes l, quæ etiam erodentiâ dicuntur, quæ carnem inutilem tam excreſcentem, quam putridam abſumunt, ſenſim tabefaciendo, citra vicinæ carnis corruptionem. Hæc caliditatem ſummam cum tenuitate partium, ſiquidem non multum penetrare debent, ſequuntur. Huc referri poſſunt illa medicamenta, quæ carnem bonam in vulneribus reparant, temperate mordicando, quæ proxime ad Sarcotica accedunt.

Adurentia, πυρωτικά, quæ calore vehementiſſimo, cum in quarto gradu ſint calida, cutim adurunt, inſtar ignis, aut aquæ feruentis, quæ vel mitiora ſunt, vel vehementiora. Mitiora, veſicatoria & eſcharotica, quibus ad phenigmos & dropaces vtimur. Vehementiora, cauſtica, quibus ad cauteria, quæ tria ſola vi agendi differunt.

Veſicatoria caloris vi humorem proliciunt, & tantum puſtulas excitant, cum in tenui ſubſtantia exiſtant, ſicque leuius vrant.

Exulcerantia vel cruſtas facientia βροχωρικά, vehementius vrunt, ita vt arte ſoluta, cruſtæ generentur, cum in craſſa ſubſtantia conſiſtant. Quare Auicennas dicebat: His proprium abſumere ſubtilem partem, quod fieri non poteſt, niſi ad ſit caliditas cum parte terreſtri.

Cauiſtica ſunt, quæ adhuc vehementius vrunt, vt non ſolum veſicas excitent, cutim ſoluant, ſed etiam in carnem agant repente exurendo, cruſta craſſiore inducta. Quare inquit Auerroes m, hæc facere opus ſuum, quod facit pruna, id eſt, carbo: eſſe

esse autem in fine caliditatis cum crassitie substantiæ. Huc referri possunt inflammatiua, quæ in summo sunt gradu, cuiusmodi medicamentum fuit illud Medæ, cuius Galenus *n* meminit, quo ^{n 3. Temp. 2.} caput patris Iasonis combussit, quod ex sulphure & humido bitumine constabat.

Dolorem mitigantia, vt autore est Auerroes *o*, *o* ^{5. collect.} triplicia sunt: Vel enim causam doloris remouent ^{13.} medicamentis variis, vt purgantibus & digestiuis, quæ facultatum secundarum non sunt. Sed hæc Anodyna dicenda non sunt. *Quæ enim*, inquit Galenus *p*, *affectum sanando dolorem sedant, ea recte Anodyna dici nequeunt.* Nam id commune est omnium, quæ *curant.* Vel Anodynis vtimur, quæ *ἀνώδυνα* Galen. ad Glauconem, vel quæ *παρηγορητικά* hoc est, dolorem sedantia, & *παραυτικά*, id est, mitigantia eidem dicuntur. Hæc eidem duplicia: Alia, quorum facultas est reuera anodyna; Alia tantum dicuntur talia, quæ dolores ex quacunque causa ortos demulcent & leniunt, causam vero doloris non tollunt, in quo differunt ab iis, quæ dolorem tollunt; Hæc autem, vt *ibidem* recte Auerroes, temperata esse debent calori naturali similia: aut parum calidiora, vtpote gradui primo & in tenui substantia. Quare Galenus Anodynorum naturam sic expressit: *Quæ reuera sunt Anodyna, partium tenuium sunt, & non multo calidiora, quam quæ symmetra sunt.* Necessè est, vt scilicet euacuent ac digerant, tum rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddant, quicquid in partibus dolore vexatis aut humorum acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum tenuibus spiramentis infarctorum.

B 5

aut

aut etiam vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidus spiritus exitum commodum non inuenientis inhæsit atque inclusum est. Itaque nil prorsus adstrictionis habeant oportet. Huncq; verū modum mitigatiuum dixit Auerroes. Hæcque dolorem, tam eum, qui à calidis, quam qui à frigidis caussatur, mitigare possunt. *Vel utimur iis, quorum facultas tantum dicitur anodyna, reuera tamen non est,* ait Galenus. Hæc à Medicis *Ναρκωτικά* obstupefacientia dicuntur, quæ dolores quoque auferunt, ita ut non persentiat, verum non ut medicamenta causam tollendo, vel ut anodyna, leniendo, sed parti stuporem inducendo, vel somnum conciliando, unde *ὑπνωτικά* ut habet Galenus q dicuntur, eaq; ratione sensum adimūt. Quare Auerroes hæc dixit dolorem non mitigare, nisi per accidens membrum sensu priuando.

His temere vtendum non est, nisi necessitate summa urgente, cum nil sit, quod æque debile reddat corpus, ac dolor, Galeno auctore. Talia autem ex communi Medicorum opinione summe frigida censentur, ut opium, (de quo tamen valde dubitamus) hyoscyamus, mandragora. Hinc Galenus scripsit, frigida partem obstupefacere, & temperiem veris anodynīs summe aduersam sortiri, ita ut si paulo liberalius ebibantur, mortem adferant. Verum non sine causa ambigi potest, an Narcotica in hanc classē sint referenda, cum videamus dari quædam extreme frigida, quæ tamen non dicuntur stupefacientia, ut sedum maius, quod hyoscyamo frigidius est, non tamen ita stupefacit. Quare videntur propria
qua

quadam facultate *ναρκωσις* inducere. Qua de re suo loco.

De Medicamentis tertiæ Qualitatis.

C A P. IX.

CUm de natura Medicamentorum, à quibus facultates secundæ promanant, dictum sit, subiiciendum nunc, à quibus Tertiæ dependeant, vel quæ tertiæ facultatis sint; quæ à secundis differunt, quia tertiæ ad peculiarem aliquam materiam, aut peculiarem partem respiciant. Talia sunt, quæ dicuntur carnem generantia, vulnera glutinantia, cicatricem inducentia, lac generantia, pilos restituentia.

Carnem generantia, *σαρκωτικά* a sunt, quæ in a *3. meth. 5.* vulnere, aut ulcere cauo, carnem deficientem renasci faciunt, ita ut carne repleantur. Talia sunt, ut habet Auerr. b abstergentia & mediocriter siccantia. Abstergentia, quæ in ulcere sordes plande absque morfu abstergunt. Siccantia, ut humiditatem in ulcere moderate siccent, & ea, quæ carnis generationem impediunt, subtrahant. Sic & in vulnere. Sequuntur enim, ut recte Galenus c, facultatem extergentem & siccantem in primo gradu, vel paulo plus in caliditatem & siccitatem moderatam. Sunt autem calida & sicca infra ordinem secundum, quo acris non sint & mediocris substantiæ: nec adstringere debent, eo quod sordes ulceribus magis d affigant. At inquires, Hippocratem e, & cum eo Galenum f scripisse, carnem facere,

b *5. col. 14.*
c *5. simpl. 3.*
d *3. meth. 4.*
e *lib. de carnibus.*
f *3. meth. 34.*

facere, & solidare, solius naturæ & caloris natiui opus esse. Respondetur, sarcotica non dici, quod carnem faciant, sed quod materiam præparent, ut in carnem mutetur. sed & calori natiuo ad id perficiendum auxilio sunt. His contraria sunt, carnem minuentia. Talia sunt, quæ valenter detergunt, & quæ epuloticis proxima sunt.

g 3. meth. 4. Vulnera glutinantia, *κολυτικά* b sunt, quæ recētia labra vulnorum adducta coniungunt, quatenus prohibent, ne inter labra humor aliquis influat. Hæc plus siccare debent quam Sarcotica b. Talia sunt adstringentia crassæ substantiæ, ac sicca ordine secundo, calore temperato. Quibus utimur, ubi sordes fuerint expurgatæ, cavitates carne repletæ, aliaque, quæ glutinationem impediunt, fuerint sublata. Et hæc differunt ab epuloticis secundum magis & minus.

i 3. meth. 5. Cicatricem inducentia, *ἐπωλωτικά* i, sunt, quæ vlcerum carne repletorum labia, quoad superficiē vehementer exiccant, quo cutis instar cicatrix obducatur. Quæ frigida sunt, morfu tamen carentia, siccissima, quo humorem absumant, & crassioris substantiæ, ut carnem contrahant atque densent. Quare Auerroes k dicit styptica esse debere & fortiter sicca. Hinc Galenus differentiam inter glutinantia & cicatricem inducentia medicamenta exposuit. In glutinatione vlcerum siccandum est, quod affluit, quo affecta pars superuacuis careat. In cicatricis obductione non modo quod affluit, verum etiam humor, qui in ipsa carne continetur, est consumendus. Glutinantia medicamenta humorem, qui præter naturam est, tantum exiccant.

Cicatri-

Cicatricem inducentia non modo humorem ex-
iccant, sed etiam humorem, qui in carne est, ab-
sumunt.

Sudores mouentia, vt & vrinas, menstrua cien-
tia, lac & semen generantia, pulmones expurgan-
tia, lapides frangentia. Eiusmodi medicamenta
alii ad quartas referunt qualitates, eo quod vnum
potius & peculiarem respiciant humorem, quibus
proprietaem quandam occultam, seu qualita-
tem propriam inesse volunt.

Sudores mouentia, ὑδρωτικά, calida sunt & tenu-
ium partium, quo humores extenuent, meatus ra-
refaciant, vt humor attenuatus per poros cutis e-
rumpere possit. Quibus contraria sunt, sudores si-
stentia, quæ frigida sunt & crassarum partium.

Vrinas mouentia, διουρητικά, quæ copiose & præter
consuetudinem vrinas educunt, caliditatem &
siccitatem insignem sequuntur. Ratio à Gale-
no l adfertur talis: Cum ad vrinæ prouocationem ^{1 s. simpl. 12.}
requiratur, vt serum à sanguine segregetur, neces-
sum est, fieri aliquam colliquationē, quæ sine ali-
qua caliditate inigni fieri non potest. Quare ra-
lia calida & sicca, & quidem gradu tertio esse de-
bent. Nam vt Auerroes m, caliditatem cum subti- ^{m s. coll. 20. 12.}
litate requirit. Obiicitur: Semina frigida, dicta
maiora, scilicet citrullorum, cucumerum, cucurbi-
tarum, & melonum, vrinam mouere: Non ergo
diuretica omnia calida & sicca erunt. Responde-
tur, diuretica duplicia esse; Alia moderate vrinam
prouocare: Alia vehementer. Moderate, quæ
quasi temperata & extergendi facultate prædita
sunt, cuiusmodi sunt, semina frigida, maiora dicta,
quæ

quæ frigida appellantur, quod cum aliis semini-
bus collata, frigida videantur. Vehementer mo-
uent ea, quæ calida sunt, & sicca; Et hæc fuit Ga-
leni & Auerrois sententia, dum voluere, faculta-
tem diureticam semper sequi caliditatem & sicci-
tatem.

Menses mouentia, *vsq; ad* à diureticis in eo tan-
tū differunt, quod minus sicca esse debeant. Qua-
re calida sunt ordine tertio: sicca vero primo vel
secundo. Menses sistentia his sunt contraria, &
fere omnia frigida, quæ venerem sedant, & semen
extinguunt.

Facultas lac & semen generans in cibis & poti-
bus reperitur. Si vere lac & semen gignenda sunt,
non ex alio, quam ex optimis cibis & potibus na-
sci possunt. Hæc autem facultas partim in medi-
camentis, partim in cibis consistit. In medica-
mentis hæ facultates sunt, quatenus succos pitui-
tosos efficiunt, qui in sanguinem vertuntur. In a-
limentis secundum totius substantiæ similitudi-
nem, vbi boni sunt succi, moderate humida & te-
pide calida. Quæ facultas sequitur caliditatem in
secundo gradu, absque vlla siccitate. Obiicitur
ex Auerroeo, Menses mouentia, ipso scribente, e-
iusdem esse generis cum iis, quæ lac generant. Iam
vero menses mouentia sicca esset debere. Lac au-
tem generantia calida sine siccitate, dictum fuit.
Respondetur, lac generare & menses educere,
contraria videri. Si enim lac fit ex sanguine men-
struo laudabili, tū is, si extra corpus ducatur, quo-
modo lac generabitur? Similitudinem quandam
haberi in facultatibus, quæ lac faciunt & menses
mouent,

5. simp. 21.

5. collect.
20.

mouent, dicit Galenus *p*, quæ similitudo posita est *p* 5. *simpl.*
 in caliditate & motu. Facultas enim menstrua mo- 22.
 uens, sanguinem ad vterum; quæ vero lac, sanguinem ad mammas mouet. At notare hic conuenit, quod ea, quæ lac vel semen produciunt, non vere semen aut lac faciant, sed tantum prouocent materiam deducendo ad mammas & vasa seminaria. Deinde Galenus flatulenta *πολυσπέρματα* vocat, quæ tamen vere semen non efficiunt, sed tantum materiam seminis flatibus implent, quæ repleta extenditur, vt videatur in maiorem molem augeri. Debent etiam esse viridia ex mente Galeni *q* & *q* 5. *simpl.*
 humida, non sicca actu; nam sicca plus, quam oportet, calefaciunt & desiccant. Si quæras, in quo differant, lac & semen generantia; Respondetur in hoc, quod lac generantia melioris succi esse debeant: semen vero producentia, sanguinem magis flatulentum reddere debere. Vnde Auerroes *r, me.* s 5. *coll. 20.*
dicamenta & cibi, quæ generant sperma, sunt calidi & humidi ac ventosi.

His contraria sunt lac imminuentia, & semen extinguentia: quæ enim vel exiccando sanguinem absument, vel frigiditate, vel alia qualitate deteriore reddunt, ea, quo minus lac generetur, impediunt: sic quæ frigidiora sunt, quæ item nimio calore exiccant, semen extinguunt.

Lapides frangentia seu imminuentia *λιθάνευτα*, sequuntur caliditatem modicam, & humiditatem, cum partium tenuitate. Non enim valde calida esse debent propter rationem ab Auerroes *s* 5. *collect.*
 propositam. Calor enim, qui indurat & petrificat, est fortissimus. Sic calorem extraneum lapides 20.
 des

des indurare videmus. Quare in eorum fractio-
ne necessarius est calor suavis, & non ita fortis, in
quo sit humiditas aliqua, comparando calori, qui
induravit lapides, & cum subtilitate.

8. 5. coll. 2.

Tandem facultates quædam sunt à partibus
corporis denominatæ, vt Cephalica, Ophthal-
mica, Pleuritica, Colica, Stomachica, Hepatica,
Splénica, Nephritica, Cystica, Hysterica, Arthriti-
ca. Hæc ad medicamenta, quæ per quartâ faculta-
tem agunt, referenda esse aliqui volunt: eo quod
in proprium aliquod membrum aut humorem a-
gant. Verum cum Galeno *t* statuimus, medica-
menta hæc talia non esse, vt tantum vni profint,
alteri vero nihil: nec talia esse, vt omnibus partis
affectibus congruant: sed talia dici, quoniam fre-
quentissime aut maxime in eam partem, à qua
nomen sunt mutuata, agant. Declarat hoc Gale-
nus exemplo medicamenti ophthalmici, vt est
collyrium diarhodon & diapompholygos: hoc v-
timur in oculorum affectibus, & tamen vti etiam
licet in aliis, vt affectibus aurium, narium, oris,
pudendi & ani, non tamen ita frequenter, neque
tanto cum fructu.

De Medicamentis quarta facultatis.

C A P. X.

a. 5. coll. 21.

Quartæ facultates sequuntur, quæ secundum
Auerroen *a* non operantur per primam, se-
cundam & tertiam virtutem, sed per propieta-
tem, quam Medici totam substantiam nominant;
vel

vel proprietatem occultam; vel operationes à sub-
stantiali forma dependentes appellant, de quibus ^{b i. de causis plantar.}
Theophrastus *b*. Hæc autem operantur vel per ^{23.}
alterationem, vel per motum localem. Per alte-
rationem, quia corpora aut ad malum, aut ad bo-
num alterantur; vel intro sumpta, vel externe ap-
plicata. Quæ ad malum operantur, sunt venena
omnia. Quæ ad bonum, vel intrinsecus, vel extrin-
secus. De his Galenus, Plinius, & alii multa tra-
diderunt. Intrinsecus: ut cerebrum passeris, vene-
rem auget: pulmo vulpis asthmaticis: hepar lupi
hepaticis: interior ventriculi gallinæ tunica, sto-
machicis prodest: intestinum lupi dolori colico
&c. Extrinsecus, ut sunt, quæ de collo amuletorum
instar suspenduntur, ut viscum quercinum, radix
pæoniæ, ungula alcis, smaragdus, contra epilepsi-
am valere creduntur: sic quædam, quæ febres abi-
gunt, quæ *λεξιπύρετοι* vocavit Galenus: in affectibus
oculorum Valerianæ radix. Vel operantur per mo-
tum localem: quæ agunt vel impellendo, vel reti-
nendo, vel attrahendo. Impellendo: sic unicornu
venenum repellit, corallina, vermes expellit. Reti-
nendo: sic lapis æthites coxæ alligatus partum reti-
nere Albertus Magnus refert. Attrahendo, vel
attrahunt humores, vel alia corpora, ut dictamus
Creticus sagittas ex corpore extrahere scribitur.
Humores attrahunt aut vnum, aut plures, ut do-
cet Galenus, cuiusmodi sunt, ut habet Auerroes *c*, *c* ^{5. coll. 21.}
Medicinæ laxatiuæ. Attrahentia vnum humo-
rem: sic solam pituitam attrahit helleborus al-
bus, hermodactyli, charthamus, cucumis asi-
ninus; Bilem, aloë, manna, succus rosarum;

C

Me-

Melancholiam, senna, polypodium, helleborus niger.

d cap. 4.

e 4. histor.
plant. 15.

Attrahentia plures humores, Rhabarbara, agaricus, scammonia, quæ bilem vtramque & pituitam educere creduntur. Sic Galenus *libello de purgantibus medicamentis* concedit *d* dari medicamenta, quæ sanguinē ex venis attrahant, producens exemplum, quod Bithyniæ in Thracia ipso adhuc puero contigit. Inuenerat homo herbam, quam si quis assumpsisset, sanguinem primo, tum vitam amittebat. Multis hoc pacto morientibus, hominem comprehendunt & ad gentis magistratum ducunt, qui tandem obligatis oculis, ne cui herbam istam ostenderet, ad supplicium deductus fuit. Sic Theophrast. *e* tradit, reperiri herbam, non solum, quæ sanguinem sistat, attrahat, sed etiam expellat & diffundat, quod falsum quibusdam videtur, cum tamen in India talem etiam reperiri, scriptores neoterici tradant.

Quæ ergo pituitam solam purgant, phlegmagoga; bilem atram, melanagoga; quæ bilem flavam, cholagoga; quæ vero aquam & serosos humores ducunt, hydragoga dicuntur; quæ denique sanguinem à putridis & adustis humoribus, ut etiam falsis & serosis expurgant, hæmagoga dicuntur.

f de purgantibus.

Qua vero ratione à Medicamentis humorum fiat attractio, ita ut potius hic, quàm alius trahatur, diuersæ fuerunt & etiamnum sunt sententiæ, uti videre est apud Galenum *f*. Veterum enim fuit sententia, medicamentum purgans humorem communi tractu educere, ita ut vno detracto, consecu-

secutione quadam alii quoque succedant, ut vacuum detur, & quidem omnes humores indiscriminim cucurbitulæ instar trahere, ita tamen, ut is, qui magis fluidus primo, dein crassior, postremo crassissimus trahatur: ita ut si medicamentum forte non fuerit, nihil præter serum educatur: si fortius, vna & bilis; si fortissimum, simul & pituita cum melancholia. Quam sententiam erroneam esse, medicatio docet. Hydropicis enim serosis humoribus adundantibus scammonem, vel succum rad. ireos si exhibueris, educuntur serosi & aquosi humores: Si vero eidem exhibueris agaricum, vel fennam, non aquam, sed crassos humores expurgabis. Sic si sano homini iridis succum exhibeas, serosus & tenuis humor educetur, non vero crassus. Aristotelis ^g sententia fuit, humores à medicamentis purgantibus duci, eo quod medicamenta à calore nostro non superentur, sed inconcocta maneant, & id partim propter quantitatem, partim propter qualitatem fieri: & quæ propter qualitatem inconcocta maneant, proprie medicamentum ^h purgantia esse. At Auicenna ^h voluit, proprietatem ^{lib. de viribus cord.} hanc esse aliquo modo ad elementorum confluxionem, & cælestes influxus comparatam. Quare & Mesues ⁱ ad proprietatem cælestem retulisse videtur. Auerroes ^k vult fieri propter caloris ^{lib. de simpl. med. 5. col. 21.} proprietatem, quæ medicamentis infidet, ita tamen, ut necessaria mensura caloris sit in medicamento, ut operetur. Galenus ^l facultatem hanc attractricem, ¹ quæ in medicamento est, positam esse in similitudine voluit, quæ est inter medicamentum attractum ^{in lib. de purgant: 3. simpl. 25.} & humorem attractum. Ad quam similitudinem

dinem calor requiritur, quo vasa aperiuntur, quibus apertis humores trahantur. Quam similitudinem Galenus in forma substantiali posuit, secutus Hippocratem, qui pronunciauit, Medicamentum cum fuerit in corpus ingressum, primum id, quod omnium maxime sibi natura respondet, eique simile est, deducere. Dein alia quoque trahere & purgare, quemadmodum semina ac stirpes terram ubi subierint, id quod in terra secundum ipsorum naturam est, sibi attrahunt, tum cetera deinceps. Talem modum & medicamenta in corpore seruant. Quæ enim bilem mouent, hanc meracissimam primum purgant, dein mixtam. Auicennas hanc similitudinem agnoscere noluit, inquiens: *Si attractio sit à similitudine substantiæ, tunc ferrum attraheret ferrum, aurum aurum*. Verum licet similitudo sit & in humore & in medicamento, hoc tamen aduertendum, in similitudine, quod validius trahat infirmius; Quæ similitudo cum maior sit in medicamento, quàm humore, idcirco medicamentum humorem, & non humor medicamentum attrahit. Sic magnes attrahit ferrum, electrum paleam, non contra: quia vis attractrix, quæ similitudine fit, robustior est in magnete vel electo, ut aptior sit attrahere, quam attrahi, Galeno *m* docente. Sic carthamus similitudinem quandam habet à pituita non plane alienam, ut color præ se fert, sed tamen calore ipse, quam pituita, valentior est, ut pituitam attrahere possit, non autem à pituita trahi. Vnde Fernelius similitudinem hanc inquit esse non in temperamentis, sed substantiis. Explicat quoque Galenus *n* similitudinem, quæ vtrisque inesse

m 3. *simp.*
 25.

n 3. *meth.* 4.

inesse debet, eius quod purgat, & eius quod purgatur, ut cum quod purgatur, pituita est, quod trahit, pituitosum sit, oportet; Non autem plane pituita esse debet. Quare similitudo inest substantiis, non autem est idenditas. Sic ferrum non attrahit ferrum, nec caro carnem, sed magnes ferrum, caro sanguinem: differunt enim idem & simile. Sit pituita cum pituita eadem, & cnicus cum cnico, magnes cum magnete, ferrum cum ferro: similis autem pituitae cnicus, ferro magnes, non tamen idem.

Duplex o autem est haec similitudo in medicamentis purgantibus, una actu, altera potentia. Quare purgantia quaedam iam possident similitudinem ad attractionem idoneam: quaedam non perfecte possident, sed in corpore animantis accipiunt, quemadmodum caustica medicamenta, quae agunt beneficio caloris corporis nostri, à quo in actum deducuntur.

o 3. simpl.
26.

Sed quaeritur, qualis sit haec similitudo, an substantiae, an vero temperamentum? Si namque fieret ab aliqua temperamenti similitudine, tunc nullum daretur phlegmagogum medicamentum, cum pituita frigida sit; Omnia vero purgantia sint calida, ut docet Galenus p. Haec vero substantia, in qua similitudo haec, non est ipsa rei materia, à qua aut tenuis aut crassae substantiae dicitur. Nec huius substantiae similitudo attractionis causa est: alias agaricus, cum tenuis substantiae sit, crassiorem pituitam non educeret, nec Rheubarbarum, quod adstringens & solidae substantiae, tenuem bilem euacuaret. Quare illa substantia totius substantiae proprietas dicitur, quae cum nec

C 3

materia

materia sit, nec temperamentum, necesse est, esse rei formam, cuius proprietates & facultates non inuestigantur eo modo, quo primarum, secundarum & tertiarum, utpote colore, sapore, odore, aut aliis sensuum qualitatibus, sed ex solis effectibus percipi possunt. Quare à plerisque cœcæ & occultæ qualitates & facultates dicuntur. Hactenus de medicamentis in genere. Nunc quæ causa sit, cur composita medicamenta fuerint inuenta, inquiramus.

Medicamenta cur componantur.

C A P. XI.

TRia sunt, quæ cogunt Medicos, ut compositis utantur, quæ etiam necessitatem mixtorum medicamentorum ostendunt. Primum, morborum seu affectuum varietas. Alterum, partis affectæ natura. Tertium, medicamenti simplicis penuria. Si namq; omnes morbi simplices forent, nulla esset mixtionis necessitas: simplici enim affectui simplex remedium, ipsi tamen contrarium, opponeretur. Sed cum morborum dissimilis sit ratio, varia eorundem complicatio, simplex remedium par esse & sufficere nequit: remedium enim viribus sit æquale cum morbo oportet, Galeno monente. Quidam enim morbi ex diuersis complicantur, vel totius corporis, ut febris essentialis cum phlegmone, vel partium diuersarum, ut cum dolor colicus & nephriticus simul infestant. Plerumque etiam eiusdem partis morbus compositus est, ut vlcus cum intemperie, tumore, cauitate, quibus affectibus, cum inter se sint diuersæ naturæ, simplex

4. simpl.

plex remedium par esse nequit. Causarum quoque morbificarum concursus cum ipsis morbis compositionis necessitatem inuehunt, ut causa quarumlibet febrium spuriarum: Siquidem si bilis flaua vna cum pituita, aut contra, vel cum quodam alio humore putrescat, remedio opus est composito, ad vtriusque humoris præparationem & purgationem. Plerunque etiam morbi causa diuersa est ab ipso affectu, ut pituita frigida, humida, causa febris quotidianæ, diuersa est febre calidæ & siccæ: quare pituita frigida, crassa, lenta calefacientibus, attenuantibus, incidentibus & detergentibus indiget: febris vero refrigerantibus. Similiter & symptomatis magnitudo aliud remedium ab ipso affectu postulat, ut virium imbecillitas in febre ardente, vinum requirit: contra febris prohibet; Quare ut ingenti symptomati occurratur, & morbus non negligatur, vinum dilutum conceditur.

Altera causa fuit, totius corporis & partis affectus natura. Cum enim in omni morbo curando duo sint spectanda, ut dicitur 8. *method.* ut, quæ præter naturam sunt, auferantur: quæ vero secundum naturam, conseruentur; si corpus natura humidum, laboret morbo humido, minus exiccandum, ne natia temperies labefactetur: Proinde exsiccantia efficaciora humectantium admixtione temperanda erunt. Sic quoad partem affectam, exemplum sit in hepate scirrho affecto: Affectus ipse emollientia requirit: pars vero ipsa cum emollientibus adstringentia desiderat, ad sui roboris, actionis gratia,

C

4

custo-

custodiam. Deinde cum sæpe remedia parti quidem affectæ accommodata, ad eam tamen per se peruenire nequeant, requirunt alia, quæ eo deducant, vt cum linimenta aut vnguenta lieni applicamus, aliquid aceri inunctionis tempore admiscemus. Aliis vinum aut aquam vitæ, aut quid simile, maioris & celerioris penetrationis gratia. Sic quando obstructio partem aliquanto à ventriculo remotam obsidet, iis, quæ obstructionem tollere apta sunt, addere oportet parti appropriata, vt pulmoni pulmonica, quale est tussilago, hepatis hepatica, vt agrimoniam, spleni splenica, vt ceterach,

Tertia causa est, medicamentorum simplicium penuria; Non raro enim deficit vel ad affectum simplicem; aut si obuium est, vel vehementius, vel imbecillius esse potest, tum vehementioris vis refrenanda, leuioris vero augenda alterius admixtione, quo remedium ipsi affectui & morbo viribus sit æquale. Accedit etiam, quod sæpe remedium simplex colore, sapore, vel odore displiceat, consistentia molestum sit, quæ accessione aliorum emendare oportet. His accedit simplicium conseruatio, quæ in multis citra mixtionem fieri non potest, vt succi herbarum nisi inspissentur, diu conseruari non possunt. Quare quisquis rationem componendorum medicamentorum assequi volet, affectuū præter naturam differentias, corporis & partis affectæ naturam, facultatem, actionem, situm, sensum, figuram, medicamentorum vires cognoscere debet, & cetera, quæ compositionem & vtendi modum indicant.

Ipsa

Ipsa vero compositio quatuor rebus perficitur: Iis, quæ morbum curant: iis, sine quibus priora sum effectum præstare nequeunt; iis, per quæ melius fit actio: & iis, quæ reliqua iuvant ac conservant. Verum & idoneus compositis vtendi modus requiritur, quemadmodum in singulis remediis ostendemus.

De medicamentorum compositorum differentiis.

C A P. XII.

Medicamēta vero composita aut interna sunt, aut externa. Illa vel intro sumuntur, vel immittuntur; hæc vero extrinsecus applicantur. Quæ assumuntur, aut sunt liquida, aut mollia, aut sicca; eaque aut alterantia, aut purgantia, aut roborantia. Liquida sunt iulepi, syrupi, apozemata, potiones purgantes, destillata restaurantia, emulsionēs, gargarismata. Mollia vero, vt boli, opiata, conseruæ, eclogmata. Sicca vero sunt electuaria, tabularum forma trochisci, pastilli, placentulæ, pulueres, apophlegmatismi, dentifricia, quæ omnia per os sumuntur. Quæ vero immittuntur, vel iniiciuntur, vel induntur. Iniiciuntur clysteres in intestina, fiunt iniectiones in veretrū & vesicā, in vterum, in aures, in nares, vt errhina, quæ etiam attrahuntur, & quæ in vlcera ad partes internas penetrantia, & in fistulosa iniiciuntur. Induntur autem in anum suppositoria, noduli, in vteri collium pessaria.

C 3

Extra

Extra vero adhibentur collyria, quæ à quibusdam inter interna numerantur, embrochæ, litus, cerata, vnguenta, emplastra, pultes, cataplasmata, fomenta, frontalia, epithemata, balnea vniuersalia & particularia seu infessus seu semicupia, sacculi, cucuphæ, semicucuphæ, scuta, dropaces, sinapismi, cauteria, suffitus, pulueres.

De suppositoriis & nodulis.

C A P. XIII.

a *deratione*
uict. in acut.
b *1. de mu-*
lier. 6.
c *Sect. 6.*
d *lib. 4. tard.*
pass. 7.
e *lib. 6. c. 6.*
f *lib. 3. c. 8.*

Medicamenta, quæ per anum induntur, duplicia sunt, suppositorium & clyσμα. At cum inter medicamenta composita suppositorium sit simplicissimum, de eo primo acturi sumus. Dicitur autem Græcis, præsertim Hippocrati *a* βάλανος, quamuis & Pessus, quo ad vterum repurgandum vtimur, eidem *b* sæpe βάλανος dicatur: ὑπόθετον *c* Myrepsio; Glans subdititia Aetio: Balanismus & Pessulus Aureliano *d*. Latinis Glans, à similitudine glandis quercinæ. Fuerunt, qui collyria vocarunt, vt Columellæ *e*, & Aurelianus *f*. Vulgus suppositorium, quod ano supponatur, appellat. Est autem suppositorium *remedium solidum, oblongum & rotundum, pyramidis forma, quinque aut sex digitos longum*, quod ano ad eius sphincteris irritationem, & facultatis expultricis excitationem, ad excrementorum euacuationem inditur. Talis autem longitudo requiritur; cum toti recto intestino expultrix facultas indita sit.

Etsi præcipuus suppositoriorum vsus sit, facultatem

tem expultricem irritare, quo excrementa g, diu- ^{g Aegin.lib.}
tius in intestino retenta, expellat: tamen iis uti- ^{I. c. 45.}
mur quoque in variis casibus, vt, quando ægrotus ^{Oribas. 5.}
imbecillis h est, qui multo facilius suppositorium, ^{syn. 20.}
quam clysterem admittit. Quare Hippocr. i vbi ^{h Aet. tetr.}
cibus assumptus non descendit, & æger imbecillis ^{i. ser. 3. c. 160.}
est, glandem præscribit. Dein etsi vires clyisma ad- ^{i Sect. I. de}
mittant; sæpe tamen feces induratae, glandem ne- ^{ratione vict,}
cessariam indicant, vt aluo stimolata ad excretio- ^{in acut,}
nem proritentur, quo via sit clysteri. Tum, quan-
do vnus vel duo clysteres iniekti per aluum non
redierunt, quod in colicis sæpe vsuuenit, & alios cly-
steres indere periculosum, tum glans, sed effica-
cior, requiritur. Quemadmodum etiam, si medi-
cameta assumpta in operatione tarda sunt. 4. Quan-
do ætas vel consuetudo clysteres non sustinet, vt
pueris, dum lactant, vtiliores sunt glandes. Sunt
alii, qui quiduis potius, quam clysteres admittant.
5. Similiter, quando à clystere aliquid mali time-
tur, vt mulieres, dum sunt prægnantes & proximæ
partui, vel nuperrime peperere, à clysmatibus of-
fendi solent. Quare tunc ad glandes confugere o-
portet. Sic reperiuntur, qui assumpto clystere, sta-
tim post primam sedem in animi deliquium inci-
dunt, vel etiam à clysmatibus tormina patiuntur.
Deniq; quando à capite deriuare aut aliquo mo-
do purgare animus est; Quare in capitis veterno-
sis, vt & præcordiorum affectibus, recti intestini
morbis eiusque sphincteris, paralyti, & contra a-
scarides in ano hærentes, iis uti consueuimus.

Genera glandium tria sunt, lenes, medio-
cres & vehementes seu acres. Lenes vel sunt
simpliciter

simplices, vel compolitæ. Simplicium materia est mel, quod tantisper coquitur, dum crassescat & inspissetur. Tunc vero satis coctum est, quando super orbem stanneum aut lapidem marmoreum effusum concrevit; & ficus arida inuersa. Fiunt etiam ex lardo salso, conciso ad longitudinem minimi digiti; ex seuo, candela, ex saponis albi \mathfrak{z} β . ex radice aliqua, succum lentum habente, vt altheæ, maluæ, vel quæ nitrositatem habent, vt betæ, mercurialis, bryoniæ, brassicæ excorticatæ, quæ vt facilius subeant, vsus tempore, vel butyro, vel oleo, vel adipe, vel axungia illinuntur. Fiunt etiã ex caulibus herbarum detergentium, vt betæ, brassicæ, mercurialis. Nonnulli mercurialis folia contusa in anum intrudunt. Hinc Aetius *k*, *optima glandula fit ex foliis mercurialis viridibus tritis*. Alii amygdalas saccharo obductas, aut trochiscos saccharatos indunt. Fiunt & simplices ex allio solo ad flatum discutiendos, in pueris præsertim. Sed quia ad irritandã facultatẽ expultricẽ tam simplices interdũ non sufficiant, vel propter facultatẽ expultricem pigram, vel propter partis obtusorem sensum, tum glandes lenes, sed compositiæ fiunt ex melle, addito sale ad acuendam vim glandis, maxime in pueris, quibus & salis l grumus inditus, cepaque & porrum capitatum sufficit. Dosis est ad \mathfrak{z} . j. mellis, salis communis pulueris. \mathfrak{z} β . vel \mathfrak{z} . j. quæ simul coquuntur. Et hoc est suppositorium cõmune appellatum in officinis. Sed aduertendũ, vt in conficiendis suppositoriis ex melle cocto & digitos & omnia instrumenta, quib. vteris, prius oleo aut butyro inungas, nisi omnia tam digitis quã instrumentis adhærere velis. Alii

k tetr. i.
ser. 3. c. 360.

l Aegin. O-
ribas. Ae-
gins.

Alii conficiunt ex farina hordei vel tritici, vel filiginis cum aqua in massam redacta, & sale modico condita, quæ exiccantur, & vltus tempore oleo inunguntur. Aliqui radices prædictas vel caulibus oleo inunctas sale modico asperso indunt.

Nonnulli loco glandium nodulis vtuntur; summentes vitellum oui, salis communis \mathfrak{z} .j. miscentes, quæ linteo raro excipiunt, filum appendunt, quo retrahere possint, oleo inungunt, & in anum intrudunt.

Mediocres sunt, quæ parantur quidem ex melle, tanquam materia communi, sed adduntur etiam medicamenta, vt sunt species hieræ Galeni, agaricus, fenna, nitrum, in quibus est dosis mellis ab \mathfrak{z} .j. ad \mathfrak{z} .ij. Specierum vero, quæ admiscentur, octaua vel decima pars, vt,

℥. Mellis comm. \mathfrak{z} .j.
specier. hieræ \mathfrak{z} .j.
vel agarici \mathfrak{z} .j.

salis comm. & nitri, an. \mathfrak{z} .ss. misce.

Sunt, qui stercuris muris antiquum addunt ad \mathfrak{z} .ss. edocti à Dioscoride m, qui muscerdas subditas infantibus, alui deiectionem promouere scribit. Verum Galenus n irridet, & reuera pudendum esse inquit, alia experiri velle, cum tot sint, quæ apposita sedi excretionem excitent. Sic ad necandos Aecarides fiunt ex pulueribus amaris, vt ex aloe & melle, ex agarico, puluere hieræ simpl. Galeni, puluere absynthii, centaurii, addita farina lupini. Exemplum:

℥. Absynthii, centaurii, vel abrotani, vel aloes trita \mathfrak{z} .j.

mellis

mellis ζ j. simul coctis fiat suppositorium.

6 1. Syn. 20.

Sic & ficus cum nitro atque cumino, vt Oribasius 0. Ex sale tosto, melle & nitro, Aegineta. Sic ad resolutionem sphincteris & recti intestini ex galbano & terebinthina glandes fiunt. Et sane pulueres cum melle permiscendi; sic enim sensim, prout mel liquatur, vires suas exerunt. Si vero, vt aliqui faciunt, tantum aspergantur, vt celerius podicem pungant, satis diu retineri non possunt. Parantur etiam ex pulueribus simplicium detergentium melle exceptis, vel loco mellis, cera, vel terebinthina, vt pul. cumini, rutæ, thymi, cyclaminis, mercurialis, centaur. parui, rad. ireos & consimilium.

Vehementiores sunt, quæ ex melle cõponuntur & medicamentis fortioribus, vt helleboro utroque, euphorbio, coloquithide, scammonio, castorio, nitro, sale gemmæ, sale ammoniaco, quibus in affectibus capitis veteriosis, apoplexia, doloribus aurium, & dentium utimur; in quam classem referri possunt, quibus opium additur, quorum in maximis doloribus & vigiliis vsus est. In horum compositione mellis minor quantitas apponitur, quo facultas admixtorum magis vigeat: Exempli gratia in lethargo

℞. Hellebori albi, scammon. an. gr. iiij.

nitri vel salis gemmæ, vel ammoniaci, vel specierum diacoloquinth. gr. vj.

mellis ζ j. misce.

In officinis habentur species ad suppositoria, quæ acuta vocantur, ex helleboro albo, granis coloquinth. esula præparata, hermodactyl. & speciebus hieræ. Quidam suppositoria acuta hoc pacto con-

conficiunt. Suppositorio ex melle parato ipsius apici antimonii puluerem apponunt.

Ad somnum conciliandum sic parant:

℞. Opii gr. xj.

Castorii gr. iiij.

mellis ℥ j. misce.

His enim sal non additur, nec aliud, quod stimulet, cum diu in intestinis manere debeant. Vel sic parabis:

℞. Opii ℥ j.

croci, castorii. an. ℥ ss. quæ tusa, cribrata cum melle cocto aut cera & oleo nymphae in vnum coeant, formentur glandes, quibus solum appensum sit.

Notandum hoc loco, in suppositoriis purgantia in minore dosi sumi, quam si ore sumerentur: stupefacientia vero contra, quia purgantia solida ponuntur in suppositoriis, quæ cū vim habeant acrimā, & maxime stimulantē, intestinis adhaerentia facile vellicant, quæ vbi ore sumuntur, colliquata aut commixta assumuntur, à quib. acrimonia obtunditur. Stupefacientia vero cum frigida sint, & crassa, si operari debent, in actum deducantur, oportet, & facultas per totum corpus distribui debet. Quare si parua eorum esset quantitas, facultas ipsorum extingueretur. Glandium tamen creber vsus hæmorrhoidas irritat, quare in iis, qui ex hæmorrhoidibus per interualla cruciantur, non sunt viles. Sic etiam acriores glandes podicis vlcus excitare possunt. Vbi tamen morbus longior à succo melancholico vrget, cōmode his hæmorrhoides proliciuntur. Sic vbi in podice vl-

cera,

p tetr. 1.
serm. 3. cap.
171.

cera, fissure, inflammationes, dolores, condylomata, alique tumores existunt, glandibus non est utendum. Dum enim podex adstringitur & clauditur, durum ferre non potest. Quare à glandium duritie dilaniatur, ut autor est Aetius p. Idcirco fomentis siue floccis pro glandibus uti cogimur. Alii Turundas parant, præsertim ubi dolor internus urget, ex linteis mollibus, quas unguentis obducunt. Materia autem harum eadem est, quæ & glandium: Trita enim cum melle, & flocco excepta in anum induntur; ut si dolor cum inflammatione fuerit, ex unguento rosaceo Mesuis, ex unguento populeonis, ex cerato refrigerante, vel ex mucilagine seminis cydoniorum & psyllii extracta, in aqua rosarum vel plantaginis cum aliquo dictorum unguentorum & vitello oui excipiuntur: Vel e.g.

℞. Thuris, myrrhæ, croci, opii, an. ʒ j.
subtilissime pulueriz. excipiantur mucilagine
seminis psyllii ʒ ss.
vitello oui j. & pomada q. s. est.

Si vero dolor siue ardor adfuerit, ex solis anodynis, ut mucilagine seminis lini, sem. althææ extract. in aqua chamomeli, addita parte unguenti rosati.

Ad Rhagades seu fissuras ani fiunt ex emplastro de cerussa, vel

℞. Emplastri de ceruss. ʒ ss.
camphor. gr. iiij.

fiat unguentum cum paucis pomada, & oleo rosaceo, turunda oblinatur, & indatur in anum.

Ad detergendum parantur ex melle, syrupo de
rosi;

rosis ficcis, syrup. de absynth. cum tantillo farinae hordei aut lupinor. vel ex vnguentis detergentibus.

Ad hiantem & relaxatum podicem ex adstringentibus, vt puluere boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, baleustiis, gallis, nucibus compressi, rosis rubris & similibus, cerato sandalino exceptis: vt,

℞. Dictorum ij. aut iij.

singulorum ℥j. & cerato excipe.

Ad hæmorrhoidum tumentium dolorem sedandum ex pomade, vitello oui, succo amygdalarum dulcium, & si ardor adest, cum oleis refrigerantibus, vt nympheæ, papaueris, mandragoræ, hyoscyami & vnguento populeonis. Sed notandum, vt prius blando fotu aut in sessione ex lacte vtaris, ne corpore adhuc pleno humorem melancholicum sursum repellas, sicque maius detrimentum ingeras. Vbi denique dolor superat aut excedit, opii ij. aut iij. grana admiscantur, vel ð i. theriacæ recen. Sedato autem dolore, huiusmodi glans cum opio statim tolli debet, & pars calido fomento ad eius calorem excitandum foueri.

Idoneum vtendi tempus glandibus, si euacuationis causa indantur, erit horis aliquot à cibo sumpto.

De Clysteribus seu clysmatibus.

C.A.P. XIV.

CUm dictum fuerit de suppositoriis, quæ anointur, nunc de medicamento, quod infunditur,
D funditur,

funditur, & clystima nominatur, acturi sumus.

a 5. meth.
10.

Clyster in genere medicamenti genus est, quod liquidum intra partem aliquā corporis iniicitur. Proprie vero medicamentum, quod liquidum intra intestina per anum clystere iniicitur. Nam & medicamentum & ipsum instrumentum, quo medicamentum iniicitur, clystere dicitur, Galen. a. & ex Iurisconsulto Vlpiano l. item si obstetrix. D. ad l. Aquil. lib. 9. tit. 2. Si quis per vim aut suasu medicamentum alicui infundit, vel ore vel clystere, vel si eum unxit malo veneno, de lege aquilia eum teneri, quemadmodum obstetrix supponens tenetur &c. Græcis κλυστήρ ή κλυσήριον, κλύσμα, κλυσμός, nomine ab effectu deducto, ἀπὸ τοῦ κλύζειν, i. e. b. eluendo. Quare Latinis lotorium seu lauamen dicitur. Alii ut medicamentum ab instrumento distinguant, κλύσμα vocarunt, ut Dioscorides, κλυσματίον Hippocrat. Quibusdam ἔγκυσμα à modo etiam utendi. Actuarius secutus Dioscoridem & Galenum ἐνέματα, i. e. injectiones vocauit, ἀπὸ τοῦ ἐνέμι, quod infundere significat.

Instrumentum vero fuit Galeno, ut multis apud ipsum locis videre est, vesica, cui cornea, vel alterius materiae fistula (ut ex buxo) recta & perforata ad finem annexa erat. Nunc vero aliqui vesica, alii eius loco sacculo coriaceo, alii syringa utuntur.

Vesica tamen commodior est sacculo coriaceo, quia non ita commode comprehendi potest, nec ita certi sumus, utrum totum medicamentum sit injectum, sicut cum vesica utimur, quæ egregie manu comprehendi potest; Et syringa commodissima, quia per hanc vno quasi injectu medicamen-

dicamentum in annum protruditur. Huiusmodi
 remedii usurpandi occasio sumpta est ab aue qua-
 dam Aegypti, quæ Ibis vocatur, quæ si sponte non
 expurgetur, rostro hauriens aquam marinam, aut
 Nili per anum immittit, & intestina proluit, ut
 refert Plinius *b*, secutus Galenum contra Erasistra- *b lib. 8. c.*
 tum *c*. Quare ab Aegyptiis ad alios usus transla- *27.*
 tus, qui ungulo mente clysteribus utebantur, ob *c lib. de vet.*
 quam causam eos maxime sanos fuisse, Herodo- *sect.*
 tus *d* censet. Et sane omnis fere euacuationis inti- *d lib. 9.*
 tiū apud Gallos & Italos à clystere sumitur, quo-
 ties aluus non sponte soluitur, & morbus induci-
 as dat, siue medicamentum purgans exhibendum,
 siue vomitus promouendus, siue vena sit secanda,
 cum prohibeat, ne venæ sanguinis detractio-
 ne inanitas, tetrus vaporibus ab intestinis infician-
 tur. Sic etiam viam præbent medicamento,
 cum vomitus impedimenta subtrahant. Pau-
 ci enim morbi sunt, quorum curatio clystere
 non iuuetur. Medentur tamen præcipue cras-
 forum intestinorum vitiis: Superioribus enim
 vulneratis vtendum medicamentis per os assum-
 ptis, docente Galeno *e*, cum ea, quæ per sedem in- *e 3. meth.*
 iiciuntur, ad ea, quæ vicina sunt ventriculo, subire *11. 13. meth.*
 nequeant (propter valvulam intestini coli, quæ *17.*
 ilei foribus obiecta est, quemadmodum in nostris
 Anatomicis plenius demonstrauiamus. & Oribasi-
 us *f*. Scire debemus, clysterem non longius, quam ad colon *f B. coll. 36.*
 adscendere, neque educere quicquam posse eorum, quæ
 superioribus intestinis continentur.) Sic renum, vrete-
 rum, vesicæ, vteri, & c. enterii & viscerum vicinita-
 te. Aliis vero partibus ex consecutione utiles sunt.

g. 4. de
morb. & lib
de aere, a-
quis, & locis.

Pro varia autem clysteris facultate, variæ etiam sunt clysmatû differentia, cum iis vtamur ad aluû emolliendam, fecesque educendas, siquidem magnopere interfit ad valetudinem conseruandam, vt qualibet die aluus euacuetur, ex sententia Hippocratis g. vim etiam excretoriam sopitam excitandam, flatus discutiendos, omnis generis humores in intestinis cõtentos euacuandos, dolores sedandos, vlcera intestinorum detergenda, ficcanda, conglutinanda, aluum adstringendam, & denique ad alterandum pro varia medicamentorum, ex quibus constant, facultate.

h. 8. coll. 24.

Sic quidam purgant non tantum ab intestinis, sed etiam è partibus superioribus. Et qui purgant, horum alii vel euacuant simpliciter, alii reuelunt, alii deriuant: sunt denique & nutrientes. Quare clysteres duplices facimus, alios communes seu leniētes, alios acres, velut Rufus Ephesius: Alii molles sunt, alii acres, ex Oribasio h. Communes sunt, quibus ad emolliendam aluum, educendas feces, flatusque discutiendos, tormina sedanda, vlcera intestinorum abstergenda, & consolidanda, in vrinæ difficultatibus, vteri affectibus vtimur, & etiam ad abstergendum, post iniectum acre clyisma.

In componendo autē clysmate naturam imitatur, (siquidem Medicus debeat esse Naturæ minister) quæ ad faciliorem fecum excretionem, intestinorum superficiem internam muco, non autem, vt multi opinantur, adipe obduxit, ad eorum faciliorem descensum, & bilem partim ab epate, partim à vesica biliaria ad intestina per porum bilarium

larium ductum communem amandat, ad facultatem expultricem stimulantam, & pituitam detergendam. Sic clyisma conficientes paramus decoctum ad intestinorum ablutionem: addimus oleum vel butyrum, vel adipem, vel axungiam, ad eorundem lubricationem: miscemus mel vel saccharum rubrum, ad ea detergenda: & sal, ad facultatem expultricem irritandam. Purgantia deniq; medicamenta etiam adduntur, ybi maiore euacuatione opus est.

Hæc vero ad duo referri possunt, ita vt alia loco materiæ, alia sint loco condituræ, cum in confectioe clysmatum hæc duo requirantur.

In communibus loco materiæ est aqua communis, & Ruffus Ephesus ex sola aqua cōficit: Vel decoctum herbarum emollientium seu communium quatuor, quæ sunt, malua, althea, violaria, branca vrsina: seu ipsarum succedanea, parietaria, mercurialis, beta seu sicla & blitum: Vel decoctum hordei. Cum vero decoctum conficitur ex herbis, floribus, seminib. & radicibus, tum Herbarum dosis est à m. ij. ad iiij. Florum à p. ij. ad v. Seminum ab ʒj. β. ad ʒ β Radicum ab ʒ β ad ʒ ij. Loco condituræ mel, oleum, butyrum, pinguedo saccharum rubrum, sal. Dosis seu quantitas materiæ & condituræ variat pro ratione ætatis, sexus, magnitudinis corporum, sensus intestinorum, affectus, renum, vesicæ, vteri. Etenim decocti mensura puerulis infra medium annum, sunt ʒ iiij, vnius anni aut plurium à quartario j. ad ʒ vj. in adultis vero à lb. β. ad lb. j. β. nonnunquam in corporibus maioribus ad lb. ij. ascendimus. Sic in

D 3 mulie-

mulieribus maiorem, quam in viris requirit quantitatem Rufus Ephesius apud Oribasium, ita tamen, ut maxima quantitas non excedat heminas iij. i. e. ℥ xxx . Causa referri potest in facultatem expultricem, quæ in mulieribus magis imbecilla est: quare maiore irritatione indiget, & per consequens maiore copia danda. Dein quia uterus & vesica intestinalia dum comprimunt, clysterum transitum impediunt: quare necessum est copia clysmatis intestinalia aperiri.

i 12 meth.
p. ult.

Notandum, quod si interdum clysteres diutius retineri velimus, minorem decocti quantitatem sumendam, ut in clysmatibus, quæ dolores mitigant, quæ adstringunt, imitati Galenum i, qui in colicis doloribus ultra heminam, i. e. ℥ x . liquoris non sumit. Hæc dosis est ipsius decocti.

Condituræ vero dosis super dimidia parte minore esse debet. Quare sumitur sal à ℥ . β . ad ℥ j . olei vel butyri in puerulis ℥ j . in adultis ℥ iij . quidam etiã ad ℥ vj . ascendunt, & nimir. vnum tantum sumatur, ut oleum; mellis, vel sacchari rubri (eo quod maiore vi abstergerendi polleat) puerulis ab ℥ β . ad ℥ j . adultis ab ℥ j . ad ℥ iij . Prout enim alius magis vel minus est adstricta, aut vis expultrix magis minusve sopita, modo plus, modo minus condituræ additur. Solet etiam communitet vitellos quor. duos addere. At male faciunt ii, qui in clysteribus aluum lenientibus vitellos addunt, cum vitelli non emolliant, sed potius suo lentore impediant. His quidem uti licet, quando post assumpta medicamenta timetur, tum enim intestinalia abluenda sunt, ne ab humorum acrimonia lædan-

tur.

tur. His enim acrimonia mitigatur, at facultas humorum stimulan obtunditur.

Acres vero sunt, qui purgantia etiam recipiunt, quibus in variis affectibus utimur, ut capitis etiam soporiferis, angina, morbis pulmonum, arthritide, & praesertim ischiade. In his materiae mensura non facile lb. i. excedere debet, cum materia decocti valde acris sit, & periculum sit exulcerationis. Sic si decocto indantur purgantia simplicia, ut agaricus, turpetum, dosis sit a ℥ ij. ad iij, si folia sennae ab ℥ ss. ad ℥ j. Conditurae vero vel medicamentorum purgantium, blndiorum quidem, ut cassiae, catholici, hierae picrae ab ℥ ss. ad ℥ ij. vehementiorum vero, ut diaphenici, confectiois hamech, hierae logadii, benedictae laxativae, ab ℥ ss. ad ℥ i. ss. Verum hic notare convenit, ne sine ratione commisceantur olea communia, & pinguedines: siquidem his hebetatur aliorum medicamentorum facultas irritatrix.

Exempla subiiciamus. Clysmatum emollientium materia veteribus usitata fuit hydræleum, seu aqua calida cum oleo mixta, ut colligere est ex Oribasio. Aliquando mulsæ. Sic ad irritandum, aliquid nitri aut salis adiciebatur. Ita licet in omnium defectu solo oleo tepescato uti lb. i. iniiciendo, vel olei & butyri recentis an. lb. ss. Paratur etiam decoctum ex quatuor emollientibus herbis, quibus addere oportet, semina anisi, fœniculi, ad flatuum correctionem: flores item chamomeli, meliloti, hoc pacto:

D 4

℥. Qua-

℞. Quatuor herb. emollient. an. m. j.
 Radicas alth. vel lilior. albor. ℥ j.
 sem. fœniculi, anisi, an. ℥ ss.
 Flor. chamomel. meliloti, an. p. i. f. decoctio in
 s. q. aqua secundum artem.

℞. Decocti colati ℔. j. in quo dissolue
 mellis communis, sacchari
 rubri, an. ℥ j.

olei comm. ℥ iij. vel tantundem butyri.

Aliquando additur catholiconis vel electuarii de
 psyllio, vel cassiæ extractæ pro clysteribus ℥ j.

Aliquando in confectioe clysmatum loco decocti sumitur iusculum caponis seu carnis vitulina, veruecinæ (in ægris emaciatis vel senibus) in ℔. j. iusculi dissolue sacchari rub. ℥ ij. aut iij. butyri recent. tantundem.

Quibus vero ab usu medicamentorum purgantium alius adstricta est, diebus aliquot, vel quibus intestina natura sicciora sunt, iis parantur clysteres ex olei communis ℔. j. vel ex olei & decocti carniū pinguium an. ℔. ss. cum sacchari albi ℥ ij.

At ubi alius adstricta est in febribus, & lumborum æstus adest, ex emollientibus & refrigerantibus. exempl.

℞. Herbar. quatuor emollient. lactuca, endiu.
 an. m. j.

semin. quatuor frigidior. maior. an. ℥ iij.
 fœniculi ℥ ij. fiat decoctio in sero lactis.

℞. Decocti ℔. j.
 cassia pro clysteribus ℥ j. vel ℥ j. ss.
 sacchari rubri ℥ j. ss.

olei

De Compos. Medicam. Cap. 14. 57

olei violac, vel nenupharini ℥ iij. fiat
clyster.

℥. Decocti communis clysmatis & seri lactis
an. ℔. ℔.

Vel ubi maior intentio est refrigerandi:

℥. Serilactis ℔. j. dissolue
cassia ℥ j.

diapruni simpl. ℥ j. ℔.

sacchari rub. ℥. x.

olei violati. ℥ iij.

Nam in febribus mel misceri non debet.

In delicatioribus ex iusculo hordeaceo parari
poterit; his aluus emolliri, humores in intestinis
vel locis vicinis expurgari possunt.

Acres Clysteres.

NVnc ad acres, quorum materia est muria, a-
qua marina, decoctum fennæ, colocynth. in
petia ligatæ; alias intestina acrimonia vellicaren-
tur, & non tantum dolor colicus, sed etiam con-
uulsio sequeretur, imo etiam epilepsia: cnici, po-
lypodii succus, betæ, brassicæ. His enim à longin-
quo humores attrahimus.

Conficiuntur autem clysteres acres ex emolli-
entibus, additis calefacientibus, incidentibus, at-
tenuantibus, detergentibus, & iis, quæ partem af-
fectam & ipsum affectum respiciunt, vt ad apo-
plexiam

℥. Rad. lilior. albor. enulæ, ireos an. ℥ vj.
fol. betonica, origani, calamenthi, mercurial.
an. m. j.

D s sem.

Cassari Bauhini

*sem. alth. fœniculi, anisi, carthami (ad
emolliendum) an. ℥ iij.*

*summitatum anethi, rutæ, flor. chamomeli,
melioti an. p. i.*

fiat decocti ad ℔. i.

*In colatura dissolue, catholici & diaphenici
vel benedicti. laxat. vel hieræ diacolo-
quinth. an. ℥ vi.*

*mellis mercurial. sacchar. rub. an. ℥ i. β.
f. clyster sine oleo.*

Nam cum sensus sopitus sit, maiori purganti-
um dosi opus est ad facultatem expultricem inte-
stinorum irritandam, cuius irritationem oleum
prohibet: quod si oleo opus sit, oleum chamo-
melin. anethinum, rutac. sed antiquum el gen-
dum, & ℥ j. addi possunt. Sæpe eidem decocto
hellebori nigri ℥. β. vel ℥ i. additur, si succus me-
lancholicus abundet: si vero pituita, ℥ β. agarici
in nodulo ligati & parum in decocto cocti vel
putocoloquin. ℥ ii. aut iij. salis aliquando ℥ ii. aut
iii. ad maiorem irritationem etiam adduntur.

Ad affectus oculorum & aurium conditurę lo-
co erit catholicum, diaprunum solutivum, dia-
phenicum, confectio hamech, mel mercuriale. A-
prioribus vtendum non est, cum sensus sopiti non
sint, quemadmodum neq; in orthopnoea.

Ad ischiadem idem clyma, quod ad affectus so-
porosos vtile, additis nervos roborantib. Vbi ve-
ro humor morbum caussans coquendus, dolorq;
mitigandus, vel si feces induratae sint, tum ab e-
mollientibus, concoquentibus & anodynis inci-
piendum, hoc modo:

℥. Ra-

℞. Radic. lilior. altheæ, an. ℥ i.
 herb. parietaria. flor. chamomel. meliloti,
 anethi, an. man. i,
 semin. lini, fœnugr. fœniculi an ℥ iii.
 f. decoctio in aqua communi ad ℔ i.
 In co'atura dissolue, olei chamom. ℥ iii.
 Cathol, cap. extracta, an. ℥ vi.
 sacchari rubri, mellis communis, an. ℥ i.
 f. clyster.

Vbi vero humor præpatatus, & ob metum de-
 fluxionis in partem affectam, per os tuto expurga-
 ri non potest, clyster acrior sic conficitur:

℞. Rad. lilior. fenulæ, galangæ, an. ℥ vi. vel
 ℥ i.
 fol. saluie. centaur. minor. hyperici, chame-
 dreos, hamapyt. absynth. an. m. i.
 pulpa coloquint. in nodulo ligata ℥ ii. vel iii.
 agarici. ℥ ss.
 sem. fœnicul. cumini an. ℥ ss.
 summitatum chamom. meliloti. rosar. an.
 p. i. f. decoctio ad ℔ i.
 In huiusmodi colatnra dissolue, Benedict.
 laxat. mellis mercurialis, sacchar. ru-
 bri an ℥ x.
 fiat clyster sine oleo:

Quod si æger non satis diu contineat, addes o-
 lea, quæ nervos & articulos respiciunt, vt sunt
 vulpini vel irini ℥ ii. Sic etiam loco coloquinth.
 addi potest hieræ, diacoloquinth. ad ℥ iii. vel mel
 anacardinum, sed minori dosi, quam mellis
 mercurialis. In defectu mellis mercurialis, suc-
 cus mercurialis ad ℥ ii. vel iii. misceri potest.

Anody

Anodynorum clysmatum varia sunt genera, quæ si acrimonia humoris biliosi sponte moti, vel à medicamēto purgante intestina vellicante ad acrimoniam leniendam parentur, delicatioribus quidem ex ℞. j. lactis vaccini ℥ ij. vel iij. sacchari albi, vitello oui j. olei rosati ℥ ij. Aliquando in lacte radices altheæ decoquuntur, idque vbi motus est dysenterix: suo enim lentore intestina oblinunt. Interdum vbi deterfione opus est, hordei integri m. j. additur, & si ardor intestinis sit, semen cydoniorum (propter suam mucilaginem) & papaueris (propter frigiditatem) hoc modo:

℞. Rad. alth. ℥ ℞.

hordei intergri. m. j.

semin. cydon. papau. albi. an. ℥ iij.

sem. fœnicul. ℥ ij.

f. decoctio in lacte ad quartana iij.

in colatura dissolue, sacchari albi ℥ ij.

vel si maiore deterfione opus est, & sensus
intestinorum sit hebetior, mellis rosat.
℥ j. ℞.

vitella onorum numero ij. addantur.

Vbi dolores intestinorum circa vmbilicum molestant, & prædictum vel simile clyσμα non proficiat, paretur ex decocto intestinorum, incoctis simplicibus causæ doloris contrariis, vt si fiant ab intemperie sicca, incoquantur althea tota, radix liliiorum, flores chamom. meliloti, anethi, additis emollientibus cassia, catholic. item adipe gallinæ, anseris, butyro & similibus.

Vbi vero dolor à flatu & pituita intestina molestat, primum quidem feces euacuare oportet, addi-

additis tamen flatus discutientibus, vt:

- ℞. Decocti communis clysteris q. s. in quo deco-
que sem. anisi, fœniculi, cumini an. ℥ iij.
℞. Colatura circiter ℔ i. dissolue.
catholic. & benedict. laxatiu. vel hiera
simpl. vel diaphenici an. ℥ ℔.
mellis anthosati, sacchari rubri an. ℥ x.
olei anethini, & amygdal. amarat. an.
℥ i. ℔. fiat clyster.

Hoc reiecto & dolore adhuc vrgente, alius in-
iiciendus ex carminatiuis (id est, flatus discutien-
tibus) Exemplum:

- ℞. Rad. lilior. enula, vel gentianæ vel Zedo-
ria, angelica vel ireos an. ℥ ℔.
origani, hysopi, maioran. mercurialis. an.
m. i.
sem. lini, fœnugr. cumini, dauci, an. ℥ ii.
flor. chamomel. meliloti. folior. ruta an. p. i.
f. decoctio, in colatura dissolue,
vini generosi ℥ iiii.
olei aneth. ruta, an. ℥ i. ℔. fiat clyster.

Nonnunquam ex solo vino maluatico, vel vi-
no aromatico, vel alio generoso, addito oleo nu-
cum, vel laurino, & anethino, vt:

- ℞. Vini aromatici, & olei nucum an. ℔ ℔.
confectionis de baccis lauri ℥ ℔. f. clyster.

Aduertendum tamen, vbi intestina à flatibus
distenduntur, non requirit tantam decocti quan-
tatem, quanta in emollientibus, ne intestina ma-
gis distendantur. Quare decocti dosis erit à quar-
tariis tribus ad ℔ i. Nonnunquam propter nimi-
am intestinorum à flatibus distensionem & mu-
sculorum

sculorum abdominis constrictionem clysteres injecti retinentur, & tum dolores augentur. Quare in tali casu, alius suppositorio sollicitanda, aut clystere acriore, qui duplam purgantium quantitatem recipiat, quale pro apoplexia propositum fuit, addito tamen etiā vino. Si his dolor non cedat, philonii Romani exacte dissoluti ℥ ij. & ℥ i. vel ℥ i. β. castorii additur.

Quod si à pituita vitrea dolor intestinorum caussetur, nephriticum dolorem mentietur, tum parabuntur ex prædictis radicib. & seminib. additis radicib. turpeti ℥ ij. Zz Θ i. dissoluetur hiera picra, confectio de baccis lauri, mel mercuriale, aut anacardinū, non omissio vino & oleo de castorio.

Si vero à bile caussatus sit dolor, utilis hic erit:

℥ Rad. & folior. althea. ℥ i.
 malua, violar. lactuc. endiu. portulac. an.
 m. i.
 quatuor. sem. frigidor. maior. papau. albi,
 anisi, an. ℥ ii.
 florum chamom. meliloti, an. p. i.
 f. decoctio in aqua aut lacte, vel sero lactis
 In colatura dissolue, cassia ℥ i.
 mellis violac. aut rosac. an. ℥ i. β.
 mucilag. sem. psyllii, tydon. extract. in a-
 qua chamomel. an. ℥ vi.
 olei violacei ℥ ii. fiat clyster.

Ad voluulum clysteres primo emollientes & leuiter detergentes iniiciendi sunt: Deinde vero euacuatis intestinis ad sedandum dolorem & inflammationem mitigandam ex lacte recēs mulso cum saccharo, melle, oleo violac. conficitur. exempli gratia.

℥ her-

- ℞. Herbar. emollientium an. m. i.
parietaria, portulac. an. m. ℞.
prunor. damascen. paussular. mundatar.
an. nr. xii.
ficus pingues concis. nr. ij.
hordei mundat. m. ℞.
semin. altheæ, fœniculi, an. ℥ iii. in lb. i.
colatura dissolue, cassia. ℥ x.
olei violar. & amygdal. dulcium an. ℥ i. ℞.
f. clyster.

Si vero ardor intestina molester, parabitur ex hordeato confecto cum seminibus frigidis, additis oleis refrigerantibus. At si humor sit præternaturam, ex æto principio & incremento leuiter detergentibus & detergentibus opus est, v. est decoctum radic. altheæ, fol. thapsi barbati, hordei integri, fursuris, sem. lini, fœnugr. butyro, oleo, chamom. amygdal. dulc. anethino & similibus.

Ad dysenteriam parantur alii quidem anodynini & detergentes, si dolor nimium non virgeat, à detergentibus incipiendum, dein anodynini iniiciendi, tum adstringentes, qui vel sanguinem sistant, vel qui conglutinent, vel qui dolorem simul leniant, detergent & adstringant.

Anodynini fiunt ex lactis quartar. iij. oui vitellis ij. sacchari rosati ℥ ij. plerumque lacti incoquiuntur rad. & folia altheæ, & semin. papau. albi. Plerumque fiunt ex hordeato diluto, addito oui vitello vel ex solo lacte recens mulso cum vitello oui. Detergentis exemplum.

- ℞. Hordei integri, fursuris, an. m. i.
rad. altheæ. ℥ j.

flor.

flor. meliloti, rosar. rubrar. an. p. i.

sem. anisi. ℥ ij.

f. decoctio in lacte chalybeato ad quart. iij.

vel ℥. j. dissolue.

mellis rosati ℥ i. β.

(blande enim abstergit & detergit.)

vel sacchari rosati tantundem, vitellos ouor.

ij. f. clyster.

Hoc loco notandum, oleum non esse addendum; Vbi enim vlcus est, ab oleo abstinendum: siquidem oleum, Galeno docente, vlceribus sit inimicum, cum olea ipsa vlcera sordida reddant. Intentio autem in curatione vlcerum est abstergere & post abstersionem consolidare. Verum cum in dysenteria clysteres citissime reiiciantur, ideo Medicus aliud clyisma ad manus habeat, quod iniiciatur.

Quod si dysenteria à pituita caussetur, validioribus detergentibus opus est. Quare ad prædicta addi possunt ciceres, lupini, lentes an. m. i. Post deterfionem & doloris mitigationem adstringentibus vtendum, vt sunt consolida maior, bistorta, folia plantaginis, bursæ pastoris, polygoni, equiseti, vrticæ mortuæ, cupressi. flor. rosar. fructus pyror. mespilor. cydonior. mala syluestria, mespila sorba, corna, oxyacantha, semin. psyllii, plantagin. portulac. cydon. cortex quern. granator. sumach, oryza, amyllum. Horum aliqua incoquantur lacti chalybeato, ad ℥. j. dissoluitur adeps hircinus, caprinus, axung. suilla, & harum dosis est ab ℥ β. ad ℥ ii. vel iii. tantundem succi plantag. bursæ pastor. mucilag. sem. psyllii, cydonior. tragacanth. extract.

tract. in aqua rosarum, plantag. folani cydonior,
eadem quantitate, syrup. myrtillor. granator. por-
tulace eadem dosi, boli armen. terræ sigillatæ, san-
guinis draconis à ℥ i. ad ℥ iii. Ita tamen, ut pulue-
res hi supra marmor diligenter læuigentur, ne a-
speritate sua intestinis molesti sint, albumina o-
uorum exacte conquassata, ut liquecant. Exem-
plo rem demonstremus.

℥. Rad. consolid. maior. ℥ j.
rad. alth. ℥ ss.
thapsi barbati, plantag. vtriusque, polygoni,
equiseti, an. m. j.
sem. cydonior ℥ ss.
flor. meliloti, rosar. rub. an. m. ss.
decoq. in lacte chalybeato: In colatura quar-
tariis iij.
dissolue, adipis hircini ℥ i. ss.
succiplantagin. ℥ ii.
vitellos ouor. nr. ii. f. clyster.

Efficacioris exemplum.

℥. Rad. consol. mai. bistort. an. ℥ i.
rad. althea ℥ ss.
gallar. quercinar. vel nucis cupressi vel balau-
stiarum ℥ ij.
folior. plantag. verbasci an. m. i.
oryza ℥ ss.
sem. psyllii, cydonior. portulacæ an. ℥ ii.
flor. meliloti, rosar. rubr. an. m. i.
fiat decoctio in lacte. in colatur. ℥ i.
dissolue, adipis hircini ℥ ii.
mucilag. sem. cydon. in aq. rosar. extract. ℥ i.
oua integra ii.

E

ita

ita tamen, vt exacte conquassentur, vt in a-
quam resoluantur. f. clyster.

Aliquando simul lenire & adstringere opus est,
tum tale clyfina conuenit:

℞. Lactis chalybeati vel decocti capitis veruecini in
aq. plantag. loti ℥. i. dissolue
vitell. ou. r. iij.

succi plantag. & polygoni an. ℥ j. ℞.
adipis hircini ℥ ij. f. clyster.

Vbi vero sanguis purus excernitur:

℞. Lactis chalybeati q. s. in quo bulliant thapsi bar-
bati plantag. vtriusque, polygoni, cauda equine,
bursa pastoris, vrtica mortua an. m. j.

sem. cydonior. plantag. an. ℥ ij.

rosar. rub. p. i.

in colatura ℥ j. dissolue,

adipis hircini, succi plantaginis an. ℥ j. ℞.

boli arm. loti in aq. rosar. ℥ ij.

trochiscor. de carabe ℥ j.

amyli ℥ ℞. f. clyster.

Eodem vti possumus ad vlceris agglutinationem,
sed tum temporis non tam crebro iniiciendi, ne
natura, quæ carnis regenerationi incumbit, im-
pediatur. Si ab humorum prauitate maligna vlce-
ra & depascentia intestina exedunt, ad efficaciora
detergentia & exsiccantia accedendum, proinde
decoctum ex lapinis, lentibus, cicerib. rubris, ros.
rubris, absynthio cū oxymelite diluto parabitur.
Vel si dolor grauis est, et aqua chalybeata & tan-
tillo vini; atq; in decocto Ægyptiacum dissoluen-
dum: opii gr. j. vel ij. additis. Laudatur quinetiam,
si lac recens mulsum iniiciatur. Fiunt etiā clysteres
ex mu-

ex muria & vino vel vrina pueri, quæ potenter detergit, sed cum propter acrimoniam dolor maior excitari possit, potius ea, quæ leniunt, adhibenda, ut lac recens inlsum.

Ad lumbricos; sunt, qui conficiunt ex lupinis, abrotano, centaurio paruo, absynthio, aristolochia, cichorio & similibus amaris in vino generoso, si febris absit, decoctis: Vel decoquunt in lacte admiscentes portionem vini, addentes oleum amygdal. amar. Existimant enim amaritudine lumbricos necari, enecatos vna cū clystere reici, & quæ inquirunt, dulcib. delectantur, fieri debet clysteres ex lacte & saccharo, quo dulcedine allecti simul excernantur: iubent autem tum temporis per os aliquid amari exhibere, ut puluere vulgare contra vermes, qui ex semine santonici componitur. Exemplum: Clyisma puerulis lumbricis laborantibus tale esto:

℞. Hordei mund. p. j. ficium par x.

sem. anisi ℥ j. decoctis in aqua secundum artem, in colatura quartarii j.

mellis vel sacchari ℥ iij. dissoluantur absque oleo vel sale, vel amaris, cum vermes hæc fugiant.

Quo tempore etiā per os licebit aliquid exhibere.

In hydropse etiam clysteribus utimur, maxime ubi feces induratae sunt. Quare in ascite ex exsiccantib. & aquam ducētib. non autē laxantibus, nisi parua quantitate admixtis, ad feces emolliendas, decoctum paratur ex radicibus ireos, enulae, asari, herbis centaurii parui, hyssop. calamenth. seminibus calidis, granis ebuli, sambuci, cataputiae. In decocto dissoluendum diaphenicum, benedicta laxatiua, mel mercuriale.

E 2

Ad

Ad tympanitidem vero vtilia erunt ea, quæ in flatulenta colica proposuimus, addito tamen vino generoso, Cum vero hæ duæ hydropis species sæpius complicatæ sint, ex flatu discutientibus, & hydragogis conficiendi. Sic in tertia hydropis specie proderunt clysteres in soporosis capitis affectibus vtilis.

Ad vesicæ affectus: Cum vesica intestino & vicina & connata sit, vbi inflammatio vesicam vexabit, vtilis erunt ii, de quibus in iliaca passione. Si vero flatibus distenta urinæ excretionem impediat, proderit clyisma ex oleo cum seminib. cumini, fœniculi, rutæ. Si propter urinæ copiam suppressa sit vrina, clyster expultricem facultatem eucitans iniiciatur, vt ex aloë pura, cyclaminis succo, sed pauca quantitate & clysteris cornu breuiore.

Ad nephriticum dolorem à calculo causatum in ductu vreteris hærente, tum clyster emolliens & anodynus iniiciendus est ex decoct. rad. lilior. althææ, herbarum emollientium cum $\frac{3}{4}$ i. cassiæ, electuarii de psyllio, saccharo rubro, oleo violato, & amygdal. dulcium. Quo reiecto, dolor si perseveret, alter iniiciendus ex olei sem. lini & olei comm. an. tb. β. terebinth. Venetæ. sacchari rubri an. $\frac{3}{4}$ i. hic enim emollit, dilatat, dolorem lenit. Sed & hîc parua quantitas requiritur, ne intestinum distentum, renem grauius premendo dolorem augeat. Si vero cum urinæ suppressione à pituita crassa & viscida dolor causatus sit, parabitur ex emollientibus, calefacientibus, incidentibus, vt,

℥. Rad.

℞. Rad. lilior. altheæ, ireos an. ʒ vi.
 petroselini, fœniculi, opii, an. ʒ ʒ.
 origani, calamenth. pulegii, rutæ, an. m. i.
 Baccar. lauri, iunipi an. ʒ ii.
 sem. cumini, dauci an. ʒ iii.
 flor. chamomel. meliloti, an p. i.
 in decocti quartariis iii. d. ssolue,
 benedicta laxat. mellis anthosati an. ʒ i.
 olei lilior. anethi, an. ʒ i.
 terebinthin. ʒ i. f. clyster.

Quod si renum dolor ab inflammatione causatur, refrigerante & leuiter molliente utemur, quale est, quod conficitur ex malua, violaria, lactuca, endiu. portulac. seminibus frigidis maioribus. semin. papau. addita cassia, saccharo rubro, oleo nenupharino & violarum. Facillimum erit ex olei violac. nenuphar. amygdal. dulc. an. quartario i, at sacchari rosati ʒ i.

Ad vterum flatu distentum dolentemque, cum consensus sit coli cum vtero, valebit clyster in colica flatulenta præscriptus, ita tamen, vt hysterica addantur, qualia sunt; matricaria, artemisia, nepeta, hyssopus, aristolochia, & in eo decocto dissoluenda hiera, benedicta laxatiua, olea calida antiqua, mithridatii etiam aliquid.

Ad eiusdem vero inflammationem parabitur ex decocto refrigerante, in quo dissoluta sint mucilago semin. cydonior. psyllii extract. in aqua nymphææ vel solani, vel plantaginis, additis oleo rosar. violac. papauerino, nenupharino, cuiusmodi in dolore intestinor. à bile proposuimus.

Si tumor durus vterum molester, parabitur ex decocto emolliente, ex aqua vel iusculo pingui, vel oleo, dissoluantur in decocto butyrum, adeps, axungia, medulla vituli, gummata, vt styrax, opopanax, ammoniacum in vino dulci aut oleo conuenienti, lilior. irino, dissoluta.

a 8. coll. 38.

b de usu
partium.

Clysteres etiā nutriendos in usum veniunt. Eos namque nutrire Græci, inter quos Oribasius a, Arabes, Celsus, Aurelianus, statuunt. Quorum vltus in passione cardiaca, cardiogmo, vomitione asidua, virium imbecillitate, & vbi æger ab omni alimento abhorret: siquidem intestinis vim aliquam concoquendi Galenus b tribuerit, & etiam ad intestinum colon venæ mesaraicæ feratur, quæ alimentum rapere possunt. Quare si febris absit, parabuntur ex decocto caponis, carnibus veruecinis, vitulinis præparatis vel coctis cū herbis conuenientibus, addito vino & saccharo, exempli gratia:

℞. Decocti vel iusculi carniū quartaria iij.
seu lb. i.

vini ℥ iij.

sacchari albi. ℥ ss.

Aduertendum, ne nimia sacchari quantitate pecces, siquidem ad excretionem irritet. Hos vero clysteres retineri oporteat; Potest addi vitell. oui; vel ex hordeato deluto parabuntur, addita parte vini, vel gelatina liquefacta ex vino. Si vero febris adsit, cum capone coquendum hordeum mundatum, lactuca, portulaca, endiuia, acetosa, quatuor semina frigida maiora, additis etiam florib. borrag. buglossi, violar. Decocto addemus cantillam sacchari & oui vitellum.

Quod

Quod si febris magna non sit, nec capitis dolor
vrgeat, solum lac vaccinum recens mulsum cum
pauco saccharo iniicitur. Hi vero clysteres non
iniiciendi, nisi præmissis alio clystere, qui aluum
repurgarit: & quidem ex iusculo pingui cum sac-
charo vel melle, vel butyro.

Verum in iniectione clysmatū nutrientium, vt
recte Oribasius c monet, debet fistula clysteris (ipse
appellat coruu) quam longissima esse, & clyster vi
maxima iniici, quo ad partes superiores quam
maxime ascendat. c 8. coll. 25.

Ceterum quod clysteres in vniuersum attinet,
iniectionisq; tempus non nisi tribus vel quatuor
horis à cibo iniici debent, ne ab iis chylus crudus
rapiatur, coctio & distributio labefactetur; deinde
clysteres non nimium calidi iniiciendi, siquidem
clysterum operatio frustretur tribus modis, vt
recte Oribasius d: Vel quia non reiciuntur, vel
quia non retinentur; vel quia reddi non possunt. d 8. coll. 32.
Quæ contingunt modo propter malam admini-
strationem, modo propter morbū aliquē. Si pro-
pter malā administrationē id fit, vel quia nimis est
calidus actu, vel quia nimium salis habet, aut quia
nihil, aut quia nō est ea quantitas, quæ necessaria
est. Sic si fistula in stercus coniiciatur, tū foramen
obstruitur, vel si in aliquod latus inclinauerit, &
non recta iniiciatur: vel cū vesica plena est lotio.
Si propter morbum, vri cum inflammatio aut tu-
mor in ano est. Quare vt recte iniiciantur, nimi-
um calidi esse non debent, sed modo frigoris
sensum non inuehant, commodi erunt. Sed vera
proba, si is, qui iniecturus est, digito clysmati

E 4

indico

indito vel digitis affuso clysmatis materiam recte ferre potest. Tertio paulatim iniici debet, ne æger molestia afficiatur. Et hac ratione ea pars clysteris, quæ primo injecta fuerit, paulatim feces humectabit, sed & is, qui clysteré iniicit, semper inanem clysteris partem vel vesicam conuoluere, i.e. inuertere & circūuertere debet, ne clyster ex ipso ventre in clysteris vas recurat. Notandum insuper, nonnunquam ob copiosiores flatus intestino inclusos clysmatis materiam repelli, & non intro-mitti. Quare si vesica vtaris, acicula eam perforare poteris. Sic enim absque difficultate clyσμα in-fundes. Quin etiam situs obseruandus est & quidem ex Mundini & Fernelii sententia, æger in dextrum latus decumbere debet: secundum Auicennam decubitus supinus sit, ita tamē, monente Aegineta, vt crura sursum eleuet: deinde in latus, quod dolet, se conuertat.

Secundum vero Rhasin in sinistrum latus, aut supinus decumbere debet. Sed cum tales decubitus non sint vtiles, censemus parum referre, quocunque decubitu immittas, dummodo decumbenti sit optabilior, siquidem intestina à mesenterio suspensa detineantur, vt quocunque decubitu clyster indi possit nullo incommodo ob decubitus orto. Deinde fugiendus nimis frequens clysterum vsus, purgantiū præsertim, quia facultatem intestinorum expultricem se-gnem reddunt, dein distributio-nem chyli impe-diunt.

De

De iniectionibus in aures.

C A P. X V.

Dictum fuit de iniectionibus, quæ in anum fiunt, quæ communiter clysmata & enemata dicuntur. Nunc de iniectionibus, quæ in aures, penem, vesicam & vterum fiunt. Quibus communiter iniectionis nomen tribuitur, rarissime clysmatis, vel clysteris, etsi cum prædictis & nomine & materiæ consistentia, & usu aliquo modo conveniant.

Iniectiones autem, quæ in aures fiunt, & nonnunquam clysmata auricularia dicuntur, fiunt ad sedandum dolorem, quæ pro varietate causæ dolorum variant. Si enim ab inflammatione causetur, fiunt ex succis herbarum refrigerantium depuratis (Succus is dicitur, qui exprimitur, & post aliquam consistentiam eius residentia abiicitur) vt lactucæ, violar. portulacæ; Vel ex aquis stillatitiis rosar. violar. nymphaeæ, hyoscyami, papau; aliqui tamen & olea addunt, rosac. violac. nenuphar. Vel aqua & oleum simul miscentur, vt:

℞. Succor. defecator. lactucæ, portulacæ, violar.
an. ʒ ss.

aq. rosar. nenuphar. an. ʒ iii. misceantur &
in aurem infundantur. Vel

℞. olei violacei, rosac. nymphaeæ an. ʒ ss. misce,
iniiciantur in aurem.

Verum iniectione facta auris obturetur bom-
bace, & post horæ quadrantem, vel semihoram
purgetur; noua quinetiam iniectio fiat. Aduer-
tendum

tendum tamen in incremento non tantum refrigerandum ac reperiendum, sed etiam simul digerendum esse. Quare in augmento solum oleum rosace. vsurpandum, & in statu. In declinatione vero in oleo prædicto quædam resoluenda incoquenda, hoc modo:

℞. Flor. chamomel. meliloti, an. p. i.
sem. fœniculi ℥ i.
decoque in oleo rosaceo vel violaceo.
Expressioni adde croci momentum & vini
tantillum.

Quod si dolor sæuissimus à caussa calida ortus irgeat, parabitur ex lacte vaccino recens mulso, vel lacte muliebri è mamma iniecto, vel ex decocto refrigerante, addito croci gr. i. aut. ii. Et si intensissimus sit dolor, licet opii gr. i. addere. Verum stupefacto partis sensu & dolore sublato, ne noxa ex opii vsu contingat, oportet infundere parum olei de castorio cum vino.

Si vero à caussa frigida dolor oriatur, siue cum tinnitu, siue citra sonum, iniectiones fiunt ex oleis calidis, chamomelino, anethino, amygdal. amararum, de castorio, vt si duorum aut trium ex his misceas ℥ ss. aut ℥ i. addendo aquæ vitæ ℥ ii. Ex his guttæ aliquot calidæ iniiciuntur in aurem quater aut quinquies in die, & auris bombace obturatur. Vel si prædicta olea defint:

℞. oleor. rutac. amygdal. amarar. an. ℥ i.
garyoph. nucis mosch. an. ℥ i.
sem. anisi, dauci, an. ℥ ii.
bulliant simul ad mediæ partis absumptionem.

f. ex-

f. expressio, cui adde tantillum aq. vitæ, vel
vini generosi,

Vel,

℞. Oleor. amygd. amarar. ruta, de castorio an. ℥ ij
aq. vitæ, ℥ j. ℞.
bulliant ad consumptionem aquæ.

Vel,

℞. Rad. cyclam. tenuissime trita, ℔. ℞.
bulliat in ℥ iij.
olei anethini, rutæ. & irini ad consumptio-
nē media partis. f. expressio pro iniectione.

Post vsum iniectionum auris etiam purganda
& exiccanda admoto pane calido. Fiunt etiam
aures plerumque purulentæ & saniosæ: proinde
detergendæ & exiccandæ erunt: quod præstabi-
tur iniectione hydromelitis calentis, vel succo
herbarum detergentium, vt agrimon. absynth.
centatur. minor. porri & similia. Sed post illo-
tum vsum auris exiccanda vapore ex vino, in quo
decocta sint calefacientia & exiccantia prædicta.
Detergentes etiam iniectiones fiunt ex oxymeli-
te, syrupo de absynth. de ros. siccis.

Quod si vero vermes aures infestent, parabi-
tur iniectio ex simplicibus amaris supra contra
lumbricos propositis.

De iniectionibus in vrethram siue penem.

CAP. XVI.

MEmbri virilis canalis seu vretra, quemad-
modum etiam collū vesicæ nō raro ab vrine
ardore ob humorū acriū permixtionem vexatur,
nonnunquā etiā ob seminis fluxum exulceratur.

Sig

Sic etiam à calculo aspero lædatur. Quare ex anodynis doloremve mitigantibus iniectiones fiunt, vt ex lacte vaccino vel per se recens mullo, vel calente: Vel etiam in lacte decoquuntur rad. altheæ, semen lini; & si calor virgeat, semina papau. albi & quatuor frigida maiora, hordeum mundatum, incoquuntur. Quod si intensissimus sit dolor, ad partis sensum stupefaciendum radix mandragoræ additur. Sic etiam cum hordeo mundato, & sem. papau. albi, iuiubæ & sebesten aquæ, sed rectius lacti (ob suum lentorem, quo illinire potest) incoquuntur. Decoctum etiam altheæ, maluæ, violariæ, lactucæ, portulacæ, prodest. Vbi vero & dolorem lenire & simul detergere volumus, ad lb. β. lactis, sacchari ros. ℥ i. addimus; vel ex decocto rad. altheæ, verbasco, hord. integr. in lacte decoctis & in colatura trochis. alborum Rhañs, sine opio, super marmor læuigatorum ℥ ij. aut iij. dissolutis iniectiones fiunt. Aliquando eadem incoquuntur aquæ, in qua plumbum calens extinctum fuerit. Et si dolor intensior virgeat, iidem trochisci cum opio parati dissoluuntur, aut radix mandragoræ incoquitur. Cauendum tamen studiose, ne quando purulenta materia (vel sordes similes puri) effluunt, narcoticis vtamur, siquidem hæc retenta acriora reddantur. Vbi vero exiccatione & consolidatione opus est, radix bistortæ, folia plantag. bursæ pastoris, polygoni in aqua, in qua vel plumbum, vel ferrum extinctum sit, decoquenda sunt. Hyemali tempore deficientibus plantis, ex earūdem aquis stillatitiis iniectiones fiunt. Quod si maiore opus sit exiccatione, pulue-

pulveres aliqui cum decocto vel aquis stillatitiis
mificentur, per incerniculum colantur, ne si forte
aliquid asperiusculi remaneat, id parti adhæren-
do dolorem cauisset. Exemplum:

℞. Tutie preparatae ℥ ss.

sarcocolla lota in aq. rosar. vel solani, albes he-
pat. sacchar. candid. an. ℥ iij. misce.

fiat pulvis tenuissimus, cuius ℥ i. cum lacte
muliebri vel caprino infundatur.

Fieri autem possunt iniectiones quotidie ter
aut quater. Vigente autem sæuissimo dolore, æ-
ger perpetuo penem in lacte tepido contineat.

De iniectionibus in uterum.

C A P. XVII.

VTeri collum, quemadmodum & ipsius fun-
dus ab acris humoribus exulcerari potest;
Sæpe etiam à difficili partu aliisve causis dolor
causatur, quare etiam iniectiones ad doloris mi-
tigationem, fiunt.

Fiunt autem per instrumentum syringæ simi-
le, quod Galeno *μητρειχύτης*, a *μηρὸς* & *ἐχχῶ*, id est, in
uterum effundo, dicitur. Fiunt autem similes præ-
dictis iniectiones. Quod si acrimonia & etiam
exulceratio maior sit, iniectio ex albuminibus o-
uorum, tamdiu conquassatorum, quoad in a-
quam soluantur, cum aq. rosarum efficacissima
erit. Quod si dolores ab humore aquoso & frigi-
do causentur, iniectio ex vino & calidis oleis, ut
oleo nardino, irino, hypericonis parabitur. Quod
si vlcus adsit, ex oleo vitell. ouor.

Si ve-

Si vero flatus vterum distendendo dolorem
causserint, iniectio ex decocto discutientium cum
vino dulci additis oleis discutientibus, proderit.

Ad menses vero suppressos in mulieribus ex
decocto rad. aperitiuar. ireos, rubiæ maioris, ari-
stoloch. herbis quinetiam vtero appropriatis, vt
nepeta, matricaria, arthemisia, calamintha, hyssop-
po, origano, chamomelo, seminibus calidis, florib.
odoratis vt spicæ nardi conficietur, cuius decocti
℔b. ℥. cum ℥j. aut ij. vini albi vtero iniicitur. Vel ex
succis earundem herbarum defecatis siue depura-
tis cum vino extractis, oleo nardino addito.

Ad menses vero sistendos parabitur ex deco-
cto adstringente, vt rad. symphyti maioris, bistor-
tæ, plantagine, cauda equina, & similibus in de-
cocti ℔b. ℥. dissoluantur trochisci de terra sigillata,
seu bolo seu de carabe, subtilissime puluerizatis
℥ ii. vel iii. Vel si mauis, tantundem terræ sigilla-
tæ, boli, sanguin. draconis. Vel fiant ex succis ea-
rundem herbarum cum vino extractis, (ab aceto
vero cauendum) hoc modo:

℥. Succor. plantag. polygon. depurator. an.
quart. i.

sanguin. dracon. boli armen. trochiscorum
de carabe an. ℥. i. tepide iniiciantur.

Si vero vlcus sit detergendum, parabitur ex de-
cocto hordei, agrimonie, plantaginis, in quo dis-
soluetur saccharum rosat. vel syrup. ex ros. siccis
vel de absynthio, & quidem sacchari quarta
pars sit, syrupi vero tertia.

Si vero & dolor vrgeat, anodyna incoquenda
erunt, vt althææ. Si vero sine dolore & sine sangui-
nis

his profusione, addantur lupini, cicetes rubri, absinthium, centaureum & similia amara, in æquis partibus aquæ & vini, vel hydromelite decoctis.

At vlcerè purulento & fœtido nonnihil Ægyptiaci cum melle rosat. dissoluetur. Si tumor adfit, fiunt ex mollientibus & laxatibus, iusculo pingui carniū incoctis, in quo butyrum, adipēs, axungia, medullæ conuenientes, oleum nardinum, styrax, opopanax, bdellium dissoluendum. Nonnunquam ad sterilitatem tollendam, quæ à laxiore vteri orificio caussatur, semen virile intromissum non retinente, ex adstringentibus, vt decocto rad. bistortæ, corticis mali granati, menthæ siccæ, nucum cupressi, balaustior. galla, decoctis in vino adstringente, additis syrups vel succis adstringentibus, vt plantag. (sunt &, qui aluminis aliquid nonnunquam addant) iniectiones fiunt. Sic denique iniectiones ad vlcera, quæ in sinu pudoris fiunt, similes esse debent iniectionibus, quæ in vesicæ vlceribus vsurpantur.

De Syrupis.

C A P. XVIII.

Syrupus à recentioribus Græcis, ut A&uario ^{*a*} ^{*s. meth.*} ^{*α*} ^{*συντάξις*} ab Arabicis Sechaniabin dicitur: licet Nicolaus Myrepsⁱ. syrupos ^{*δρῶσιτα*} nominarit, de quibus integram sectionem 8. scripsit. Volunt aliqui, syrupos dictos, vel quasi οὐ ἀπὸ τῆς συρίας ὀνομα, quod ex Syria primo delati credantur, vel ὡς συνέναντες ὀνομα, quanquam pauci trahendi vi præditi fuerint. Est autem syrupus *medicamentum liquida consistens*.

sistentia, quod dum fluit, continuitatem non abrumpit, ex decoctis plantarum cum melle, vel saccharo eliquato, ad crassam mellis consistentiam, ad custodiam eius coctum.

Veteres loco syruporum succis radicum, herbarum & fructuum, quos melle componebant, vti sunt, ut videre est apud Galenum *b.* Apud Æginetam *c.* & Aetium *d.* multa sunt eiusmodi, quorum alia dicuntur propomata; alia potiones suaves, alia potiones utiles. Propomata, *προπομαται*, erant dulces praelibationes ex *e* vino & melle apparatus: Vel ut plurimum, vina medicata, aromatib. herbis, radicibus condita, ut videre est apud Myrepsium *f.* qui confectioes varias proposuit, sic dicta, quia instituta erant, ut ceteris cibis præpotarentur, quo appetitum excitarent. Quare vina factitia Trallianus propomata vocavit.

Potiones vero utiles & iucundæ, ut scribit Ægineta, fiebant ex succis una cum melle, nec vinum miscebant, quia in febricitantibus utebantur. Fiebant ex succis pomorum, prunor. cerasorum; in summa ex omnibus succis fructuum dulcium & suaviuum.

Iuuenti fuere syrupi tribus potissimum de causis. Primo cum necessum sit in morbis præparare, alterare, roborare, nec quouis anni tempore herbas vel earundem succos habere liceat, ut possent conseruari, syrupi iuuenti sunt: dein quia sæpe affectus præparationis moram ferre non potest: tum ut medicamenta sint suauiora, quare melle & saccharo condiuntur. Sunt autem duplices: Alii simplices, qui vsuales Practicis dicuntur: alii compositi, qui magistrales appellantur.

Simpli-

*b de compo-
sitione med.
κατὰ τόπους.*

c lib. 7. c. 15.

d tetrab. 3.

serm. 1. c. 30.

e Athen.

lib. 2.

Plutarch.

lib. 8. synop.

quest. 9.

f sect. 38. a

cap. 46. ad

71.

Simplices sunt, syrupus rosatus, violatus, de absynthio, de mentha, de eupatorio, de endiuia, de nenuphare, de capillo Veneris, de epithymo, de byzantiis & similes. Dicuntur Simples nō ram, quod vno simplici medicamento consent, quam quod ad ægritudinem vnam & vnum vsum instituantur.

Syrupus magistralis est, qui ex variis medicinis varias ægritudines respicientibus compositus est. e. g. vt si quis commilceret syrupum de eupatorio cum syrupo de betonica æqua quantitate, fiet syrupus conueniens capiti propter betonicam, & hepatis propter eupatorium.

At syrupi, qui in officinis communiter habentur, alii calefaciunt, & humectant, vt syrupus de buglossa & borragine, de liquiritia, de althea: Alii calefaciendo, exiccando incidunt, attenuant, obstructions tollunt: vt sunt syrupus de lupulo, fumaria, capillor. Veneris, de duabus & quinque radicibus (aperientibus dictis) de scolopendria, prassio, hyssopo, tussilagine, liquiritia (Hic tamen aliquam humectationem habet) de betonica, melissa, mentha, arthemisia, byzantiis, absynthio, cortice citri, epithymo. | Plerique refrigerant & humectant, vt syrupus violatus, iulepus violatus, de iuiubis, de papauere, pomis, diacyronites sine speciebus. Refrigerant & exiccant syrupus de cichorea, endiuia, acetosa, de acetositate citri, limonibus, oxysaccharum simplex, qui refrigerando incidunt, attenuant, detergunt, obstructions tollunt. Alii vero adstringendo roborant, vt syrup. myrtillor. cytonior. granator. de agresta.

F

Ex

Ex his quicunque aciditatis participes sunt, inter ceteras facultates vim habent arcendæ putredinis & humorum malignitatem mitigandi.

Rursus ex calefacientibus & refrigerantibus quidam dicuntur simplices, quia ex paucioribus constant: quidam vero compositi, eo, quod plures commisceantur syrupi, ut ex calefacientibus syrupus de byzantiis: ex refrigerantibus syrupus de cichorea compositus, acetosus item, qui maioris sunt efficaciam. Quare syrupus de cichorea compositus id præstare potest, quod apozema, si cum conuenienti liquore dissoluatur.

His alii bilem tenuem præparant, contemperando, feruorem extinguendo, ut est rosatus, violatus, de nymphaea, de papau. diacodion sine speciebus, syrupus de iuiubis, cydon. myrtillis: Crassam vero incidunt syrupus de cichorea tam simplex, quam compositus, de endiuia, lupulo, fumaria, scolopendrio, de byzantiis, de duabus & quinque radicibus, capill. Veneris, acetosus tam simplex, quam compositus.

Pituitam vero præparant syrupus acetosus compositus, de hyssopo, liquiritia, stoechade, arthemisia, mentha, ab synthio, calamintha, capillor. Veneris, byzantiis, de duabus & quinque radicibus, oxymel simplex & compositum, oxymel squilliticum.

At Melancholiam præparant syrupi de lupulo, scolopendrio, fumaria, de byzantiis, buglossa, borrag. pomis, cortice citri, epithymo, de capillis Veneris.

Atram vero bilem præter enarratas, syrupus
valet

valet de cicohrea, de melissa, violatus. Et si humor hic adhuc ferueat, in vltum reuocandi refrigerantes & humectantes, & ij, qui humorum prauitatem obrundere possunt.

Verum non solum singulis humoribus syrupi accommodati habentur: sed etiam dantur, qui vni magis parti corporis, quam alii conueniunt. e. g. ex simplicibus capiti conueniunt syrupi de stoechade, betonica &c. Pulmoni & thoraci ex refrigerantibus syrupus violatus, de iuiubis, papau. diacodion sine speciebus, qui humorem calidum tenuem sistunt, & fluxionem prohibent: eum vero, qui iam fluxit, faciliorem ad expectorandum reddunt. Si vero in pulmonibus bilis sit crassa, vel pituita salsa, vtiles etiam sunt syrupi capillor. Veneris, de liquiritia, tussilagine.

Ad pituitam vero in thorace citra febrem hærentem, vtiles sunt syrupi de hyssopo, oxymel simplex & compositum. Cordi ex calefacto syrup. & etiam Iulepus violatus, de acetositate citri, & quicumque accidi. Refrigerato vero syrupus de buglossa, borragine, melissa, corticibus citri, & capillor. Veneris.

Ventriculo intemperie frigida humida, siue sit cum humore, siue sine humore laboranti, syrupi de absynthio, mentha, hyssopo: Ab humore calido in febre & alui profluuiio syrupus è rosis siccis, syrupus cydonior. granator.

Hepati à caliditate obstructo syrupus de endiu. eichor. capillor. Veneris, & quicumque non euidenter calefaciunt: syrupus acetosus & alii adstrictionis expertes. A frigiditate obstructo,

vsurpandi, qui calefaciunt, incidunt, attenuant, modo nimium non adstringant: Quare & syrupus de absinthio utilis erit.

Lieni syrupus de epithymo, pomis, borragine, buglossa, scolopend. byzantinus, & omnes, qui obstructions tollere possunt. Renib. abstergendis & vrinis mouendis syrupus de liquiritia, althea, siquidem molliter vias vrinarias dilatent, leuiter incidant & detergant: syrup. de limonibus, de raphano.

Vtero refrigerato, aut à bile crassa obstructo, utiles erunt ii, qui enumerati sunt ad bilem crassam & pituitam crassam: Imprimis vero utiles sunt syrupi de duab. & quinque radicib. de arthemis. calamintha, hyssopo.

Sunt etiam syruporum quidam vsitati ad fluxiones à capite in fauces & ventriculum sistendas. Tales sunt syrup. de rosis siccis, syrup. myrtillorum, de papau. iuiubis, diacytonites sine speciebus, de nenuphare. Cauendum tamen, ne his posterioribus vtamur, quando expectoratione opus est.

Si humor fluat in ventriculum, miscendus est myrthinus cum rofac. additis aliquot granis mastiches aut thuris, huius præsertim, vbi à cerebro frigidior humores defluant.

Sitim sedant omnes ii, qui aciditatis participes sunt, de acetosa, de acetositate citri, limonibus, agresta, violatus, de nymphaea & similibus. Sed vbi fluor alui adest, iulepo rosato syrupus cydoniorum vel granatorum miscendus.

Somnium conciliant syrupi de papau. violatus,

latus, de nymphaea, horum omnium quantitas excepto papauerino est ab ℥ i. ad ℥ i. β. additis ℥ ij. vel iij. aquæ stillatitiæ vel decocti cum ipsis syrupis viribus conuenientis, quibus maior quam aquis, vis inest. At syrupi de papau. cum diuersæ sint confectiones, certa dosi hic præscribi non potest. Secundum nostrarum enim officinarum compositionem ℥ vi. pro summa dosi sufficiunt. e. g. si ad obstructionem venar. mesaraicarum, aut iecoris propter biliosam fluxionem syrupo composito uti velis, talis esto:

℥. Syrupi de cichor. siue rhabarb. syrupi acetosi simpl. capillor. Veneris, an. ℥ i. β.
 aquar. agrimon. acetos. endiv. an. ℥ ii. vel iij.
 fiat iulepus pro quatuor dosibus, qui bis in die, duabus horis ante cibum exhibeatur.

Plerumque dissoluuntur syrupi in ptisana vulgari, id est, decocto parato ex hordeo nō mundato & radicibus liquiritiæ, ab exteriori cortice repurgatis. Exemplum syrupi cum aquis conuenientibus in Lienis obstructione:

℥. Syrupi de scolopend. capillor. Ven. de byZantiis an. ℥ ii.
 aq. bugloss. scolopend. borrag. fumar. an. ℥ iij.
 f. iulepus pro quatuor dosibus.

Sic ad sanguinem vndiquaque manantem:

℥. Syrup. myrtillor. de portulac. iulepi ros. an. ℥ i.
 aq. plantag. centinodii, ros. rubr. an. ℥ iij.
 f. iulep. pro tribus dosibus.

Potest etiam vnus aut plures dictorum syruporum

F 3 rum

rum in aq. chalybeata dilui. Exhibemus etiam aliquando sine liquoris admixtione, ut ad fluxum in fauces delabentem

℞. Syrupi iuiubini, rosar. succ. an. ℥j β. misce pro duabus aut tribus dosibus, hora somni cochlear vnum sumendo.

Sic vetriculo ab humore frigido relaxato, vel ab intemperie humida labefactato, syrupi de mētha per se aut cum syrupo de acetositare citri, cochlear vnum, horis duabus ante prandium exhibeatur.

Qui vero pectorales sunt, lambendo vel baculum liquiritiæ syrupis pectoralibus intinctum sugendo assumuntur, quo sensim pars ipsorum per latera asperæ arteriæ recta in pulmones feratur, ut in destillatione humoris crassi, & expectorationis tempore.

℞. Syrup. de hyssop. capillor. Veneris, de tußilag. de liquir. oxymelitis simpl. an. q. voles.

In catharro tenui cum febris:

℞. Syrupi violati, de iuiub. an. ℥j β.

M. vtatur sæpius lambendo: qui nō tantum mane ac vespere exhibendi sunt, sed etiam in accessionum particularium incremento, vigore & declinatione, ut in incremento ad humorum præparationem caloris febrilis extinctionem

℞. Syrup. violat. ℥i. de limonib. vel de acetositare citri, vel etiam rob. deribes ℥β. dissolue in ℥iiii. aq. cactæ. Exhibeatur sitis tempore præsentē æstu febrili. Quod si sitis intensissima sit, aq. dosis augeatur, & quidem crudæ, si æger assueuerit, & nulla ventriculi debilitas adsit. In declinatione vero ad sudores mouendos aut yrinas mouendas, maxime, si æger

ger facilis sit ad sudorem, naturæ motus iuuandus, nec potus prohibendus, exhibendi sunt syrup. acetosus, de limonibus, capill. Vener. cum aq. cocta vel aquis scabiosæ, acetosæ, vel etiam aq. fontana.

Habentur quoq; in officinis syrupi efficaciores leniterq; bilem purgantes, qui puerulis, grauidis, infirmis & senibus exhiberi possunt, quales sunt syrup. rosat. laxatiuus simp. qui cum aq. fontana aliave conuenienti ad faciliorem deglutitionem infantibus ad \mathfrak{z} i. adultis ad \mathfrak{z} iii. exhiberi potest. Sic syrup. violat. ex multis infusionibus infantulis accommodatior ad \mathfrak{z} i. per se, vel ad \mathfrak{z} iii. cum conuenienti liquore in adultis, syrupus de cychorea cum rhabbaro, qui pari dosi propinari debet. Horum vis alterius accessione augeri potest.

Quod si vero syruporum in officinis vsitatorum facultates exoletæ videantur, & materia parandis recentibus habeatur conueniens, parabuntur ex decocto vel succis, vel vtrisque mixtis morbo & parti affectæ conuenientibus, adiecto saccharo aut melle. Quantitas vero sacchari similis plerunque esse solet decocto, vel si decoctum vel succi per se sunt iucûdi, tantû solum, quantum ad conseruationem requiritur, sacchari addi debet. Si vero amari sint, vel nimium acidi, plus sacchari miscetur, & simul coquuntur, ita vt, si syrupum diutius seruari velis, tamdiu coquas, donec sexta tantum decocti pars remaneat. Exemplum ex decocto ad expectorationem humoris calidi, vel ex bile & pituita permixti.

℞. Sebesten, iuiubar. an. nr. viij.
caricum concisar. nr. ij.

F 4

sia-

scabiosa, tuſſilagin. capill. Vener. an. m. j.
sem. meson. alth. fœniculi, bombacis an ℥ ii,
liquiritia rafa ℥. ℞.

flor. violar. p. ij.

fiat decoctio ad quartaria iiij.

in colatura diſſolue ſacchari Maderenſis ℥
vij. vel viij. coq. ad conſiſtentiam ſyrupi.

Huius ℥. j. in ptilana, vel in aqua tuſſilaginis & ſca-
bioſæ diſſolui poterit & pro doſi exhiberi, vel eius
cochlear j. ſenſim deglutietur; vel cum baculo li-
quiritiæ loco ecclegmatis uſurpetur.

Parantur etiam eiſmodi ſyrupi ex ſuccis her-
barum, ut in obſtructione hepatis à bile cauſa-
ſata:

℥. Succor. bugloſſ. endiv. acetos. lupuli. an. ℥ ij.
ſacchari tantundem, coq. ad ſyrupi conſiſten-
tiam, cuius ℥ j. vel ℥ i. ℞. in decocto
agrim. lupuli, fumar. cichor. vel in aq.
ſtillatitiis earundem diſſoluatur.

Exhibeatur duabus ante cibum & quatuor à cibo
horis.

Alius in melancholia hypochondriaca.

℥. Succorū depurator. borrag. bugloſſ. an. ℔. ℞.
ſuccor. pomor. redolentium quart. iiij.
ſacchari ℔. j. ſimul coq. ad ſyrupi conſi-
ſtentiam.

Poteſt etiam aceti ℥. ℞. vel ℥ j. ſub finem colaturæ
addi, modo accida ægro placeant.

Syrupi quoque magiſtrales ſive longi in fre-
quenti uſu ſunt in diuturnis morbis, tam ad cura-
tionem, quam ad præcautionem: Nam quemad-
modum corpora & humores hiſ ſenſim præparan-
tur,

rum, ita quoque sensim & blande expurgantur.
Quare exempla aliquot subiiciamus.

Ad pituitam in capite abundantem eamque euacuandam, syrupus magistralis talis esto:

℞. Radic. asparagi, fœnicul. petroselini, enula,
sem. carthami an. ℥. ss.

cichorii cum toto, origani, calamenthe, sum-
mitatum hyssopi, an. m. j.

sem. anisi, fœnic. pœonia & eius radice an.
℥ ij.

flor. cordial. an. p. j. decoq. in aqua aut hy-
dromelite.

℞. Colatura quartaria quinque infunde folior.
senæ mundat. ℥ iiij. quæ leniter deco-
quantur.

agarici trochisc. ℥ ij. qui tantum in decocto
calido macerantur (alias facultatem
suam amittet) deinde fiat expressio ad
℔. j. in qua sacchari Maderensis ℔. j.

dissoluantur: f. syrupus, cuius dosis erunt ℥ ij. (vel
cochlearia duo) dissolutæ vel in aquis stillatitiis,
vel decocto aliquo conuenienti.

Ad purgandum iecur & lienem:

℞. Quinque rad. aperitiuar. (quæ aliquando
per noctem in aceto macerantur)
cortic. rad. capp. cortic. med. fraxi. an. ℥ i.
cichor. & endiu. cum toto, agrim. chamedr.
an. m. ss.

sem. endiu. acetosa, fœnic. an. ℥ iiij.

flor. cordial. & melissæ an. p. j.

f. decoctio in sufficienti quantitate aquæ cir-
citer ℔. ij.

F 5

colatura

collaturæ infunde fol. senna mundator
℥ iiij.

agarici trochisc. ℥ ii.

f. expressio ad ℥ j.

in qua tantundem sacchari dissolue. sub fi-

nem adde infusionis rhabarb. ℥ i. ℞. cum

℥ ii. cinnam. aromatizetur. f. syrupus

longus, cuius dosis ℥ ij. cum deco-

cocto convenienti hepatico, qui singulo triduo
exhiberi potest.

Medicamenta autem purgantia, quæ ipsis deco-
coctis infunduntur, sunt senna, rhabarb. agaric.
turbith. (in piruitoso) helleborus niger in affectu
melancholico contumaci, cuius ℥ ij. si decoquan-
tur, sufficient, vel tantundem turbith. infundere
licet simul cum senna, additis zingiberis gr. vj. vel
viij. radicis vero ireos ℥ j. simul cum aliis deco-
quatur vel in taleolas secta colaturæ calidæ in-
fundatur. Sic ellabori fibras aut radices in eadem
colatura infundere plerunque satis erit. At pon-
dus purgantium accommodari debet humori, na-
turæ ægroti, viribus, ætati, parti affectæ & aliis
coindicantibus, ita ut pro singulis dosibus ℥. ℞.
sennæ, agarici ℥ ij. rhabarbari ℥ i. ℞. vel ℥ ii. suffi-
cient, quæ dosis raro exceditur.

Quod si vero hæc dosis non satis euacuet, au-
geri poterit, addita syrupi lōgi ℥. ℞. vel in rhabarb.
diluto ℥ j. vel ℥ j. ℞. dissoluetur dosis vna prædicti
syrupi, ut ℥ j. ℞. vel ℥ ij. vel syrupo addi potest dia-
phenici aut diapruni aut electuarii de succo rosa-
rum ℥ ii. vel catholici ℥ iii. pro dosi.

usus

Vsus denique syruporum multiplex est. Vulgatissimus vero est ad humorum expurgandorum præparationem, & obstructionum reserationem, quo facilius humores expurgentur.

De Saccharo eiusque differentia.

C A P. XIX.

CUm sacchari frequentissimus in medicamentis vsus sit, necessum est, de eo quædam dicere.

Saccharum duplex est, aliud natium, aliud factitium: Illud liquor est, qui in India & felici Arabia ex arundinis suæ oculis effluens, tum per se, quia turget, lacrymæ alicuius instar, tum etiam solis attrahente facultate elicitus, principio liquidus qui denide à sole super arūdines in grumos pisi, fabæ aut auellanae magnitudinem concrescit, candidus, pellucidus, salis instar friabilis, qui antiquis cognitus, à Dioscoride & Galeno inter mellis species relatus. Quare Dioscoridi sacchar. melium & concreti mellis genus: Galeno sacchar; Paulo saccharum, Plinio saccharon dicitur; Archigeni, sal Indum, propter concretionem sali similem, & quia salis modo sub dentibus frietur, propter candorem, & quod lique fiat, cum humore aliquo diluitur. Aliis mel calaminum seu arundinaceum dictum fuit: quod saccharo cando arte parato simile fuit, cuius succedaneum esse potest.

Factitium, aliud veterum, aliud recentiorum. Veterum ex radicibus arundinum & ipsis cannis expri-

exprimebatur, quo veluti liquido melle utebantur: quare mel cannæ dictum fuit, quod ex Ægypto, Cypro, Creta, Sicilia & Rhodo afferebatur. Hoc etiam ante Galeni tempora notissimum fuit, & saccharum tabarzeth ab Auicenna dicitur.

Recentiorum à prædicto confectionis modo potissimum differre videtur, cum veteres suum expressione, recentiores vero coctura conficiant.

Est autem nostrum saccharum succus è singulari arundinis genere expressus, ad iustam consistentiã calore ignis excoctus, defecatus, & in turbinatas metas densatus, colore & splendore niueus, aut in candido rufescens, qui cum aqua dissoluitur, & rursus ad crassitudinem coquitur, mellis instar pinguis, & in longum ductilis, dulcedinis suauitate mel superans, qui quanto plus coquitur & defecatur, tanto candidior & dulcior euadit.

Diuidimus saccharum in concretum & molle: Concretum in pyramidale, miscellaneum, candum & penidium. Pyramidale in Maderense, Canarium, Finale, Melissium & Thomæum.

Maderense ab insula Madera dictum, ex Lusitania adfertur in metas lb. 6. 7. 8. 9. & 10. suauitate sua ad confectiones expetitur, quod ceteris omnibus præfertur.

Canarium ab insula Canaria inter Africam & Americam sita, ubi copiosissime coquitur, & Melissio ac Thomæo candidius, solidius ac purius. Eligendum in hoc genere candidissimum, aridissimum, minime lentum, sed quod malleo percussum in solidas partes dissilit, ut liquefactum ac desubmatum aqueam claritatem habeat: quod metis 10. & 12 lb. adfertur.

Finale

Finale, aut Finis, ab extrema & finem consecuta puritate nomen habet, eo quod candidus arte reddi non potest. Conficitur e canario hoc modo: Saccharum in portiones diuisum ahenò indunt, lixiui ex sola calce viua parati, quantitatem, quæ ebullitioni despumationiq; sufficiat, affundunt, despumant: rursus albumina ouorum instillant, & tamdiu despumant, donec probe limpidum & flauum sit redditum, tum lixiuio nondum absumpto per cilicium transmittunt, quo reliquæ sordium colligantur, denuo igni apponunt, donec lixiuium plane sit absumptum. Quod si forte ebullitione labra aheni superet, butyri momentum ilico addunt: sicque statim vndantes spumæ resident. Saccharo iam ad duritiem cocto & adhuc calente, vasa figulina terrea, (Veneti accipiunt ænea) infundibuli forma prius aqua fontana lota, saccharo opplent, quibus subtus angustiori parte foraminulum inest, quod obturant, & recondunt. Hæc vasa in cellam aut hypocaustum, metarum basi, crustam ex luto aqua calida subacto, duorum aut trium digitorum obducunt: Quæ crusta ubi exiccata fuerit, aufertur, alia apponitur; hocque bis terve repetunt, ita tamen, vt in singula mutatione in foraminulum mucronem immittant, quo facilius crassamentum pinguius & sordidius, quod syrupum vulgo vocant, effluat.

Postremo bis aut ter ex metis vel vasis erutum fontana liquefaciunt, rursus in metas infundunt subtus foramen reserant, & superne lutum addunt, denique dodrantes pyramides cærulea charta inuoluunt. Optimum, quod candore, ariditate
&

& splendore, optimum Canarium superat, quod ad confectiones ceteris speciebus plerique præferunt. Verum ut ab eo in medicamentis abstineatis, suademus: siquidem dum lixiuo acriore, quasi sapone ex calce parato, repurgatur, non modo dulcedinis gratiam amittit, sed aliquid acrimonie acquirit, unde sitis excitatur, sanguis uritur, bilis gignitur, caput grauiatur. Hoc Practici & officinae pro saccharo tabarzeth usurpant, cum Arabes voce Tabarzeth optimum intelligant. Quare Maderense in medicamentis præferimus.

Saccharum Melissium, quod aliqui à Meli Indiae occidentalis, alii ex insula Melita afferri volunt, Canario simile, minus tamen candidum, quod etiam Fino præferimus, & communiter in cibis utimur, quare saccharum cibale quibusdam dicitur, laudatur, quod tam foris quam intus candidum est. Si enim intus subrufum sit, tum spuma sua pyramidibus intus commixta, adulteratum est.

Thomæum saccharum, ab insula Indiae occidentalis Sancti Thomæ, ubi plurimum coquitur, nomen habet: Quod Practicis Saccharum rubrum: ab Arabibus succharum sulimum dicitur, & pro ignobilissimo habetur, quod foris albidum, aut inflauum vergens, in mediis metis subrufum, præsertim in summitate. Quod in eo candidum est, facile friatur: rufum vero propter lentam pinguedinis densitatem friationi resistit: cum resoluitur, rufescit, & plurimum spumæ excernit, cum rursus ad spissitudinem coquitur: densitatem diu seruare nequit, sed propter pinguedinem melli cognatam semper humescit: Idcirco

eo

eo etiam utimur mellis loco ad excipienda medicamenta liquida, pro antidotis, serapiis, conferuis & similibus. Clysmatibus etiam inditur non tantum, quod vilius sit, sed etiam, quod magis abstergat.

Eligendum est pingue, densum, candidius, & hoc ipso Fino salubrius est. Adulteratur etiam spuma sua intus pyramidibus admixta, dolus fusco rubore detegitur. Nonnunquam & hoc saccharum lixiuio, eo modo, quo Canarium, depurant. Albius quidem reddunt, sed nunquam recte induratur. Et quod candidius est, plus amyli habet, quod in depurando admiscunt, paruis metis infundunt, cærulea charta innoluunt.

Saccharum Miscellaneum prædictarum specierum fragmenta appellant, quæ simul collecta in doliis afferuntur, siquidem hoc communiter ad syruporum confectionem, aliquando & in cibis, utantur.

Denique saccharaceum mel, simile est molli & liquido melli vel syrupo, quale etiam semper remanet, nihil aliud est, quam spuma in sacchari confectione collecta, quod ex Insulis, in quibus saccharum coquitur, in doliis aduehitur, viliori-que pretio, quam mel venditur, quo pro melle uti licebit, nisi forte adulteraretur. Hoc ex insula Madera magna copia Antuerpiam aduehitur, ubi ex eo placentulæ popularibus hominibus dicatæ conficiuntur. Dicitur mel saccharinum.

Saccharum candidū, quod officinis candum dicitur, cuius ex Græcis solus Myrepsius a meminit, a *lib. de an.* *vid. sect. 1.* *dictum*

dictum, duplex est: Naturale aliud, aliud factitium.

Naturale, quod ex arundinum cannis effluxum, super eas solis calore concretum est; & ex India allatum fuisse diximus, in cuius loco saccharum nostrum candidum, iisdem viribus pollens, successit.

Quod arte paratur, duplex est, alterum crystallo simile, quod Veneti ex finissimo conficiunt, cum tamen rectius è Maderensi vel Canario conficiatur, cum finissimum à lixiuio ex calce parato, decoctione aliam qualitatem adsciscat, & id, quod ex Maderensi vel Canario sit, illud dulcedine superet, & candore adæquet.

Alterum subrufum quod nunquam clarum redditur, & ex Thomæo conficitur; Præfertur tamen album, siquidem colore, substantia & viribus natiuo correspondeat. Confectionis hic est modus:

Saccharum optimum confringitur, vasi convenienti imponitur, aquæ fontanæ, quantum ad sacchari liquefactionem opus est, affunditur, vsq; dum ad iustam consistentiam syrupi perueniat, quod cito fit, coquitur. Calidum ollis quadratis è luto factis, & vitratis infunditur, quibus bacilli lignei, fissiles, tenues, quadrati ex abiete aut picea decussatim duorum digitorum interuallo dispositi insunt; Feruens adhuc vasis æstuario calefacto ad fornacem vel officina calefacta, vase densa bōbace inuoluto, in dies 16. aut 20. reponunt, postmodum detegunt, & si forte syrupi affusi siue sacchari liquati portio quædam necdum concreta reman-

remansetit, effundunt repente affula calida, ad syr-
rupi pinguedinem eliciendam, quo denuo fer-
uente reddito, illico calidum in idem refundunt,
eodem loco per dies 8. vel 10. relinquentes. Tem-
pore hoc elapso, inuenitur circa ligna injecta sac-
charum concretum pellucidum, & crystallini co-
loris, sapore Canario simile, quod ori inditum,
sensim liquefcit. Probatum quod maxime pellu-
cet, & in maiores cubos, splendidis lateribus den-
satum fuerit. Quod vero rufum est, calidius est,
& ad mellis qualitatem accedit, magisque ab-
stergit.

Ad imitationem sacchari candidi confici etiam
potest violaceum & pellucidum, cinnamomeum
& rosaceum purgans. c. g.

℞. Sacchari Maderensis ℔. vi.

liquefciant, bulliant, in aq. stillatitia violarum
paucissima, donec crassitiem tabulis consi-
ciendis acquirat, mox affusis succi violar.
℔. ij.

decoq. ad syrupi consistentiam, tum, vt dictum
fuit, olla terrea vitrata, decussatim in ca ba-
cillis dispositis infunde.

Eodem etiam modo & tempore, quo saccharum
candidum confici diximus.

Si pellucidius requiras, & viridioris coloris,
tum addes succo violarum, dum saccharo misce-
tur, guttas aliquot succi limonum aut citri. Fra-
grantius si experas, rad. iridis ℥ ij. inuolutas la-
neo panno, addes. Vfus est in affectibus pulmo-
num & thoracis à calore excitatis.

Simili modo saccharum candum cinnamome-

G

um

um conficitur, si loco aquæ fontanæ, aquam stillatitiam cinnamomi sumseris, in quo saccharū dissoluatur, & si guttas aliquot olei cinnamomi addideris, habebis fragrantissimum. Cuius usus in frigidis & thoracis & ventriculi affectibus.

Saccharum vero candidum rosac. hoc modo fiet: Saccharum in aqua stillatitia rosarum dissolvitur, succus rosarum incarnatarum expressus additur, eo modo, quo violaceum, conficitur. Pellucidius & floridiore erit colore, si succi citri, aut aliquid cinnamomi saccharo miscueris.

Quod si vero saccharum in succo rosarum incarnatarum dissolueris, & guttas aliquot succi limonum addideris, eoque modo, quo candidum, confeceris, non solum pellucidum & incarnatum colore confeceris, verum etiam vi cathartica præditum erit, quo delicatulos & infantulos blande purgare poteris.

Saccharum Penidium, cuius nec Græci meminere, nec conficiendi modum agnouere, ex pyramidali, nonnunquam ex Thomæo conficitur: Potest etiam recte ex miscellaneo confici, saccharo in micæ confracto, aquam affundunt, lentis prunis dissolvunt, bullienti albumina ouorum diligenter agitata affundunt, quo sordes albumini adhæreant, remouent ab igne, spumam cum sordibus despumatorio adimunt, rursus igni imponunt, bullienti demum albumen infundunt, sordes adimunt, totiesque faciunt, vsq; dum saccharum nullam amplius spumam relinquit, mox per pannum colant, rursus igni apponunt, quo lente & continue bulliat, vsq; dum bullæ magnæ attol-

attollantur, mox bacillum leuem ex frigida aqua
exemptum saccharo induunt, vt ei adhæreat. Ex-
empto baculo frigidam aspergunt (hæc enim est
proba) Quod si saccharum induretur, & faci'e
à bacillo recedat, masticatum item dentibus non
adhæreat, sufficienter coctum erit; Quare ab
igne remouent, & vbi bullæ confederint, supra
tabulam marmoream optime adæquatam oleo
amygdal. inunctam effundunt, eiusque deflu-
entes extremitates continuo in medium referunt,
& id tam diu, vsque dum propemodum resinæ
laricæ crassitudinem acquisiuerit, tum manibus
amylo conspersis in vncō siue hamo parieti affixo,
suspendunt: Detrahunt ad vlnæ longitudinem,
ad vncum referunt, celeriter distrahunt & qui-
dem toties sine intermissione, donec indurescat
& candorem acquirat: Quo diutius enim dedu-
citur, eo candidius redditur. Tandem veluti in
tenuēs funes digiti crassitie torquendo tabulæ
amylo conspersæ imponuntur, vsque dum exic-
cetur; quod vbi refrixerit, durissimum est & vi-
tri instar diffilit, & octauo die post friabile red-
ditur, vt & digitis comminui possit. quæ omnia in
æstuario calido peragenda sunt. Eligendum can-
didissimum, rarissimum ac lucidissimum, quod
temperate calidum est: Lenit & emollic asperi-
tatem faucium, raucedinem, tussim sedat: pectus
& thoracem expurgat, siue per se, siue in cibo
aut potu sumptum, cuius nomine infantu-
lis vel in pulte vel cum lacte ex-
hibetur.

De Iulepis.

CAP. XX.

a 5. meth.
med. 1.

Iulepum iuniores Græci, A&uarius a & Sethi
 Ἰουλέπιον & ἰόλαβον quasi violarum infusum appel-
 lant: Veteribus enim hæc forma incognita, & ab
 Arabib. inuenta, cuius loco hodie Medici frequen-
 tius syrupo simplici vtuntur. Materia ipsorum sunt
 aquæ stillatitiæ, succi florum, fructuum, herbarum
 puri & defecati, saccharum, acetum, omphacium,
 mel. Raro ex decoctis herbarum & fructuum ma-
 teria desumitur. Plerunque ex infusione florum
 fiunt. Aliquando è iure vnus aut paucorum sim-
 plicium, præsertim aromaticorum, vt fœniculi,
 hyssopi componuntur, hoc modo: Vt saccharum
 vel mellis secundum aliquos triplum, aliqui æ-
 quali portione cum liquoribus sumunt, deco-
 quantur sensim despumando, dum tota fere li-
 quoris quantitas sit absumpta ad mellis fere con-
 sistentiam; deinde aromate condiebatur. Nunc
 vero simplicior fit compositio, vt ab apozemate
 differat, & liquidior, vt à syrupo distinguatur, ita
 vt liquoris partes tres & sacchari duæ sumantur. e.
 g. In officinis duo habentur iulepi, alter iulepus
 violatus, ex aquæ stillatit. violar. ℥.iii. & sacchari
 clarificati ℥.ii. confectus, qui expumando co-
 quitur. Sumitur igitur hic iulepus vel per se, vel
 cum aqua cocta portione quadrupla, sextupla et-
 iam, quæ simul transuasantur: ad sitim sedandam,
 ardorem bilis compescendum, ad febres, pleuriti-
 dem, asperitatem faucium & tussim. Sic etiam iu-
 lepus rosotus ex aq. stillat. rosar. ℥.iii. sacchari cla-
 rifi-

rificati lb.ii. conficitur: cuius per se & cum aqua conuenienti vsus esse potest, vt & prioris. Hic etiam Alexandrinus dicitur, Regius Lutetianis, quia regi Francisco in delitiis fuit. Quod si æger acido magis inlepo delectetur, hoc pacto parabitur:

℞. Aq. ros. ℥. viiij.
succ. limon. ℥. ij.
sacchar. ℥. iiii.
bulliant lento igne ad iulepi consisten-
tiam.

Si bilis ardorem extinguere velis,

℞. Succ. endiu. acetos. an. ℥. iiii
aq. cichor. nenuph. an. ℥. iii.
sacchari ℥. iiii.
decoque in iulepi consistentiam.

Hoc vel cum aq. cocta vel cum decocto scariolæ, acetosæ vt possumus.

Sed quoniam frigida ista omnia in ventriculo imbecilliore flatus generant, addi poterit cinna-
momi ℥. i. vel santali citrini. Pauperibus ad sitim &
ardorem febrilem conficiatur hoc pacto:

℞. Aq. fontan. lb. j.
aq. rosar. & sacchari an. ℥. iiii.
sub finem decoctionis adde aceti ℥. ii. ℞.
vel omphacii ℥. ij.

In febribus contagiosis conficiuntur ex cordia-
libus, vt aq. scabiosæ, borragin. bugloss. acetos. ros.
succo critri, arantior. limon. acetosæ, borrag. bu-
glossi. Exempli gratia:

℞. Aqua scabiosæ, rosar. acetosæ, card. bened.
an. ℥. iii.
sacchari ℥. v.

sub finem adde succi limon. ℥ ii. f. iulepus.
Verum confici possunt eiusmodi iulepi vel ex aquis solis cum saccharo, vel ex solis succis.

Ad alui profluuium vel hæmorrhagiam fiunt ex aq. rosar. succo granatorum, cytoniorum, berberis, vel etiam ex aq. plantag. polygoni, portulacæ cum saccharo rosat. ex infusione quinetiam florum hoc modo: Macerantur flores violarum in aqua, in quam toties violæ recentes coniiciuntur, quoties libet. e. g. Ad catarrum tenuem in pulmonem delabentem & materiæ delapsæ expectorationem

℥. Flor. violar. & tußilag. an. ℥. ss.

macerentur in s. q. aquæ, dein exprimantur,
denuo recentes infundantur, aliquoties,
coquantur cum s. q. sacchari. f. iulep.

cuius ℥. i. ss. dilui potest cum aq. hordei & ita exhiberi iis, qui in phthisin sunt proni: Vel læpius in die per se ℥. i. exhibeatur.

Fiunt etiam iulepi ex syrupis dissolutis, vel in decocto conuenienti, vel in aquis stillatitiis, vt:

℥. Syrupi violat. ℥. ij.

syrupi de tußilag. ℥. j. misce.

Huius mixtionis ℥. i. in tribus vel iij. ℥. aq. hord. vel decocti pectoralis diluatur; Vel hoc pacto:

℥. Aquar. endiu. scariol. acetos. an. ℥. iij.

syrupi de endiu. ℥. ij.

de acetos. ℥. j. ss.

de limonib. ℥. j. misce pro iulepo.

qui tribus matutinis in ardore bilis exhibetur.
Communiter solent Medici ad quamlibet potio-
nem iulepi tabellam morbo conuenientem exhi-
bere,

bere, vt in frigidis affectibus aromatici ros. diagalanga, diamoschum. In calidis, diatriasandalon, diarhodon Abbatis. Denique in prostratione virium summa, iulepus confortans gratissimus & utilissimus sic à nobis paratur:

℞. Iulepi ros. ℥ j. ℞.

aq. cinnamom. ℥ ℞. misce.

Si acidiusculum expetat, syrup. de acetositate citri ℥ j. addi poterit, ita tamen, vt aq. cinnamomi dosi augeatur ad ℥ j. quo iulepo quotiescunque licebit vi.

Tandem præcipuus iuleporum vsus & communis est ad corrigendam intemperiem quamcunque, sitim sedendam, bilis ardorem extinguendum, humoris malignitatem edomandam. Ad humorum enim præparationem cum paucioribus consent, minus efficaces sunt syrupis & apozematibus, quibus tamen multo sunt iucundiores & suauiores.

De apozematis siue decoctis.

C A P. XXI.

Aπόζημα quasi feruefactum, vel ἀφέψιμα, à Dioscoride & Galen. appellatum, Latinis decoctum dicitur: quibusdam syrupus magistralis, cum à syrupo sola coctione differat:

Est medicamentum constans ex pluribus simplicibus in aliquo liquore ad media vel tertia partis absorptionem

G 4

coctis

c. 1. ad
Glaucō,

coctis, dein colatis, tum saccharo aut melle ad saporis gratiam aut syrupo vno pluribusve dulcoratis, aromatibus conditum, quo ad humorum preparationem, interdum ad earum euacuationem, interdum ad vtrumque vtimur.

Veteres, vt ex Galeno colligere est, utebantur apozematibus hoc pacto confectis: Nonnunquam herbas virentes, aliquando siccās in hydromelite siue mulsā decoquebant: dein colo transmittēbant; & propinabant.

Horum vires eādem, quæ simplicium, ex quibus conficiuntur: aliquando enim materia liquori aliquot horis ante decoctionem infunditur, quo vires, quæ in tenuiori substantia consistunt, eliciantur, vt est facultas incidendi, attenuandi, aperiendi, resoluendi. At cum quorundam vires in crassiore sint substantia, vt in radicibus & lignis, quo maior vis eliciatur, diutius decoquuntur. Sic etiam vis purgantium medicamentorum infusione, nonnunquam etiam coctione elicitur. Quare tot tamque multiplices apozematum vires & vsus existunt, quot ipsorum simplicium atq; syruporum præsertim compositorum.

Iam vero quemadmodum syrupi alii humorem biliosum, alii melancholicum, alii pituitosum præparant, alii denique serosum expellunt: & rursus ex his quidam capiti, quidam thoraci, ventriculo, hepati, lieni aliisque partibus prosunt: Ita apozemata alia bilem, quædam pituitam, alia melancholicum succum, alia humorem aquosum respiciunt: & rursus alia capiti, alia aliis partibus conueniunt.

At licet medicamenta, quæ humores alterant,
vel

vel similitudine substantiæ purgant, id in toto corpore indifferenter præstent: habent tamen facultates peculiare huic magis, quam illi parti proprias. e. g. Oxymel pituitam in vniuerso corpore incidit, attenuat, detergit. At si betonicam in coctas, pituitam in capite rectius præparabit: Si hyssopum vel glycyrrhizam vel tussilaginem, in pectore: si agrimoniam, hepatis; si scolopendriam, lieni magis conducet. Sic de ceteris. Ut ergo re totam rectius explicemus, plâtas maxime vîrutas & quæ singulis humoribus præparandis & alterandis conueniunt, & quæ partibus singulis accôdantur tanquam apozematum materiam referemus.

Pituitam itaque crassam aliosue humores crassos præparant rad. quinque aperientes, radix ireos, helenii, rubiæ maioris, pœoniæ, angelicæ, valerianæ, bryoniæ, ebuli, sambuci, cyclaminis, squillæ, radix & folia chelidon. rad. ononid. eryngii, tamarisci, fraxini, raphani, aristolochiæ vtriusque, centaurii vtriusque, calami aromatici, galangæ, cyperi, pimpinellæ, dictamni albi, peucedani, gentianæ, garyophyllatæ, dauci. Herbæ salu. maior. betonicæ, melissæ, stoechad. lauend. hyssopi, scabios. marrub. menthæ, absynthii, agrimon. thymi, origani, eupatorii officinar. ocimi, cassutæ, vetonicæ, verben. arthemis. matricar. nepetæ, calamenth. tanacetis, chamæpyt. chamæd. asclepiad. cardui benedict. angelicæ, succisæ, rosmar. rutæ. Fructus vîuæ passæ maiores & minores, cappares, ficus, pistacia, nuclei pini, amygdal. Semina calida maiora quatuor, (anisi, fœniculi, carui, cumini) & quatuor minora (dauci, ammeos, amomi, apii)

G s

mi, apii)

mi, apii) carthami, nasturtii, raphani, fileris montani, pœonia, nigellæ Rom. pimpinellæ, saxifrag. milii solis, genistæ, pastinacæ vtriusque, agni casti, rutæ, fraxini, ocimi, hyperici, bacci lauri, iuniperi, ebuli, sambuci. Flores Rosmar. saluiæ, melissæ, stoechad. anethi, lauendulæ, reyri, sambuci, genistæ, ex quibus pleraque etiam serosos humores euacuant: vt ex radicum numero ireos, enulæ, cyclaminis, ononis, cortex medianus ebuli, sambuci, baccæ ebuli & hederæ. Si vero pituita tenuis, qualis initio destillationum à capite ad fauces decumbit, præparationem non indiget, cum facile medicamentis purgantibus obsequatur: Vbi vero ad pectus fluit, incrassari debet, quæ etiam præparatio est.

Bilem tenuem ad faciliorem expulsionem præparant refrigerando scilicet, humectando, acrimoniam leniendo & incrassando: Radices & folia, atriplicis, bliti: Herbæ, lactuca, violaria, portulaca, nymphaea, quibus tussilago viridis & plures aliæ siccandi vi præditæ addi possunt: virides enim nisi admodum exiccent, supra secundum gradum in aqua decoctæ propter copiam humiditatis aquosæ, humectandi vim aliquam habent: exiccatae vero eam amittunt, & vehementius exiccant. Sic bardana, plantago, oxalis, solanum, semperuium. Fructus lenientes ac refrigerantes, pruna Damascena, mala dulcia, iuiubæ, sebesten, cerasa, mora, fraga, cucurbitæ, cucumeres, melones. Semina, vt quatuor frigida maiora, semen psyllii, lactucæ, endiuia, scariolæ papau. albi, hordeum mundat. Flores violar. rolar. recentes,

recentes, papaueris. Eandem detergunt & obstru-
ctionem tollunt rad. asparagi, rusci, gram. oxalid,
cichoreæ. Sic herbæ, vt genera intyborum, vt en-
diu. scariol. lactucæ, portulacæ, chondrillæ hie-
racii, densi leonis, lichenes, lupuli, fumarix, capil-
lares omnes. Semina frigida minora, endiu. sca-
riolæ, lactucæ, portulacæ, cichorii. Flores cicho-
rii, lupuli, sic & summitates asparagi. Sic eandem
adstringunt in euacuationibus immodicis, radic.
& fol. vtriusque plantag. verbasci, bistortæ, bur-
sæ & virgæ pastoris, polygoni, lentisci, myrthi,
Fructus, pyra & mala austera & acerba, arantia, ci-
tria, limonia, punica, mespila, corna, cydonia, sor-
ba, ribes. Semina citri, acetos. portulacæ, papau.
cydonior. myrti. Flores rosar. cytinus. Ex hac ma-
teria etsi quam plurima vim aliquam exiccandi
habeant, & detergentia & adstringentia dici pos-
sint, nihilominus tamen bilem contemperant, si
in aqua coquantur, à qua decoctum vim hume-
ctandi recipit. Præterea cum ad detergendum
aut adstringendum instituantur, quorum neutrum
humectantia per se præstant, his ad bilem hæren-
tem aut plus æquo fluentem vti cogimur.

Bilem crassam, vt est vitellina, præparant ea,
quæ incidere, attenuare & aperire diximus. Præ-
ter illa etiam radices & folia verbenæ, altheæ, la-
pathi acuti, borraginis, bugloss. glycyrrhizæ. Inter
herbas lupulus, fumarix, cherefolium, agrimo-
nia, capillares omnes. Cortices rad. capp. tama-
risci. Semina asparagi, anethi, cherefolii, vrticæ.
Fructus caricæ, vux passæ maiores & minores.
Flores borrag. buglossi, anethi. Dein etiam ea, quæ
diximus

diximus pituitam præparare, quæ primum caloris gradum non excedunt: Raro enim solus humor in corpore peccat, & pituita magna ex parte admiscetur. Quare vtile est, ea plerunque permiscere, quæ manifesto calore aperiunt & incidunt. Ast cum omnia calida sint & sicca, vsus tempore admixtione refrigerantium & humectantium, vt cichoraceorū & aliorum prædictorum contèperanda sunt: quamuis & ab ipsa aqua, in qua decoquuntur, humectandi & refrigerandi vires acquirant.

Humor melancholicus præparatur radicibus & foliis borrag. buglossi, corticibus, rad. capp. tamarisci, fraxini, sambuci, ebuli, radicib. polypod. quercini, oxylapathi, asparagi, enulæ; Herbis, fumaria, lingua ceruina, ceterach, lupulo, melissa, chamæd. chamæpyth. agrimon. thymo, epithymo, cuscuta, latureia, ocimo, quod in palpitacione cordis à flatu melancholico maxime fit. Floribus cordialibus, borrag. bugloss. violar. & rosar. lupuli, roris marini, meliss. fumar. summitat. tamarisci, quinetiam pomorum odoriferorum. Fructibus, vuis Damascenis & Corinthiacis, cappar. Seminibus agni casti, asparagi, borrag. bugloss. hederæ, ocimi. Ex hac simplicium sylua ea, quæ scopo conuenient, eligenda, vt si institutum fuerit, humorem vnum tantum præparare, à leuioribus, modo morbus det inducias, auspicabimur. Vbi vero plures humores affectum causabunt; siue hic in venis siue in diuersis partibus sit, simplicia, quæ humorem peccantem oppugnare possint, & singulis partib. conueniant, miscere conuenit. Quare quæ singulis partibus conueniant, nosse oportet.

Singulis

Singulis partibus conuenientia sim-
plicia

CApiti morbo calido laborante conuenient *Cephalica*.
flores, viola, rosa nymphaea, papauer. Sic ra-
dix mandrag. At his duobus calore vegeto adhuc
existente tantum vtendum: lactuca, portulaca,
solanum. Si vero ab humore frigido caput afficia-
tur, betonica, saluia, maiorana, rosmar. lauend.
stoechas, pulegium, fatureia, calamintha, hyssopus, lauri folia & baccæ, pœoniæ semina & ra-
dix, semen melanthii & nads.

Pulmoni vero & thoraci à frigore affectis, ra- *Thorastica*.
dix glycyrrhizæ, vix passæ maiores & minores,
pistacia, nuclei pini, dactyli, hyssopus, marrubi-
um, scabiosa, tussilago, capillares omnes, heleni-
um, radix ireos florentinæ, semen bombacis, alth.
maluæ proderunt. Si à calore, vtila erunt horde-
um integrum, si leniendum sit & detergendum;
mundatum, si magis leniendum: iuiubæ, sebesten,
psyllium, semen papaueris.

Cardiaca calida sunt, dictamnium, helenium, *Cardiaca*.
carduus benedictus, scabiosa, morsus diaboli,
rosm. pimpinella, buglossa, borrago, benotrica al-
tilis, doronicum.

Stomachia frigida, quæ cordi etiam accommo- *Stomachica*.
data, hic conueniunt, quemadmodum & mala cy-
tonia, granata, arantia. Sic & in alui profluvio fru-
ctus omnes austeri. Calida vero præsertim aro-
mata, amomum, cardamomum, cinnamom. ga-
langa, macis, nux moschata, piper, cyperus,
squinantium, calamus aromatic. mentha, absynth.
ma-

maiorana, origanum, hyssopus, thymum, anisum, cuminum, coriandrum.

Hepatica.

Hepatica calida, absinthium, agrimonia, eupatorium, fumaria, chamædr. chamæpyth. semina calida maiora & minora, quæ omnibus partibus communia sunt, quemadmodum & radices aperientes quinque. Frigida omnes cichoreæ species, lactuca, hepatica, violar. portulaca, oxalis, oxylapath. alleluia, gramen, semina frigida maiora & minora omnibus etiam partibus communia, oxyacantha, santalorum species.

Splenica.

Splenica calida, epithymum, polypodium, caparis, borrago, buglossa, cortex interior radicum fraxini, tamarisci, cappar. sambuci, sic etiam lingua ceruina, ceterach, chamæd. chamæpyth. fumaria, lupulus, cichor. ruta, asarum, cyclamen, rubra tinctorum, semen agni casti. Frigida, violaria, borrago, buglossa, mala redolentia, adianthum, asplenicum.

Nephritica.

Nephritica calida, quæ arenulis expurgandis, pituitosam materiam renibus aut viis vrinariis impactam detergendo conueniunt; sunt rad. quinque aperientes, lappæ maioris, anonis, ireos, eryngii, graminis, cyperi, asari, valerianæ, calami odorati, sic folia adianthi, betonicæ, berulæ, brassicæ marinæ, herniariæ, nasturtii, saxifragiæ; cortex radic. cappar. Semina calida maiora & minora, genistæ, lappæ maior. milii solis, feseli, dauci, petroselini, apii. Fructus item, pistacia, nuclei pini, baccæ lauri & iuniperi, grana alkekengi, flores genistæ, calendulæ. Sed in calculosis aut arenosis renibus solis calidis vtendum

dum non est; sed frigida etiam conuenientia permiscenda sunt, ne renum calor augeatur; sicque excrementa ad ipsos deducantur. Frigida, quæ renum & urinæ ardori renibusque exulceratis detergendis conueniunt, sunt plantago vtræque, oxalis, portulaca, nymphaea, parietaria, lactuca, cichorium: semina frigida maiora & minora, hordeum, semen papau. lactucæ, portulacæ. Fructus, iuiubæ, sebesten, fraga, flores violar. rosarum, nenupharis.

Hysterica seu vterum respicientia sunt rad. ap-Hysterica
rientes, aristolochiæ vtriusque, rubiæ maioris, gentianæ, pœoniæ, valerianæ, angelicæ, galangæ, asari, di&amni albi. Herbæ vero hyssopus, athemisia, matricaria, calamentha, pulegium, serpillum, origanum, nepeta, melissa, tanacetum, ruta, sabina, costus. Semina calida maiora & minora, pœoniæ, seseleos, genistæ flores, genistæ, calendulæ, hyssopi, quæ omnia mensibus suppressis mouendis, intemperiei frigidæ & humidæ corrigendæ conueniunt. Frigida vero sistendis mensibus accommodata inter radices, plantago vtræque, bistorta, tormentilla, symphytum maius. Herbæ, plantago vtræque, portulaca, lactuca, semperuiuum vtrumque, vitica mortua flore albo, polygonum, virga & bursa pastoris. Semina portulacæ, plantag. myrthi, papau. albi, rosar. flor. maluæ arborescentis. Ex enarratis simplicibus aqua stillatiæ eliciuntur, iisdem affectibus vtiles, syrupi componuntur, decocta parantur, quibus medicamenta purgantia infunduntur, aut syrupi dissoluntur.

Enar-

Enarrata simplicium sylua, in quo liquore eadem sint decoquenda, explicandum est. Aqua igitur ut plurimum eligitur. Cum enim insipida sit, omnium vires optime admittit. Quod si vero magis sit refrigerandum, serum lactis caprini sumatur, quod per se intemperiem calidam & ventriculi & viscerum corrigere potest. Sin vero incidendum, attenuandum, detergendum, & febris non adsit, vel saltem febris lenta, hydromeliti incoquantur, & radices duæ, tres, quatuor vel quinque diuersæ, pari pondere sumuntur, herbarum totidem manipuli, semina item, flores & fructus. Sed radices pondere æstimantur, herbæ vero manipulis, flores pugillis, fructus numero, semina pondere rerum siccarum, pro apozematis quantitate æstimanda. Exempli gratia: Ad tres doses decocti radic. duarum aut trium satis erit singulorum \mathfrak{z} β . sumere. Vbi vero multarum & plurium radic. penuria fuerit, aliorum ingredientium maior quantitas esse debet. Eadem ratio est herbarum, seminum & aliarum rerum, ita tamen, ut si radices sint arefactæ, cum efficaciores sint viridibus, minor earum sit quantitas. Contra cum virides, multo adhuc liquore scateant, minusque efficaces sint, harum quantitas augenda.

Aquæ autem aut liquoris, in quo incoquantur, quantitas, etsi communiter periti Pharmacopœi arbitrio relinquatur, tamen Medicum scire conuenit, in materia calida & acriuscula sextuplam aut octuplam, in recenti quadruplam aut sextuplam esse debere. Exempli gratia. Si pro \mathfrak{z} iiii. tam radic. quam folior. & reliquor. iubeas fieri coctionem

nem ad quatuor doses, aut tres ad summum, in ij. lb. aquæ decoctio fiat ad mediæ partis absorptionem. Sic ubi maiore apertione opus est, ut in hepatis & lienis obstructionibus, quo melius humores crassi & visciidi incidantur, & medicamenta citius penetrent, radices horis quinque vel sex in aceto macerentur: abstinendum tamen, ubi ventriculus infirmior, exquisitioreve sensu præditus, cum ab aceto, quemadmodum etiam vterus, lædatur. Nonnunquam etiam ad ingentem febris ardorem extinguendum non solum radices in aceto macerantur, sed etiam sub finem decoctionis aceti ℥ i. affunditur decocto saccharum aut mel, aut syrupi convenientes miscentur. Sacchari pondus erit ab ℥ ss. ad ℥. vi. pro ℥ iij. aut iiij. decocti, ut si ad tres doses apozema instituas, sacchari vel mellis ℥ iij. miscebis: Syrupi vero & morbo & parti affectæ accommodati dosi ℥ i. vel ℥ i. ss. pro qualibet dosi. Aliquando ad gratiam ipsum apozema cum albumine oui clarificatur, licet turbidum & colatum efficacius sit. Plerumque etiam apozemata, si febris non prohibeat, aromatibus, præferim nuce moschata aut cinnamomo, in gratiam ventriculi condiuntur, seu ut loquuntur, aromatizantur, sumendo ℥ j. vel ℥ i. ss. pro libra vna apozematis. Aliquando conditur tantalo, ubi profluuium alui. Interdum pulvere alicuius electuarii, ut diarhodi abbatis, diatriasantaloni. Aliquando radice ireos florent. ut in affectibus pectoris, condiuntur. Exempla subiiciamus.

Ad pituitam citra febrim:

H

℥. rad.

- ℞. Rad. fœniculi, asparagi, petroselini, enulæ,
sem. carthami, an. ℥vj.
herbarum agrimon. hyssopi, pulegii, origani,
calamenth. an. m. i.
ficuum concisarum numero iiij.
sem. seseleos, fœniculi, dauci, anisi, an. ℥ij.
liquir. rasæ passular. mundat. an. ℥. ℞.
flor. saluæ, rorismar. an. p. i. coq. ad lb. i.
dissoluē.
in colatura syrupi de hyssopo, de stoechade,
oxymel. simpl. an. ℥i.
f. apozema, quod clarificatum aromatize-
tur cum speciebus aromatici ros. vel cin-
namomi. ℥i.

Quod si vero pituita magis incidenda sit, prædi-
ctis adduntur radices pœoniæ, galangæ & similes,
& in hydromelite decoquuntur. Si vero adsit fe-
bris quotidiana, abstinendum quibuscunque ca-
lefacientibus & siccantibus, quæ medium secundi
gradus superant, & nonnulla refrigerantia per-
miscenda.

Ad bilem in iecoris obstructione citra febrim
præparandam:

- ℞. Rad. quinque aperitiuar. in aceto horis
quatuor macerat. rad. oxylapath. an. ℥℞.
cichorii totius, endiu. agrimon. chamedr.
an. m. j.
sem. endiu. cucumer. melon. fœnicul. an. ℥ij.
flor. cordial. an. p. i.
f. decoctio in lb. ij. aqua ad media partis
absorptionem.
in colatura dissolue syrup. de cichor.

syrup.

De Compos. Medicam. Cap. 21. 115

Syrup. acetosi simpl. syrupi byzantii an. \mathfrak{z} i. β .
vel ij.

f. apozema cum albuminibus ouorum clarificatum & cinnamomo aromatizatum.

Ad bilem vero venas mesaraicas, iecoris, aliasve obstruentem, præsentē febre, tale parabitur.

℥. Rad. asparagi, gramin. cichor. an. \mathfrak{z} . β .
herbar. endiu. lactuc. agrim. acetosa an. m. j.
sem. cucumeris, cucurbitæ, citrulli, endiu. acetos. fœniculi an. \mathfrak{z} ij.

flor. cordial. an. p. j.

f. decoctio in s. q. aquæ ad \mathfrak{lb} . j.

In colatura dissolue sacchari Maderensis vel canarii \mathfrak{z} iij.

f. apozema, quod clarificatum, aromatizetur cum puluere triasantalon \mathfrak{z} β . pro quatuor dosibus. Potest etiam ad finem decoctionis infundi aceti \mathfrak{z} j.

vel, si malis, syrupos, quam saccharum miscere, tum in \mathfrak{lb} . j. colatura dissolui poterit syrupi acetosi simpl. de cichor. simp. cum syrupo de limonibus an. \mathfrak{z} j. β . f. apozema.

Ad bilem tenuem incrassandam:

℥. Rad. oxylapathi, cichorii totius an. \mathfrak{z} β .
iuiubar. sebesten. an. numero vj.

pulpæ tamari ndorum \mathfrak{z} . β .

herbar. lactucæ, endiu. portulac. an. m. j.

sem. frigidior. maior. papau. albi, fœniculi an. \mathfrak{z} j. β .

flor. violar. nenuphar. rosar. rubear. an. p. j.

H 2

f. decoctio

*f. decoctio ad quartaria iij.
in colatura dissolue syrupe granat. cydonior.
vel portulaca, an. ℥ i. ℞.
f. apozema, quod clarificetur & aromatise-
tur cum santalo citrino.*

Si vero maiori adstrictione opus sit, ipsi decocto post radices myrobolanorum citrinorum ℥ iij. addi possunt.

Ad succum melancholicum, citra tamen lienis obstructionem:

℞. Radic. polypod. quercini, cichorii & bluglos-
si totius, an. ℥ ℞.
asparagi, graminis an. ℥. vi.
herbarum fumar. summitatum lupuli, ta-
marisci, chamædr. scolopend. an. m. j.
sem. endiu. coriandri præpar. an. ℥. ii.
flor. cordial. geniste, an p. i. coq. ad ℥ j.
in colatura dissolue syrupe de fumar. de lu-
pulo & acetos. simplic. an. ℥ i.
f. apozema, quod clarificatum aromatize-
tur cum cinnamomo pro quatuor dosibus.

Quod si lienis obstructio adfit, ad prædicta adde-
re licebit cortic. radic. cappar. fraxini, tamarisci,
herbas capillares, præcipue ipsum ceterach cum
melissa, semina fœniculi, petroselini; addentur
syrupe quinetiam, vt de cichorea composit. sine
rhabarbore; syrupus de duab. vel quinque radicib.
syrupus byzantinus. Aduertendum tamen, lon-
giore opus esse tempore & pluribus apozemati-
tibus ad melancholici humoris, vt qui terrenus sit
& fœculentus, præparationem: & si purgantia mi-
sceantur, mitioribus vtendum, cum à fortioribus
humor hic exacerbetur.

Iam

Iam vero quemadmodum apozematum præparantium frequens vsus est, sic etiam & purgantes in vsum veniunt, qui non alia ratione, quam prædicta, conficiantur, nisi quod folia sennæ, agaricus &c. decocto infundantur. Fructus vero aluum emollientes ad pituitam quidem passulæ, ficus: ad bilem vero pruna, sebesten, tamarindi, incoquantur. Syrupi etiam in colatura dissoluuntur ex rosis pallid. syrup. de cichorea composit. cum rhabarbaro, syrup. de epithymo laxat. vt ad pituitam purgandam:

℞. Prædicti apozematis ℔. j.
 infunde fol. sennæ mundator. ℥. j.
 agarici ℥. ss.
 f. ebullitio & expressio, in qua dissolue syrupi rosat. laxat. ℥. iij.
 f. apozema pro trib. dosib.

exhibeatur alternis diebus, si ægri robur permittat, sin minus, tertio quoque die, mane horis tribus ante cibum, nisi morbi motus vel accessio impediatur, tum intermedio duarum accessionum tempore fieri debet, & ad minus horis quatuor à cibo.

Ad bilem vero in ℔. ss. decocti præscripti infundes fol. sennæ ℥. j. exhibeantur tertio quoque die.

Si pituita bili permixta, syrupi ros. pall. vel syrup. rosat. composit. cum rhabarbaro ℥. ij. vel iij. addentur. Apozemata singulis partibus convenientia ex his, quæ causam morbi, & morbum oppugnent, & ipsius partis affectæ rationem habeant, conficienda sunt, vt si humor crassus pul-

H 3

monem

monem obstruat, vel citra febrim vel ea tenui ex-
istente, parari poterit in hunc modum:

℞. Rad. enula, vngule caball. cicbor. totius,
an. ℥. β.

folior. tuſſilag. ſcabioſ. adianthi, ſummita-
tum marrubii, hyſſopi, an. m. i.

ficuum, dactylor. concis. numero ii. vel iii.
paſſular. mundatar. vel corinthiacar. ℥. β.

ſem. alth. bombacis, melon. an. ℥. ii.

radic. liquirit. raſa ℥. β.

flor. cordial. an. p. i.

coq. in ſuff. q. aq. ad ℔. i.

In colatura diſſolve ſyrupi capillor. Veneris,
de liquiritia vel etiā de hyſſopo, vel de tuſſi-

ſilag. vel de ſcabioſa vel de praſio an. ℥. ii.

f. apozema, quod clarificetur & cum ℥. ii.

rad. ireos florentina aromatizetur.

Sic ad detergendos renes & expurgandas a-
renulas, præmiſſa tamen diligenti totius corporis
evacuacione, parabitur hoc pacto:

℞. Rad. aperitiuar. an. ℥. β.

rad. lapathi maioris, reſta bouis, althea an.
℥. ii.

folior. betonica, endiu. capillor. Veneris, ſa-
xiſfragia, an. m. i.

ſeminum frigid. maior. ſceniculi, geniſta,
milii ſolis an. ℥. i.

liquirit. raſa, ℥. ii.

cicer. rubeor. ℥. β.

flor. violar. bugloſſa an. p. i.

coq. ad ℔. i.

in colatura diſſolve ſyrupi capillor. Veneris,
de al-

de althea, de limonibus an. ℥ i. ℞.
f. apozema clarum, aromatizetur cū ℥ ℞.
pulveris electuarii Ducis.

Verum hæc decocta exhibenda non sunt, nisi vreteribus dilatatis cataplasmatibus, semicupis, fomentis, inunctionibus cum oleo scorpionum, ne calculi vel arenæ in vreteribus subsistant. Exhibentur autem hæc apozemata, dum æger in semicupio erit.

Solemus etiam horum apozematum loco positiones exhibere ex vini albi ℥ ii. succi limonum ℥ ℞. succi amygdalar. dulciū ℥ j. vel aquis destillat. vt:

℥. Aquæ parietariæ, agrimonie, ononidis, vel saxifragiæ, vel rutæ murariæ, an. ℥ i. ℞.
syrupi de raphano ℥ i.
pulveris lapillor. cancri, nucleor. persicor. vel iunip. an. ℥ i. f. potus.

Vbi vero renes nimium incaluerint, urinæ ardor adsit, vel renes & viæ urinariæ exulcerati sunt, à diureticis eiusmodi abstinendum, & apozemate leniente utendum, quale est:

℥. Hordei integri, m. ℞.
sebest. ficus, an. numero x.
folia malvæ, altheæ, endiu. portulacæ, sem. papau. alb. an. ℥ i. ℞.
flor. violarum nenupharis an. p. ii.
coq. ad quartaria iii.
In colatura dissolue sacchari rosati, tabulat. diatragacanthi frigidi an. ℥ i.
fiat apozema clar. pro tribus dosibus

Potissimum autem in his affectibus emulsionibus, de quibus infra, utimur.

Ad suppressos menses à bile crassa & pituita:

℞. Radic. quinque aperitiuar. an. ℥. ℞.

radic. aristoloch. rotund. vera, rubia maioris
an. ℥. iij.

cichor. totius, herbar. agrim. hyssopi, cala-
mintha, origani, nepeta, satureia, vel ar-
themisia, an. m. ℞.

sem. fenicul. sesel. pœonia & eius rad. an.
℥. i. ℞.

flor. calend. p. ii.

coq. in hydromeliti ad ℔. i.

in colatura dissolue syrupi de hyssopo, de ar-
themis. an. ℥. i.

f. apozema clarum & cum cinnam. ℥. ℞.
aromatiseur.

Exhibentur autem hæc apozemata, cum tempus
menstruorum instat: aliis enim temporibus fru-
stra exhibentur.

Quæ apozemata omnia calida exhiberi debēt,
& ab omnibus apozematibus in genere abstinend-
um, nisi prius corpus blando medicamento pur-
gatum fuerit: exhiberi autem debent mane præ-
fertim. Aliquando etiam vesperi tribus horis
ante cibum, nisi motus morbi & accessionis fe-
brilis principium prohibeat. In vigore enim ac-
cessionis, aut declinatione ad sudores iuandos
& vrinas promouendas vtiliter exhiberi possunt.

De potionibus purgantibus.

C A P. XXII.

CUm in morborum acutorum principiis, hu-
moribus ipsis turgentibus & suffocationem
mini-

minitantibus, etiam citra præparationem, præmis-
so tamen clystere, euacuandi sint. Purgatio autē
fiat vel potionibus, vel pilulis, vel bolis, vel tabel-
lis, vel pulueribus. Potiones primo explicabimus.

Fiunt autem ex liquore aliquo, vt decocto, vel
aqua stillatitia, vel succo aliquo, & morbo & par-
ti affectæ conueniente, infulis quibusdam purgā-
tibus, vel integris, vt senna, rhabarbaro &c. vel
eorundem pulueribus, vel etiam compositis in iis
dissolutis, vt diacarthamo, diacatholic. de succo
rosarum & id genus, vel syrupis purgantibus. Ve-
rum cum purgantium alia bilem, alia pituitam, a-
lia melancholiam, alia aquas: Alia, quæ duos aut
plures, aut omnes humores expurgent: vnde
phlegmagogacholagoga, melanagoga achydra-
goga dicuntur, idcirco quænam singulis humori-
bus conueniant, ostendemus.

Pituitam educentia.

Pituitam ducunt cathartica, Agaricus in infu-
sione à ℥ j. ad ℥ ij. corrigente aliquo addito.
Quemadmodum enim rhabarbari corrigens est
spica ad gr. vi. vel ℥ ss. sic agarici, zingiberis ℥ ss.

Mechoaca in infantibus à ℥ ss. ad ℥ ij. in adul-
terioribus à ℥ i. ad ℥ i. ss. addito corrigente vel in pul-
uere, & omnium optime, vel cum liquore aliquo.
In infusione vero ad ℥ ii. exhibetur; quamuis et-
iam mixta cum pane amygdalino, siquidem *ἁπλοῦς*
delicatulis exhiberi potest. Hæc etiam serosos hu-
mores educit. Eligendum autem albissimum, que-
madmodum agaricum albissimum & leuissimū.

H s

Turpe-

Turpethum album & gummosum eligitur, morbis frigidis & diuturnis conueniens, quod leuioribus permiscetur, & cum ventriculum subuertat, corpus perturbet, robustis tātum cōuenit; Corrigitur addito zingibere, mastyche, succo amygdal. dulcium, saccharo. Exhibetur autem in decocto, vel infuso per se quidem à ℥ i. ad ℥ ii.

Hermodaetylus à iuncturis pituitam trahit. Verum per se nihil fere purgat. Quare admixtione vehementiorum acuitur, & cum flatus generet, ventriculum lædat, cumino, aniso, cinnamomo, spica, zingibere corrigitur. Datur puluis per se ad ℥ i. decoctum ad duas.

Coloquinthis vehementissima est, quæ non tantum pituitam, sed & bilem vtramque & serum vehementer conturbando expurgat. Quare tantū ætate florentibus conuenit. Vix per se exhibetur, sed puluis eius præparatus à ℥ j. ad ℥. ℞. liquori conuenienti infunditur, deinde colatur & exhibetur. Et ex ea subtilissime trita & succo amygdal. dulc. diluto cum tragacanth. & mastyche trochisci fiunt vulgo Alhandal dicti. Plerumq; puluis iusculo aliquo pingui, vel liquore alio conueniente infusus exhibetur.

Composita vero phlegmagoga sunt diacarthammum, diaphenicum, catholic. electuarium de citro, electuar. Indum maius, benedict. laxatiu. quæ tamen non facile per os exhibetur. Hiera cum agarico, hiera diacoloquinthid. & quæcunque cōpositiones agaricum, turpethum & coloquinthidem recipiunt.

Ad pituitam citra febrim purgandam:

℥. rad.

℞. Rad. apii, fœnic. enula, sem. carthami an. ℥ ii,
folior. beton. hyssopi, maioran. an. p. i.
fem. anisi, fœnic. an. ℥ i.
f. decoctio pro dosi, colatura seorsim infunde
agarici trochisci ℥ i. ℞.
(Rhabarbari electi aliqui ℥ iii. etiam
addunt) fiat levis seruesactio.
In expressione dissolue catholici ℥ v.
diaphenici ℥ i. ℞. pro potu.

Quod si pituita crassa fuerit, ut in febre quoti-
diana:

℞. Rad. petroselin. apii, fœnic. sem. carthami
an. ℥ iii.
cichorii totius, summitatum hyssopi, cala-
menthi, an. p. i.
sem. fœniculi, coriandri prepar. endiu. an.
℥ ℞.
flor. cordialium an. p. i.
decocto colato infunde agarici recent. tro-
chiscati, rhabarbari electi. an. ℥ i.
vel sol. senæ. ℥ iii.
ebulliant parum, dein exprimantur.
dissolue syrupi rosar. pallid. ℥ i.
vel loco syrupi, diacarthami ℥ i.

(varia diacarthami compositio: secundum enim
officinarum nostrarum compositionem ℥ i. ℞. suf-
ficiant, Cordi autem ℥ ℞.)

Notandum hic, agaricum cum flatulentum &
nauseabundum sit, eius dilutum non est expri-
mendum, sed colandum. Quod si etiam turpetho
uti velis, tunc:

℞. Radic. petros. asparagi, gramin. an. ℥ iii.
turpethi

cichorii totius, betonic. calamenth. maioran.
an p. j. &c. vt supra.

Si vero turpethum in coquere nolis, tunc in colatura infunde agarici recens trochiscati, turpethi electi an. \mathfrak{z} j. cum zingiberis & masticis singular. \mathfrak{d} . \mathfrak{ss} .

Potiores vero, quæ sine decoctione conficiuntur, parantur vel ex diacarthami, secundum communem compositionem, vel diaphenici \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . cum syrapi rosarum pallidar. \mathfrak{z} j. quæ dissoluuntur in aqua conuenienti, vt betonicæ, maioranæ, scabiosæ, vel hoc modo:

\mathfrak{R} . Catholici & diacarthami an. \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} .
dissolue in decocto liquiritiæ: minima potuncula vero in humore pituitoso euacuando confici potest ex diacarthami nostri \mathfrak{z} ii.
dissolue in \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} .
vel aq. conuenientis addito \mathfrak{d} i.
aq. stillatitiæ cinnamomi, vel in vino.

Hiera diacoloquinth. denique vix per os exhibetur, nisi in frigidis grauioribus capitis affectibus, in parua tamen quantitate cum aliis exhibitur, vt si \mathfrak{d} ij. ad summum \mathfrak{z} i. aliis medicamentis commisceas.

Bilem educentia.

Simplicia bilem educentia, sunt medulla cassiæ a \mathfrak{z} ii. in infantibus ad \mathfrak{z} i. \mathfrak{ss} . quæ tamen & pituitam purgat; utilis affectibus thoracis; pulmonum, æstuantî ventriculo & hepati, renibus, vesicæ, tem-

cæ, tempore calidiori. Exhibetur autem plerun-
quæ forma boli, aliquando diluitur cum liquore
aliquo, si quis facile deglutire non possit: quod si
misceatur cū catholico, facilius diluetur: vt in hy-
pochondriaca melancholia, ventriculo calidiore:

℥. Cassia recent. extracta, catholicon. an. ℥. ss.
syrupi violati ℥ j.
vel syrupum in ℥. ii.
aq. bugloss. dissolue.

Manna quinetiam ab ℥. ss. ad ℥. ij. in iusculo galli-
næ vel decocto hordei exhibetur, hora vna ante
cibum. Sic syrupus rosar. pallid. ad ℥. iij. in liquore
conuenienti exhibetur; qui præter bilem etiam a-
quas ducit, obstructions hepatis, venarum mesen-
traicarum aperit, hydropi inchoanti febribus len-
tis prodest: at prægnantibus cum tormina excitet,
ora vasorum recludat, exhiberi non debet.

Syrupus de cichorea cum Rhabarbaro ab ℥ j.
ad ii, & plures. Hæc blanda sunt, & morborum
initis ad ventriculi impuritatem tollendam, ex-
hibentur.

Rhabarbarū alui profluuiis, sanguini vndiqua-
que erumpenti, vomitionibus etiam accommo-
datur. Sic & iis, qui ex alto lapsi sunt vel contusi,
quibus puluerizatum propinatur. Eius pulvis à
℥. ss. ad ℥ j. ss. exhibetur. Infusum vero à ℥ j. infan-
tibus ad ℥ iij. qua dosi etiam prægnantibus exhi-
beri potest, addita ℥ j. syrupi, de cichorea cum rha-
barb. Sunt qui ℥ j. masticare & succum elicatum
deglutire in affectibus hydropicis soleant.

Aloe à ℥ j. ss. ad ℥ ii. ss. cum hiera tam simpl. quam
composita commixta exhibetur.

Scam-

Scammonium, quod aquas educit, & humores sibi familiares statim propellit correctum, diagrydii nomine vel per se à gr. vj. ad vij. vel cum conserua aliqua, vt rosac. violacea, buglossi, exhibetur.

Sic etiam composita habentur, vt diaprunum tam simplex, quam solutiuum dictum, quod à ℥ ii. ad ℥. ss. Electuariū de succo rosar. à ℥ iii. ad ℥ v. vel vj. ad summum. Electuarium de psyllio, lenitiuum, catholic. Sic diaphenicum, confectio hammech, & ceteræ confectioes, quæcunque scammonium recipiunt, bilem purgant.

Melanagoga:

Atram bilem ducit senna, quamuis etiam bilem retorridam & vitellinam, pituitam etiam crassam expurget: præcipue humoribus in hypochondriis & visceribus hærentibus. Ad obstructionem enim viscerum & mesenterii inueteratas maxime fieri debet. Pueris, senibus optimum remedium, grauidis non inimicum. Alii folliculos, alii folia commendant. Probamus folia, quæ in puluerem redacta à ℥. ss. ad ℥ ii. in iusculo aut liquore aliquo exhiberi possunt. Decoctum vero à ℥ ii. ad vj. Notandum tamen, senniam longam coctionem non ferre, rectius siquidem hoc pacto exhibetur, si ℥ vi. vel ℥. ss. infundas, vel sero lactis, vel aquæ alicui conueniente, vel vino albo, additis corrigentibus, cum medicamentum sit & flatus & tormina excitans, cinnamomo vel aniso vel fœniculo ad ℥ i. & tantundem zingiberis. stent per

per noctem loco calido. Mane leui facta ebullione, colatura exhibeatur; puerperis hoc pacto exhiberi potest; si ℥ ii. foliorum cum ℥.β. sem. anisi in nodulum ligentur, & leuiter in iusculo bulliant, vel si cum prunis Damascenis dulcibus iam decoctis leuiter bulliant; saccharum ipsi iusculo addatur, pro purgante exhiberi potest: quo diutius enim coquitur, minus purgat, sed tormina non facit; minus cocta, liberalius purgat.

Polypodium quercinum ab ℥.β. ad ℥ i. si decoquatur in iusculo, blande humorem melancholicum euacuabit. Hellebori vsus antiquis familiarissimus, nunc vero præsertim albus raro in vsum venit, propter incommoda, quæ adferre solet, ab Hipp. enumerata. In diuturnis & contu- 4. aphorism.
macibus morbis, summa tamen cum cautione, vsurpari debet, præsertim in robustis, & morbis à melancholia ortis, ita tamen, vt corpus prius sit recte præparatum, monente Hippocrate. Exhibetur autem hellebori nigri rad. contusæ puluis ad ℥ j. in iusculo vel vino, vel hydromelite, vel alio conuenienti decocto. Tutius tamen exhibetur, si maceretur, quam si eius substantia exhibeatur. Plerumque incoquitur decocto cum reliqua meteria. Composita melancholiam ducentia sunt, confectio hamech, catholicum, diaphenicum, hieralogad. hiera Pacchi. potest etiam fieri potiuncula hoc modo:

℥. Polypod. quercini, buglossæ totius, cortic. rad. cappar. vel tamarisci, vel fraxini, passular. mundat. an. ℥ iiij.

prunor. damascen. numero iiii.

summi-

summitati lupuli, fumaria, thymi, epithymi
vel cuscute an. p. i.

sem. anisi, fœnicul. endiu. an. ʒ i.

flor. cordial. an. p. i.

f. decoctio. Infunde folior. sennæ mundator. ʒ. ʒ.

f. leuis ebullitio & expressio, in qua dissolue catholici, confectionis hamech an. ʒ. ii.

f. haustus pro vna dosi.

Ad humorem contumacem:

℞. Rad. polypod. quercini, cichorii totius, passular.
mundat. an. ʒ iii.

radicis hellebori nigri ʒ. ʒ.

betonica, fumaria, buglossa, ceterach an. p. j.

sem. coriand prepar. fœniculi an. ʒ. ʒ.

flor. cordialium p. j.

fiat decoctio in conueniente aqua.

Si vero & hepatis ratio habenda est, tunc & rhabbarum addi poterit. Sic pauperibus catholicis cum foliis sennæ, vel cum confectione hamech, vel etiam polypodii quercini solius cum seminibus fœniculi vsus esse potest. Exemplum:

℞. Catholici ʒ i.

confect. Hamech ʒ ii.

dissolue in ptisana additis ʒ iiiii. aut ʒ i. ʒ.
pulueris sennæ.

Vel

℞. Rad. polypod. quercin. ʒ i.

sem. anisi vel fœniculi ʒ ii.

decoque in iusculo, exhibeatur pauperi.

Diuitibus syrupus de epithymo, syrupus Sabor Regis dissoluti in decocto foliorum sennæ propinari potest.

Hydra-

Hydragoga

Medicamenta aquas ducentia, Hydragoga dicta, & quidem simplicia sunt, radix ireos, eaque in puluerem trita à ℥ i. ad ℥ ii. cum iusculo vel decocto rad. enulæ vel brassiæ marinæ; Vel eadem radix dissecta in taleolas vino albo, vel oxymeliti simpl. vel decocto ex radicibus aperientibus confecto infunditur, & decocti ab ℥ ℞. ad ℥ j. ℞. exhibetur; Vel ex radice succus elicitur, cuius dosis à ℥ i. ad ℥ ii. in liquore conueniente, addita nuce moschata aut cinnamomo, aut spica nardi, aut pulueris triasantali.

Cortex medius sambuci, eiusdem etiam baccæ idem præstant, minore tamen efficacia. Sic ebulli baccæ à ℥ j. ad iii. in liquore dissolutæ additis corrigentibus propinantur.

Sic est radix Asclepiadis cum radice asari. Fortior autem est radix cucumeris agrestis, quæ trita à ℥ i. ad ℥ ii. in oxymelite infunditur, colatur & exhibetur. Elatorium etiam, id est, succus ex fructu cucumeris agrestis à ℥ j. ad ii. Brassicæ item marinæ decoctum à ℥ i. ad ℥ ℞. Huc referri potest ricinus vterque siue cataputia maior & minor, à gr. v. ad vii. ex decocto fœniculi, nucis mosch. cinnamomi, passular. quod saccharo dulcorari debet. Plura dantur hydragoga, quæ cum magnopere corpus perturbent, partes exulcerent, & vasorum osculis reſeratis sanguinem eliciant, minus tuto exhibentur, vt est esula, tythymali species, chamælea, thymælea, quibus periculosius euphorbium, quod & ipsum corpus inflamat.

I

Præ-

Præstantissimum autem erit ad aquas ducendas: Radix mechoacæ pulu. à ʒ. ʒ. ad ʒ ij. in vino albo exhibeatur vel decoctis, & infusionibus adatur.

Composita sunt syrupus de rhamno, syrup. ex floribus persicorum: Sic etiam syrup. rosar. pallid. laxatiuus, diacarthamum: Vel

℞. Rad. ireos nostratis, enula, valeriana, vel asari an. ʒ ij.
 summitatū agrimon. chamedr. eupator. an. p. j.
 sem. dauci, anisi, cumini, an. ʒ. ʒ.
 flor. genistæ, bugloss. an. p. j.
 coq. in colatura infunde rhabarb. electi ʒ ij.
 cinnamomi ʒ. ʒ.
 in expressione dissolue syrupi rosar. laxatiuar.
 ʒ j. ʒ.
 f. haustus.

Efficacior erit, si granor. ebuli ʒ ii. addideris.

Pro pauperibus:

℞. Rad. ireos nostratis, asari an. ʒ iij.
 cortic. medii sambuci p. i.
 sem. cumini ʒ ij.
 f. decoctio & expressio dissolue syrupi de rhamno ʒ i. ʒ.

vel si mauis:

℞. Syrupi de rhamno ʒ ii.
 dissolue in aqua fœniculi ʒ i.

De vomitoriis.

C A P. XXIII.

Vomitoria vel euacuationis, vel reuulsionis grati-

gratia præscribuntur. Euacuationis, si in ventriculo humores contineantur, qui vel in ventriculo alimenti vitio geniti sunt, vel in ipsum ex aliis partibus confluxere. Reuulsionis gratia utimur in affectibus articularum inferiorum, ut dolore ischiadico, podagrico. Renum item & aliarum inferiorum partium affectibus. Obstant autem partibus superioribus, ut capiti, oculis, si ex consensu ventriculi non afficiantur. Pulmoni & thoraci non conueniunt propter periculum ruptionis alicuius vasis. Commode etiam in principio accessionis febrium putridarum vsurpantur. Prosunt quinetiam ad epota venena educenda, ubi purgantia, cum secum vim deleteriam per corpus vehant, minime conueniunt. At post fungorum venenatorum, qui strangulando nocent, esum, non vomitoria, sed purgantia prosunt.

Veteres frequenter vomitoria, maxime in diuturnis & contumacibus affectibus, exhibebant, vomitorio ex helleboro albo confecto. Solebant enim singulis mensibus semel vel bis vel sæpius etiam vomitoria sumere. Sunt autem vomitoria diuersa: Alia enim laxando, os ventriculi sinistrum, quod superius vulgo vocant, vomitum excitant, cuiusmodi sunt oleosa & pingua: quare communissimum est, ad imitationem Galeni *a*, hydræleum, id est, aqua tepida cum oleo ebibita. Alia humores incidunt, attenuant, detergunt, ut est oxymel, syrupus acetosus. Alia humores ad superiores ventriculi partes attrahunt, ut est hellebori albi radix: Sed non nisi in robusto corpore helleborus,

I a

&

b 4. Apho-
ris.

& is quidem bene præparatus, exhibendus, mo-
nente Hippocrate *b*, cuius fibræ à ᠓ i. ad ᠓ ii. ma-
ceratur, & in iusculo pingui carniū coquuntur,
vel cum oleo, butyro & aniso, vel in decocto leni-
enti cum cinnamomo & aniso, vel etiam in vino
dulci. Deinde expressum colatum cum ℥ ii. sac-
chari propinatur. Vel fibræ pomo alicui infigun-
tur. Parum coquitur, coctum, sublati tamen fi-
bris, deuoratur. Sic etiam raphani radicis succus
ad ℥ ii. cum affusione hydromelitis vel oxymelitis
simplicis ad ℥ iii. vel ℥ iii. seminis triti cum mulsā,
vel decocto lenienti vel pingui incoquitur & ex-
hibetur.

Asari folia viridia quinque vel octo teruntur,
cum hydromelite exhibentur, vel ℥ β. seminis e-
ius vel radicis. Exhibetur etiam iulorum nucum
in furno exiccatorum, in puluerem comminuto-
rum à ℥ β. ad ℥ i. cum vino albo.

Aliqui aquam ex nucibus viridibus cum oleo;
Vel hoc pacto:

℥. *semin. atripl.* ℥ β.
sem. anethi. ℥ i.
rad. raphani ℥ j.
decoque in aqua, decocti colati ℥ iii.
commisceantur cum ℥ i.
aqua nucum viridium, & tantundem olei
exhibeantur.

Vel.

℥. *semin. atiplicis,* ℥ β.
rad. raphani in taleolas incise ℥ i.
decoquantur in hydromelite, colentur. Co-
latura ℥ β. *tepidā propinetur.*

Vel.

Vel.

℞. Rad. raphani, sem. atripl. an. ℥ ss.

rad. asari ℥ i.

decoque in oxymelite simp. colatura tepida

℔ ss. datur.

Sic decocto deficiente:

℞. Oxymel. simpl. syrupi acetos. simpl. an. ℥ ii.

aque tepida ℥ iiii. bibatur.

In affectibus soporosis & paroxysmis epilepti-
cis ex vitio ventriculi causatis hiera simplex cum
aqua tepida propinetur. Sed notare cōuenit sem-
per, vomitoria tepida esse exhibenda, & si non sta-
tim succedat, tum vel penna oleo intincta, vel di-
gito faucibus immisso, titillando, vomitum acce-
lerare oportere, & si vires concedant, consilio
Hippoc. c corpus mouere. Vomitorio reiecto iu-
scula pingua exhibenda, vētricus etiam fouen-
dus, corroborandus.

c 4. A.
phorism. 2.

De vinis medicatis & purgantibus.

CAP. XXIIII.

ET si veteres iucundas, simulq; vtilis potiones
ex vino iniectis aromatibus confecerint, à qui-
bus aliquando etiam appellationes accepere, quæ a lib. 5.
vina factitia Tralliano dicta, de quibus Dioscori- b lib. 14. c 16.
des a, Plinius b, & Myrepsius c, qui pro affectuum c de comp.
diuersitate plura proposuit & propomata voca- medic. sect.
uit; quamuis proprie propomata Græcis fuerint 38,
dulces prælibationes ex vino & melle apparatus, 39, d detrah.
Actio d teste, quas in antecænio voluptatis gra- 30. 39, d detrah.

I 3

tia,

lib. 7. c. 15.

tia, vt compotationis præludium bibebant, & ex vini partibus quatuor & vna mellis conficiebantur, vt apud Æginetam e habetur. Nihilominus tamen eodem autore ex scammonio, aut grano cnidio, aut huiusmodi purgatoriis parabantur, aut etiam pro ratione affectuum medicamenta iniiciebantur, cuiusmodi plura Myresius proponit, & inter cetera ad ventrē subducendum ex polypodio, habet etiam ex asaro, fenna & epithymo. Ad horum imitationem solemus vina purgātia conficere. Nam cum Medicus ægroti moribus nonnunquam se accommodare debeat, & Germanorum plerique à medicamentorum vsu frequenti abhorreant, sicque humores vel iulepis vel decoctis ex artis præscripto præparare non liceat, alia forma ipsis gratior & scopo conueniens inuenienda fuit. Quare cum vinum naturæ amicum, & apud Germanos vinum absynthites in quotidiano pene vsu sit, & vinum ex medicamentis infusis vires facile eliciat, ac præpropere in singulas & abditissimas corporis partes velut optimum medicinæ vehiculum diffundat (cuius nomine Dioscorides de vino inter medicamenta, non alimenta egit) hanc ob causam eiusmodi vinis absynthio addito, quibus & humores præparare, eosdemque expurgare possumus, frequenter vtimur.

Duplicia ergo sunt vina medicata: Quædam enim solum alterant, quædam vero humores præparant, eosque sensim expurgant. Quæ alterant, vel prima qualitate vel secunda id præstant: Prima, vt calefaciendo, refrigerando &c; & quidem
vel

vel vnam tantum partem, vel plures eodem tempore. Sic calefaciunt caput vinum de beronica, roremarino, stoechade, saluia. Oculis prodest vinum ex euphrasia: Cor ipsum, vinum de borragine, melissa, vinum aromaticum, quod Hippocraticum dicitur. Thoracem vinum ex hyssopo, vel marrubio albo, vel enulæ radice. Ventriculum, vinum absynthii. Hepar, vinum chamædreos. Lienem, ramarisci. Renes & vesicam, vinum alkekengi vel saluiæ. Alia vero secunda qualitate alterant adstringendo, vt vinum rosaceum, vinum è punicis, vel ex pyris vel prunis syluestribus. Sudorem prouocant vinum guaiacum. Venenis resistit, vinum zedoariæ, de quibus & Diosc. lib. 5. & Arnoldus de Villa noua,

Quæ vero purgant, vel expurgant humorem simplicem, vel mixtos. Simplicem, vt bilem flauam, vinum scammonites: bilem atram, vinum ex helleboro nigro: pituitam vinum squillicum apud Galenum: Vel aquam, vinum è granis ebuli & chameleæ, vel thimeliæ ex Dioscoride.

Parari autem poterit vinum absynthites aquas purgans hoc pacto:

℞. Summitat. absynthii, cardui benedicti, an. p. ℞.
 agrimon. chamedr. an. p. i.
 brassica marin. p. ℞.
 folior. senna diligenter à stipitibus mundat.
 ℥ ij.
 rad. ireos florent. ℥ j.
 radic. asari, mechoaca albiss. ononidis an.
 ℥ ℞.

I 4

salami

calami aromatici, galanga minoris an. ℥ ii.

sem. anisi, fœniculi, an. ℥ j.

vini albi ℔. viii.

stent in infuso calidiore loco.

Ad mixtos vero euacuandos humores tale parari poterit:

℥. Absynthii, centaur. minoris, cardui bened. an. p. i.

herbar. agrim. chamædr. an. m. i.

folior. sennæ mundator. ℥ ii.

radic. turpethi gummosi ℥ ℔.

mechoacæ albiss. ℥ iii.

calami aromatici ℥ iij.

semin. anisi, fœnicul. an. ℥ i, ℔.

cortic. arantior. sicc. ℥ iii.

Herbarum stipitibus reiectis, radicibus incisis, & omnibus simul leuiter contusis vasi indantur, vini albi ℔. vi. aut viii. affundantur, stent obturata loco calidore horis 24. ante vsu. Sic si caput expurgare velimus, loco agrimonix, betonicæ flores & stoechades adiciemus; Si pectus, vt in angustia pectoris, difficili respiratione, tussi, addi potest scabiosa, hyssopus, radix enulæ: Silien, lingua ceruina, ceterach, summitates vel cortices tamarisci: Si renes expurgare velimus & vesicam, radix ononidis, ireos vel fœniculi vel apii adicere possumus.

Exemplum vini absynthitis in affectibus thoracis:

℥. Herbar. betonica, scabiosa, hyssopi, capillor.

Veneris, an. p. i.

Absynthii, cardui benedict. an. p. ℔.

fol. sennæ mundator. ℥ ii.

rad.

rad. enula, iridis florent. an. ℥ iii. vel ℥ ℞.
semin. anisi, fœnicali an. ℥ ii.
calami aromatici ℥ iii.

Herbarum stipitibus reiectis, radicib. incisis & leuiter simul omnibus contusis indantur vasi, superinfundantur vini albi veteris ℔ vi. stent loco calido bene obturata per noctem.

In febre quartana vel obstructione lienis:

℥. Herbar. chamadr. lingua ceruina, ceterach
an. p. i.

summitatum tamarisci, vel eiusdem corticum tantundem, epithymi oriental.
℥ i.

folior. sennæ mundator. ℥ ii.

rad. polypodii quercin ℥ i. ℞.

ellebori nigri ℥ ℞.

rad. cappar. ℥ i.

calami aromatici ℥ iii.

sem. anisi, fœniculi, an. ℥ i. ℞.

incisa, contusa infundantur ℔ viii. vini
absynthitis. stent obturata loco calido.

Modus componendi vina purgantia.

Vina hæc medicata, quæ alterandi causa fiunt, veteres aliquando omnia contusa, aliquando integra vino infundebant; aliquando incoquebant; aliquando & mel addebant: At nunc, tempore vindemiarum conficiuntur, herbis & radicibus exiccatis in mustum coniectis, quod vno vel altero mense post, cum vinum iam deferbuerit & defæcatum fuerit, transfunditur, ne si iniecta medicamenta diutius remaneant, corrumpantur. Purgantia vero in vetustius vinum coniectis

I 5 medi-

medicamentis, & maceratis loco calidiorē, hyberno quidem tempore post fornacem conficiuntur.

Vsus vinorum medicatorum alterantium est, alterno vel tertio die in principio prandii. Purgantium vero, posteaquam horis 24. in infuso steterint, horis duabus ante prandium, præmisso tamen iusculo, & quidem vel quotidie vel alternis diebus, si febris impediāt, vel prout frequentiores deiectiones causabit. Communiter autem hæc vina purgantia duabus à cibo horis aluum mouere solent. Horum vero vinorum cathartecorum præcipue vsus esse potest hyberno tempore in morbis frigidis & chronicis, quæ syrupis præstantiora sunt.

De Pilulis.

C A P. XXV.

INter alia medicamenta, quæ in officinis afferuntur, sunt massæ, vel magdaleones, ex quibus pilulæ conficiuntur. Sunt autem pilulæ *medicamenta figura rotunda, quæ parua quantitate, sed integra semel deuorantur, ad medicamenti insuauitatem fallendi inuenta*. Dicuntur pilulæ à rotunda forma parua-pilæ, Græcis *καταπότις*, ab absorbendo, vocantur, apud quos catapotia omnia illa appellantur, quæ non diluuntur, sed vt sunt, deuorantur, vt ex Scribonio Largo ^a & Marcello Empyrico ^b colligitur.

Inuentionis causa duplex est, vna, vt hæc, parua quantitate accepta, ægros minus molestant: altera, vt dum diu in ventriculo subsistunt, e partibus

^a cap. 87.

^b cap. 26.

bus distantibus melius, ut e capite, ubi præcipue earum usus, pulmone, articulis, corporis uniuersi habiru, humores ad ventriculum trahant.

Materia earum petitur à plantis, de quibus supra fuit dictum, gummatis, lacrymis, lapidibus aliquot, ut lazuli, armenio, ita quidem, ut quæ sicca sunt, in puluerem conterantur vel contundendo mollescant, ut aloë, scammonium, gummata, quæ simul aut melle, aut syrupo, aut succo aliquo aut aquo stillatitia, aut mucilagine, excipiuntur, & ita in massam finguntur, quæ cum leuiter in umbra fuerit exiccata, vel vesica vel chorio inuoluitur, vel papyro ceræ liquatæ intincto, sicque pyxidibus stanneis reponitur.

Deplices sunt pilulæ, aliæ quarum massa iam est præparata in officinis: aliæ vel ex his mixtis liquore aliquo relaxatis vel ex diuersis simplicibus pro re nata ex præscripto conficiuntur. Sumuntur autem differentiæ pilularum ab humoribus, quos educunt: aliæ à partibus, quibus conueniunt, quædam ab effectu, quædam ab actionis modo.

Ab humoribus quidem; Phlegmagogæ sunt pilulæ de agarico, aggregatiuæ, cochia, lucis maiores & minores, de hermodactylis, ex hiera compositæ cum agarico vel coloquinchid. è turpetho; arthritica, fœtida, e sarcocolla, e sagapeno, opopanace, de euphorbio, de benedicta laxat. Sed hæ omnes valentiores sunt: quare si ventriculus pituita sit refertus, prius mitioribus vacuandus erit.

Cholagogæ mites & stomachicæ, quæ ventriculum

culum & primas vias blande purgant, sunt in officinis pilulæ de hiera simpl. Ruff. Sic pilulæ communes, quæ de tribus appellantur. Pilulæ ante cibum, pil. mastichinæ, pil. asaiereth, quæ à ʒ. ʒ. ad ʒ ii. vel ad ʒ i. exhibentur. Valentiores, & totum corpus euacuantes, sunt, sine quibus, aureæ, de rhabarbar. & eupatorio, imperiales, ex quibus nonnullæ etiam pituitam purgant, vt sunt eæ, quæ agaricum, coloquinthem, turbith, asarum & alia pituitam educunt, recipiunt, vel quæ eandem præparant, quæ tamen potissimum bilem respiciunt, cum plus scammonæ recipiant.

Melanagogæ sunt pilulæ de fumaria, inde de lapid. lazuli, de lapid. armeno, & quæ ex hellebori nigri & sennæ puluere cum aliis efformantur.

Hydragogæ esse possunt omnes eæ, quæ pituitam ducunt, & præter has pilulæ e thymelea, e mezereo.

A partibus, pilularum differentia altera sumitur. Capiti enim propriæ sunt de agarico, aureæ, sine quibus, cochia. Oculis vero per se laborantibus pilul. lucis maiores & minores. Si vero per consensum ventriculi afficiantur, pilulæ de hiera, duplata tamen dosi ipsius aloes.

Pulmoni, pilulæ de agarico, quibus addunt nonnulli in asthmate & orthopnoea, febre absente, sulphur, quod in corpore humido concedi potest.

Ventriculo stomachicæ, mastichinæ, de hiera, asaiereth.

Hepati de rhabarbaro, de fumaria.

Lieni

Lieni de fumaria, pilulæ Indæ, de lapide lazuli, & quę recenter ex puluere sennę, epithymo, scammonio, helleboro nigro parantur.

Vteri affectibus foetidæ, & quæ capiti profunt.

Articulis denique pilul. arthriticæ, de hermodactylis. Cautione tamen hîc opus. Nam si fluxio vehemens non sit, tunc validioribus uti possumus: si vero humoris magnus sit affluxus eumque expurgare velis, modice laxantibus & adstringentibus utendum, ut,

℞. Pilul. arthriticar. ℥ i.

myrobalan. citrin. rhabarb. an. ʒ. ss.

oxymelite simplici excipiantur.

Commendantur & pilulæ chamæpytheos Matthioli, ex quarum ℥ i. pilulæ nouem formantur, de quibus arthriticus præcautionis, quam purgationis loco singula vespera cubitum iturus iij. summat.

Ab effectu etiam differentię sumuntur. Etenim quandoque purgant adstringendo, ut quæ rhabarb. myrobalanos, & rosas accipiunt; aut purgant laxando & fundendo, ut e castoreo & opopanace, foetidæ; Aliæ fundendo, ut de euphorbio, quibus propter euphorbii violentiam non facile utimur; Aliæ in totum fistunt, ut sunt pilulæ de cynoglossa, quibus in summis doloribus & vigiliis, destillationibus acerrimis, à tenui humore in fauces caussatis, & ad dysenterias contumaces utimur. Caute tamen & natiuo calore adhuc vegeto existente, exhibendæ.

Quædam expectorationem adiuvant, & Becchicæ dicuntur: Aliæ sanguinem sistunt: aliæ semen

men genitale augeat: Aliæ liberant obstructions,
quæ ex pulueribus trochiscis & electuariis confi-
ciuntur: Aliæ renum æstum & urinæ ardorem
mitigant.

Quæ denique ab actionis modo sumuntur,
facultatem ab iis, ex quibus componuntur, as-
sumunt.

Nunc exempla aliquot subiiciamus:

Ad oculorum suffusionem vitio ventriculi
caussatam:

℞. Specier. hieræ, (aloes dosi geminata,) aloes
lota in aq. fœnicul. vel euphrasie an.
℥. ℞.

rhabarb. electi, agarici trochiscati an. ℥ i.
excipiantur oxymelite vel syrupo de betoni-
ca &c. fiant pi'ule.

Dosis erit à ℥. ℞. ad ℥ j. semel aut bis in hebdo-
made sumendo.

Ad ventriculum humidiores, debilem vel
præcautionis vel curationis morbi diuturni caul-
sa, tempore hyberno:

℞. Aloes lota in aq. absynthii ℥. ℞.
rhabarb. electi pulueri ℥. ℥ iiij.
agarici recens trochisc. ℥ i.
puluerizata excipiantur syrupo de mentha,
& massa conficiatur, quæ ad vsum con-
seruetur.

Dosis erit ℥. ℞. vel ℥ ij. vel ℥ j. sumendo hora v-
na ante pastum.

Quod si cum imbecillitate adsit obstructio ve-
narum mesaraicarum, addemus specierum electua-
rii triasentali ℥ j. cinnamomi gr. vj. & excipientur

cum

cum syrupo de mentha vel oxymelite. Vbi vero ventriculus medicamenta vomitu reiicit, ex solo rhabarbaro confici possunt.

℞. Rhabarb. elect. pulu. ℥ iiij. vel ℥ i. ℞.
cum syrupo de cichorea cum rhabarbaro. formentur pilule.

Hæ etiam ad nimiam sanguinis excretionem conferunt, si cum aqua plantaginis excipias.

Ad menstrua mouenda ex aloe non lota conficiuntur, quæ ad ℥. ℞. diebus tribus aut quatuor ante periodum exhibentur. Nam vbi venarum obstructiones tollere volumus, non abluimus, sed tum, cum à calore aut siccitate metuimus: vel parabuntur hoc pacto:

℞. Aloes hepatica ℥ i. ℞.
myrrhæ elect. ℥ j.
sagapeni, boracis, an. ℥ ℞.
castorii ℥ ij.
croci ℥ j.
specier. diamb. ℥. ℞.
olei anisi guttas v j.
omnia simul contusa excipiantur vino maluatico, & in massulam cogantur.

Harum dosis sit ℥. ℞. vel ℥ ij. vtamur præmissa tamen purgatione alternis diebus septimana ante periodum; Vel alio modo:

℞. Rad. aristolocb. ℥. ℞.
radic. & seminis pæonia, gentiana, myrrhæ
an. ℥ ii.
aloes ℥. ℞.

anna

cinnamo ℥ i.

Excipiantur syrup. de hyssop. vel de arthemisia.

Quæ vero valentius & humores ex longinquo educunt, vt ad pituitam & aquas ducendas:

℥. *Massæ pilul. cochiar.* ℥ ii.

sine quibus ℥ i. *trochisc. alhandal. gran.* ij.
vel iij.

cum oxymelite diligenter misceantur.

Sunt etiam, qui turpetho acuant pilulas, quas pituitam crassam è longinquis euacuare debent.

Quando vero & pituita tenuis euacuanda, tunc aliqua adstringentia, vt est puluis rhabarbari, myrobalanor. mastichis, admiscantur, vt si fiat pituitæ destillatio in articulos:

℥. *Massæ pilul. de agarico, de rhabarb. an.* ʒ ss.
rhabarb. pulu. ℥ i.

cum syrupo rosar. pallid. fiant pilule.

Vel hoc pacto:

℥. *Agarici* ℥ ij.

rhabarb. pulu. ℥ i.

trochiscor. alhand. gr. iij.

cum syrupo de mentha. f. pil.

Ad bilem ex longinquo vacuandam:

℥. *Massæ pilular. sine quibus.* ℥ iiij.

cum oxymelite simpl. remolliantur. Fiant pilul. numero v. vel vij.

Si efficaciores volueris:

℥. *Pilular. sine quibus & aurear. an.* ℥ ij.

cum syrupo de stoechade formentur pillule.

Quod si vero plus pituitæ, quam bilis, educere voles:

℥. Pi-

℞. Pilular. sine quibus, & aurear. an. ℥ ii.
cum syrupo de stœchade. formentur pilulæ.

Quod si vero plus pituitæ, quam bilis, educere
voles:

℞. Pilul. cochiar. ℥ i.
cum oxymelite, fiant pilulæ.

Vel

℞. Pilul. cochiar. & sine quibus, an. ℥ ii.
cum syrupo conuenien. fiant pilulæ.

Vbi vero alius difficilius mouetur, & crassiorem
bilem educere volumus, acuantur pilulæ ii, aut iii.
gr. diagrydii. Sic etiam acuere possumus pilulas,
quo minor earum sit dosis, vt pote pil. cochiar. ℥ ii.
diagrydii gr. iiii. vel v.

Ad humorem melancholicum: (Licet potio-
nes vtiliores sint, cum humor hic humectatione
fluxilis reddatur:)

℞. Pilular. indarum de fumaria an. ℥ ii.
excipiantur oxymel. vel syrupo de buglossa. Vel
hoc modo:

℞. Pilul. de fumar. ℥ ij.
sine quibus ℥. ss.
excipiantur simul vino, in quo radicum h. He-
bori nigri ℥ i.
cum mastice vel spica granis aliquot infusa
sint.

Alia catapotiorum genere ad obstructions
soluendas ex trochiscis, ex pulueribus syrupo ali-
quo conueniente exceptis, aut succo aliquo con-
ficiuntur: vt in suspitione hydropis vel obstru-
ctione hepatis:

℞. Rhabarb. elect. ℥ i.

K

Tro-

trochisc. de eupator. \mathfrak{D} i.

pilul. aggreg. \mathfrak{Z} i.

gummi ammon. dissolut. in succo ireos \mathfrak{D} . \mathfrak{B} .
cum succo rad. ireos formetur massula.

Cuius dosi singulo triduo \mathfrak{Z} . \mathfrak{B} . duabus horis ante prandium exhibetur: Vel hoc pacto in hepatis obstructione,

\mathfrak{R} . Trochiscor. de absynth. de rhabarb. an. \mathfrak{Z} . \mathfrak{B} .
f. puluis, excipiat syrupo de cucurea, aut
cum aqua agrimon. f. pilula, quas tribus horis ante prandium sumet, vini albi parum superbibendo.

In lienis obstructione.

\mathfrak{R} . Trochisc. de capparib. \mathfrak{D} ii.
ceterach pulueriz. rad. gentiane pulueriz.
an. \mathfrak{D} . \mathfrak{B} .
puluerizata syrupo de byzant. excipiantur.

Ad sanguinem undique manantem sistendum, ex incrassantibus & adstringentibus hoc pacto fiunt.

\mathfrak{R} . Terra sigillata, boli armeni tota in aqua rosarum an. \mathfrak{D} ii.
coralli vtriusque, lapid. hematitid. an.
 \mathfrak{D} i.
masticis \mathfrak{Z} . \mathfrak{B} .
puluerizata excipiantur syrupo è rosis siccis,
vel myrtillorum vel cydoniorum, f.
massa,

ex qua \mathfrak{Z} j. ante somnum & mane duabus vel tribus horis ante cibum exhibetur.

Tandem ex succis præstantissimæ conficiuntur hoc pacto:

\mathfrak{R} . Fo-

℞. Folior. betonic. meliss. salvia recent. an.
m. j. ℞.

maiorana m. j.

irrigantur vino optimo, macerentur per biduum, & per torcular exprimantur.

Vel,

℞. Vini huius expressi ℥ iiii.

aloes pulu. ℥ i.

folior. senna pulu. ℥ i. ℞.

agar. opt. ℥ ℞.

turpethi electi ℥ iii.

diagrydii optimi ℥ ℞.

siccantur simul in hypocausto & frequenter agitentur, quoad redeant in massam: quæ postea pistetur cum ℥ iij. eiusdem vini: iterum resiccetur, & id tertio fiat aut quarto, & diligenter pistentur. Deinde ubi in firmam massam coaluerint, seruentur in corio ad usum.

Vel,

℞. Huius massæ ℥ j.

formentur pilulæ vj.

sumantur tres tribus horis post cœnam: Reiterentur bis aut ter in mense. Harum insignis usus in antiquis capitis doloribus à catarrho causatis, quem lente exsiccant, & contra aurium tinnitum: Ita tamen, ut pilularum sine quibus, cochiarum & aurear. usus præcedat.

Usus pilularum multiplex est. Præcipuus quidem ad corpus ab humore excrementitio purgandum: Quare morbis diuturnis & contumacibus conferunt, modo febris intensior non fuerit;

K

z

ind

in quarum etiam initio vsurpari non debent, cum à calida pilularum materia febris augeatur. Plurimus quoque vsus ad destillationes, tussim & thoracis affectus: quare & veteres ad sitim sedandam peculiare conficiebant: quas catapotia, α-
 δυψα dicta fuisse Galenus c. monet.

c. 8. de comp.
 med. κατὰ
 τόπους.

Ex dictis patet, confici pilulas ex amaris, acerbis, foetidis, cum communiter basis earum sit aloe, aliisque lacrymis additis, quæ malitiam eorum corrigunt, omnibus tritis cum succis, in massam, ut dictum, reducuntur, & ad vsum reponuntur.

Reseruari autem possunt purgantes ad annum, & diutius. Quamprimum vero situm varii coloris contraxerint, amplius iis non vtendum. Quæ vero opium recipiant, in duos, tres vel plures annos asservari possunt, & cum iis vti volumus, dosis præscripta ab ipsa massa sumpta rursus teritur, & cum syrupo vel succo vel liquore aliquo conueniente, vel olei anisi (ad tormina mitiganda) guttis aliquot in pilulas vel maiores, vel mediocres, vel minores efformantur.

Maiores tamen conueniunt, cum ex longinquis humores attrahere volumus, quales sunt capitales etiam arthriticæ dictæ. Minores à vicinis partibus ducere oportet. Antiquitus pilulæ forma & mensura ciceris conficiebantur, ut ex Galeno d. colligitur, qui suarum cochiarum vndecim ad formam & mensuram ciceris exhibet. Ciceris autem mensura granorum ij. s. erat. Nunc vero rotundæ, modo plures, modo pauciores pro ægri voluntate conficiuntur, ita tamen ut conueniens dosis obseruetur. Purgantium quidem à 3 j. ad ʒ iiii.

d. 1. de comp.
 pos. medic. se-
 cundum lo-
 ca 2.

℞ iiii. Quibus vero ad somnum utimur, ut sunt de cynoglossa ℞ i. vel ʒ. β. sufficit. Sic & becchicarum, quæ ad sistendos catarrhos delabentes conficiuntur, & sub lingua, donec liquecant, detinentur, dosis est à ℞ ij. ad ʒ j. Idem dicendum de pilulis, quibus veteres ad sitim sedandam utebantur.

Tempus utendi varium est, siquidem capitales vel statim post primum somnum, mediæ nocte, vel quatuor horis à leuiore cœna: Stomachicæ vero una vel duabus horis ante cibum: Quæ vero aluum mouere & purgare debent, mane horis quinque vel quatuor ante cibum deglutiri debent; quibus sumptis horam superdormire licet, & horis duabus vel tribus post, iusculum pisorum superbibendum.

Modus sumendi: cum integræ deglutiendæ sint, quo ipsarum amaritudo mitigetur, plerunque pulvis cinnamomi, vel pulvis radicis liquiritiæ aspergitur. Alii cerasis conditis vel passulis enucleatis indunt. Alii carni pomorum coctorum inuolunt. Alii cum iulepo vel syrupo aliquo ex cochleari sumunt. Alii cum ouo, (minus recte) deglutunt. Omnium autem rectissime, si singulæ nebulæ inuoluantur vel deaurentur.

De Bolis.

CAP. XXVI.

BOLUS medicamentum est forma media inter liquida & solida; utpote molli consistentia, qua a buccella differt; & partim integre, partim vero per
K 3 frustu-

frustula deuoratur. Inuenta hæc forma in gratiam eorum, qui potiones, pilulas, tabellas & similes medicamentorum formas fastidiunt. Dein vt ventriculus exiccatus humectetur, quod à potione subito præterlabente fieri non potest: Quare in febribus ardentibus bolus ex cassia cum syrupo violato præscribitur. Differentia autem bolorum est, quod alii ad purgandum, & quidem vel primas vias, vel ex alto humores educentes; alii ad alterandum; alii ad corroborandum; nonnulli ad mouendas vrinas, quidam ad somnum conciliandum instituuntur.

Purgantes boli aliquando ex simplicibus medicamentis purgantibus, aliquando ex solis antidotis liquidis purgantibus; aliquando ex solis antidotis, speciebus corrigentibus additis, quæ vel liquore vel syrupo vel saccharo excipiuntur, & aliquando deaurantur, aliquando non, & ab ℥ i. ad ℥ ii. exhibentur.

Bolorum purgantium materia est cassiæ recenter extractæ medulla, catholicon, confectio hamech, diaphenicum, diaprunum simplex solutium, elect. de succo rosar. electuar. lenituum & similes confectioes supra explicatæ. Addeatur his i habarbarum puluerizatum, agaricum, pulpa sebesten, nonnunquam etiam conseruæ & diagrydium. Vt si bilem vtramque purgare velis:

℥. Cassiæ rec. extract. ℥ vj. catholici ℥. ss.
f. bolus, exhibeatur cum syrupo violato, vel cum saccharo.

Valentior erit, si addes vel electuar. de succo rosar.

far. & diapruni solutiui: vel diaphenici ℥i. cum puluere rhabarbari, vt:

℥. Cassia recens extracta ℥i.

rhabarb. electi pulueriz. ℥iiii. f. bolus.

qui & bilem & pituitam purgabit. Parari potest cum pulpa sebesten, præsertim in affectibus renum, vesicæ, & ardore vrinæ, hoc pacto:

℥. Cassia rec. extracta ℥j.

pulpæ sebesten ℥ii. cum diatragacantho frigido puluerizato. fiat bolus.

Sunt, qui purgationum omnes formas respiciunt, purgatione tamen indigeant, tum conserua violar. vel rosarum cum diagrydio exhiberi potest: exempli gratia:

℥. Conserua violar. & rosar. an. ℥i.

diagrydii gr. viii. misceantur.

Hic bolus horis tribus ante cibum exhibeatur.

Sic in affectibus renum ad vrinas ducendas, easque partes, siue ob litem veneream, siue aliam ob causam exulceratas, conficiuntur ex terebinthina Veneta diligenter lota, exhibentur cum conserua rosarum hoc pacto:

℥ Terebinthina Veneta sapius in aqua parietaria lota ℥. s. vel ℥vi.

electuarii diatragacanth. tabulati vel sacchari candi ℥ij.

fiant boli pro tribus dosibus, inuoluantur nebulis, & cum syrupo de althea vel de radicibus, duabus aut tribus horis ante cibum deglutiantur.

Verum aduertendum, totius corporis euacuationem præcedere debere, antequam tales boli

exhibeantur: siquidem terebinthina non solum vim habeat emplasticam, renes expurgantem & aluum subducentem, sed etiam in impuro corpore secum ad renes excrementa trahentem, sicq; earum partiū obstructions augere poterit.

Quod si efficacius & vrinas mouere & obstructions tollere velis, rhabarbari (cum vrinas moueat) pulu. ʒ. ʒ. vel ʒj. admiscebis, præsertim si fomentis, & linimentis, potissimum ex oleo scorpionum partes molliantur. Si vero lapis in vteribus subsistat, tunc lapidis iudaici ʒj. vel tantundem pulueris ele&uarii Ducis, vel lithontribi addemus.

Alterantes vero vel confortantes boli, qui potiss. post purgationes exhibentur, conficiuntur ex conditis, vel conseruis calidis in morbo frigido, frigidis in morbo calido. Exemplum in frigidis:

℞. Conseru. rosar. radic. enula & acori condit. an. ʒ. ʒ.
cum saccharo fiat bolus.

In calidis:

℞. conseru. violar. & nimpheæ an. ʒ. ʒ.
cum saccharo in forma boli exhibetur.

Cor ipsum corroborans fit ex conseruis violar. borrag. buglossæ, rosarum, nympheæ & aliis, & ex antidotis, vt confectione alkermes, mithridatio, theriaca; Pulueribus item cardiacis, vt rosmar. cornu ceruini, eboris, ossis de corde cerui. Commendant aliqui fragmenta pretiosior. lapidum, vt hyacynthi, saphyri, granati, carbunculi & similia; margaritas, corallium album & rubrum, crystallum & similia. Exemplum:

℞. Con-

℞. Conserua violar. rosar. an. ℥.ss.

theriacæ vel mithridatii ℥i.

rasuræ eboris, cornu cerui, ossis de corde cerui

an. gr. vi. vel viii. addunt aliqui toti-

dem gr. margaritarum electarum.

f. bolus. exhibetur tempore somni.

Ad alui fluxum paratur ex conserua rosarum antiqua, carne myrobalanorum conditorum, carne cydoniorum, conseru. rad. symphyti, corallo utroque, carabe, lapid. hæmatitide, terra sigillata, bolo armeno, miscentes conuenienti dosi cum syrupo rosar. siccat. vel myrthino, vel cydonior. aliove adstringente.

Ad conciliandum somnum & stupefaciendum sensum in dolorib. acerbissimis fiunt boli, & morbo & parti affectæ conuenientes, cū opii gr. i. vel ii. vel requietis Nicolai ℥. ss. vel tantundem theriacæ aut mithridatii rec. (vtrumque enim infra sex menses narcoticum est) exhibetur.

Exemplum ad conciliandum somnum in ardentibus febribus:

℞. Conserua violar. ℥i.

opii gr. j. vel ij.

specier. dia margar. frigid. gr. iiij. vel iiij

f. bolus hora somni sumend.

In affectibus vero frigidis & colica à flatu causata philonii Romani à ℥. ss. ad ℥i. cum conserua anthos, betonicæ vel bugloss. vel extracti ipsius ℥. ss. exhibetur.

Quod si horum narcotiorum vires acuere vel promouere volumus, vini cochlear vnum superbibere imperamus.

De

De electuariis siue antidotis solidis.

C A P. XXVII.

a 1. de anti-
dot.

Electuarium dictum videtur, quod ex electis & præstantioribus fieri soleat. Græci *antidota* appellarunt. Sunt autem Antidota, monente Galeno a, *Medicamenta, quæ intra corpus assumpta prauis affectibus medentur, & grauissimis casibus auxilio sunt; vt quæ, sicut ait Celsus, recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel vbi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus, sed maxime aduersus venena, quæ vel per morsus, vel per cibos, vel per potiones nostris corporibus communicantur.* Triplex autem eorum differentia à Galeno proponitur: Alia namque lethalium medicamentorum gratia offeruntur; Alia aduersus bestias, virus eiuculantes valent: Alia denique morbis ex prauo victu contractis, opitulantur: quæ rursus vel sunt solida, vel liquida. Liquida, vt confectiones aromaticæ, lenitiuæ, purgantes & opiata. De solidis sermo erit.

b lib. 7. c. 5.
c tetrab. 1.
serm. 3. cap.
100.

Electuarium seu antidotum solidum, quod vulgo confectionem solidam appellant, videntur Græci *βυκελλαιον* appellasse, buccellatum apud Æginetam b, & buccellam apud Aetium c verterunt. Fuit autem Græcis medicamentum in panis formam concinnatum purgandi vim habens, vt apud Æginetam paratur ex scammonæ tostæ ℥j. piperis & seminis apii an. ʒj. fœniculi & anisi an. ʒi, mellis lb. i. quæ mediocriter tosta asseruabatur & ʒi. pondere exhibebatur. At Aetius scammoneam cū iis, quæ vitium eius emendant, & cum fermento in cli-

in clibano coquit, & artiscos efficit, bilē sine mo-
 lestia expurgantes, quos ieiunis exhibet. Sic & no-
 tra electuaria solida parantur ex pulueribus sim-
 plicibus, aut compositis, saccharo ad ignem disso-
 luto, iniectis, quæ simul spatula agitatis, ac cōmix-
 tis in aliquam formam rediguntur. Vel enim figu-
 ra quadrata tunc tabulæ aut tabulata nominatur:
 vel oblonga, morselli & lozengia Barbaris; vel
 rotunda, & dicuntur orbiculi seu placentulæ, &
 etiam rotulæ. Dosis autem talis est, vt puluerum
 laxantium ℥ j. sacchari ℥ iij. vel iij. addantur: licet
 alii ad ℥ j. ℞. specierum sacchari ℞. vnam assumāt.
 At diagrydii quantitas in tabellis sit. gr. viij. vel x.

Hæc rursus vel sunt purgantia, vel alterantia, &
 corroborantia. Purgantia fiunt ex medicamentis
 aluum soluentibus, quæ in puluerem rediguntur,
 quib. saccharum in aqua stillatitia aliqua, humori
 euacuando accommodata, dissolutum additur; &
 Tabulæ purgantes dicuntur; quæ vel in officinis ha-
 bentur, vel ad istarum imitationē parantur. In offi-
 cinis habentur bilem ducentia, de succo rosarum,
 stomachicū laxatiuum. Pituitam tabellæ de citro,
 diaturbith. Serosos vero & mixtos humores dia-
 carthamum, quod per se exhibetur à ℥ iij. ad ℥ vi.
 vel diacarthamum secundum descriptionem offi-
 cinarū nostrarum à ℥ i. ℞. ad ℥. iii. sumitur: secundū
 aliarū cordi descriptionē sequentiū à ℥ iii. ad ℥. vi.

Talis est compositio.

- ℥. Diagrydii, turperhi, an. ℥. j.
 medulla sem. carthami ℥. ℞.
 cinnamomi, zingiber. sp. diatr. frigid. an. ℥ ii.
 cortic. citri siccat. carnis cydonior. an. ℥. j.
 sacchari

sacchari candi ℥ j.

sacchari albi diss. in aq. ros. ℥ x. misce, f. tabella.

Vel exhibentur mixta in forma potiunculæ, vt:

℥. Diacarthami nostri ℥ i. ℞.

de succo ros. ℥ ii.

dissolue in vino vel aqua conuenienti q. s.
vel in diluto senna, rhabarb. agar. vel
denique in iusculo.

Quædam ad horum imitationem recens parantur, quorum materiæ sunt medicamenta purgantia, vt puluis folior. sennæ, rhabarbar. agarici, mechoacæ, turpethi, diagrydii, coloquinthid. in trochiscos redacti, & similia. Quibus accedunt corrigentia, & ea, quæ purgantium vim adiuuant, vt ad pituitam hoc pacto:

℥. Rad. mechoacæ albiss. ℥ i. ℞.

diagrydii gr. ij. cum saccharo, q. s. f. tabella pro dosi.

Ad bilem:

℥. Rhabarb. electi pulueriz. ℥ ℞.

spicæ nardi, cinnamomi, an. ℥ i.

diagrydii ℥ ℞.

fiat puluis, qui saccharo in aqua rosar. dissoluto excipiat, & tabella ℥ iij. vel ℥ ℞. formentur pro dosi.

Aliquando pulueris diacarthami ℥ ii. & rhabarb. ℥ i. cum saccharo miscentur, & tabella pro dosi formatur.

Electuarium triasantalū quadruplicato rhabarbaro optime vsurpatur, quando eadem opera hepatis obstructions tollere, humorē vitiosū sēsim purgare volumus, vt in cachexia, hoc modo:

℥ Ta-

℞. Tabularum triasantali quadruplicato
rhabarbaro ℥ ii.

summat tabellam vnam duabus ante cibum ho-
ris, superbibendo vini albi cochleare j. Vel hoc
modo:

℞. Specier. electuarii triasantali ℥ ij.
rhabarb. electi pulueriz. ℥ iiij.
sacchari in aqua agrimon. dissoluti. q. s. fiant
tabellæ pondere ℥. ss.

quarum tabellam j. quotidie mane, duabus aut
tribus ante iusculum horis sumat.

Ad purgandum humorem melancholicum:

℞. Folior. senna ℥. ss.
sem. fœnicul. anisi an. ℥. ss.
rhabarb. electi ℥ ij.
specier. triasantal. ℥ i.
puluerisatis omnibus, cum sacchari in aq.
fumariæ dissoluti quadrupla quantita-
te excipiantur: Fiant tabellæ ℥ iii. vel
iiij. pondere pro dosi.

Alterum genus electuarii tabulati ad alteran-
dum, roborandum, obstructions tollendas con-
fectum, multas differentias à partibus corporis,
& humoribus, quibus singulæ sunt accommoda-
tæ, desumptas habet, quarum plures in officinis
habentur: Vt ad caput intemperie frigida affe-
ctum, dianthos, diambra, diamoschi, dia-
margar. calidum, plerumque sarcoticum. Hæc enim
caput calefaciunt.

Quod si cephalalgia adfuerit, à moscho & am-
bra, cū vaporosa sint, & caput facile repleât, absti-
nendū erit. Quare horum loco tales fieri poterūt:

℞. Nu-

℞. Nucis mosch. assate nr. iij.
 flor. roris ml. auend. an. ℥. ℞.
 cinnamom. ℥ i.
 sacchar. ℥ vii.
 f. tabellæ ℥ ii. pondere

Vel

℞. Sacchar. in aq. ros. dissol. ℞. i.
 olei nucis mosch. ℥ i. ℞. vel ℥ ii. formentur
 tabellæ.

Vel:

℞. Specier. diarhod. Abbatis ℥ ii.
 rad. & sem. pæonia an. ℥ i.
 sacchari ℥ i. ℞.
 cum aq. betonica vel salvia. fiant tabellæ
 ℥ ii. pondere.

Vel:

℞. Sp. arom. rosat. garyoph. ℥ i.
 coriandri prepar. specier. dianthos an. ℥ iij.
 cubeb. nucis mosch. an. ℥ ii.
 cinnam. electi ℥. ℞.
 garyophyl. ℥. ℞.
 sacchari in aqua maiorana dissoluti ℥ iij.
 f. tabulæ ℥ ii. pondere.

In compositione eiusmodi tabellarum com-
 muniter pro ℥ i. specierum sacchari ℥ i. vel ℥ i. ℞.
 prout pulvis suauior vel ingrator, misceatur.

Ad expectorationem promouendam, arteri-
 am, faucesque leniendas, & renum intemperient
 calidam corrigendam, habentur tabellæ diatra-
 gacanthi frigidi, becchicæ, diaireos simp. vel com-
 positæ: quarum vna ore detineatur, vt sensim li-
 quescat; & deglutiatur, vel contrita in aqua hor-
 dei

lei, vel decocto pectorali leniente & refrigerante, vt sebesten, seminib. frigid. & papau. albi, violar. nymph. exhibeatur: Vel hoc modo parantur.

℞. Rad. ireos florent. ℥ j.
rad. enula, cinnamom. an. ℥ ss.
sem. melonum, liquir. rase pulu. an.
℥ j.
cum saccharo in aqua scabiosæ vel marrubii
dissoluto, fiant tabellæ ℥ ii. pondere.

Ad sputum sanguinis ex incrassantibus & adstringentibus parantur:

℞. Boli armeni in aqua rosar. vel plantag. tota
℥ ss.
terre sigillatæ tota, coralli vtriusque, lapid.
hamatidis an. ℥ j.
succ. glycyrrhizæ ℥ ss.
cum saccharo in aqua rosar. dissoluto fiant
tabellæ:

quarum vna frequenter in ore detineatur.

Cordi calido conueniunt diamargarit. frigidum; diatriasantalum, manus Christi perlarum. Frigido vero diamargar. calidum de gemmis, diambra, lætificans Galeni.

Ad sincopen:

℞. Puluer. diamargar. frigidi. ℥ ss.
rasura eboris, ossis de corde cerui an. ℥ i.
margaritar. elect. corall. prapar. an. gr.
xv.
cum saccharo in aqua rosar. dissoluto fiant
tabellæ.

Vētriculo calidiori conueniūt diathodon abb.
dia-

diatragacanthum frigidum, diatriasantalon, vel
ex puluere aliquo refrigerante admixto, vt:

℞. Specier. diarhodi Abbatis ʒ j.

sem. quatuor frigidior. maior. an. ʒ. ss.

cum saccharo in aqua endiu. dissol. f. tabella.

Ventriculo frigidiori profunt tabell. aromat.
ros. garyophylati, diazingiber. diatriapipeleon,
diagalanga, diacymin. dianisum, electuarium
ducis, pulueris post pastum tabulati. His si alui
profluuium adsit, non vtendum: aperiendo enim
& attenuando obessent. Tunc ergo præstabit vti
cortice citri condito, in senibus zingibere condi-
to, vel syrupo de mentha.

Hepati calidiori & obstructione laboranti dia-
triasantalon duplicato vel triplicato rhabarb. dia-
rhodon abbatis; eodem refrigerato, ea, quæ ven-
triculo præscripta sunt, maxime diacurcuma, dia-
lacca.

Lieni vero eadem, quæ & epati, vsui erunt: vel
si cum media parte specierum dictarum tabula-
rum, alteram partem trochiscorum de capparibus
misceas, cum saccharo in aq. fumarix vel scolopendrix dissoluto.

Renibus arenosis post sufficientem purgatio-
nem, electuar. ducis, iustini & lithontribi. Nunc
& ex terebinthina cocta pul. tabellæ fiunt.

Vtero denique refrigerato diacalamentum,
de gemmis, diambra.

Flatibus vero intestina molestantibus diacy-
minum, dianisum, diagalanga, tabulæ ex oleo a-
nisi, vel ex oleo fœniculi. Seruantur tabulata in
arculis ex tilia confectis, aut simili materia in odo-
ra. Re-

ra. Reponuntur loco sicco & calido, & ad menses
sex referuantur. Exhibentur purgantes tribus vel
4. horis ante cibum: aliæ vero 2. vel tribus. Dosis
purgantium vt plurimum est ʒ. β. interdum plus
minusve pro sumentis viribus, per se vel trita in
iufculo aut aqua conuenienti. ceterarum vero ex-
hibentur duæ vel tres pro morbi conditione: vt si
ʒ ij. vel ʒ j. β. ponderet tabella vna, sufficiet, cui
aliquando cochlear vnum aut duo aquæ contue-
nientis superbibitur.

De pulueribus.

C A P. XXVIII.

CVm in officinis non semper tabellæ præpara-
tæ habeantur, eæque ex pulueribus, quos spe-
cies vocant, conficiantur, idcirco species præpara-
tas habeant, oportet. Quare de pulueribus nunc
dicendum erit. Pulueres in officinis vsitati dupli-
ces sunt: Vel enim assumuntur, vel extrinsecus ad-
mouentur. Illorum multæ sunt differentiæ vel à
partibus, quibus conueniunt, vel ab eorundem ef-
fectu, desunt. Ab effectu alii intemperiem e-
mendant calidam, frigidam & humidam: non au-
tem siccam: Nam cum pulueres consistentia sicci
sint, siccam intemperiem potius augent, quamvis
nonnulli puluere resumptiuo & pul. diatraga,
frig. ad extenuatos & marcescentes vtantur. Alii
humores euacuant, alii concoctionem adiuuant;
quidam flatus discutiunt, nonnulli obstructions
liberant, calculum comminuere creduntur, &
L pro-

propellunt, quidam menses mouent: alii fluxiones omnes sistunt: alii vires recreant.

A Partibus, quidam sunt capitales, alii cordiales, alii stomachici, alii hepatici, alii aliis partibus conueniunt.

Pulueres seu species corroborantes vel alterantes cōficiuntur ex omnib. plantarum partibus, succis arefactis, lapidibus pretiosis, corallis, margaritis, quibusdam metallis, pro cuiuslibet partis vsu. Omnia autem in tenuissimum puluerem rediguntur, per setaceum seu cribrum aliquoties traiciuntur, & ne vis eorum euanescat, in pyxidibus diligenter occlusis reſeruantur.

Vsus tempore, qui suauiores sunt, exhibentur vel per se. Sic pulueri, qui concoctionem adiuuare debet, nihil superbibendum. Vel cum vino, vel alio liquore aliquo. Qui vero insuaues sunt, cum saccharo sumuntur: eiusmodi species plures in officinis habentur, eiusdem cū tabellis nominis, vt sunt species tab. nuc. mosc. diambrae, diamargariti, diamoschi, diarhodi, triasantali, aromatici rosati, diagalangæ, diacymini, dianisi & similes, ex quibus secundum Medici præscriptum cum saccharo, vel ex vno genere specierum, vel plurium tabellæ conficiuntur.

Exempli gratia, capite per consensum ventriculi laborante;

℞. Specier. dianthos, aromatici ros. garyoph.

an. ℥ i.

cinamom. electi ℥. ss.

coriandri prepar. ℥ iiii.

cubebar. nucis mosch. an. ℥ ii.

gary-

garryophyll. \mathfrak{z} i.

sacchari Maderensis \mathfrak{z} vj.

f. tabella \mathfrak{z} ii. pondere;

quarum vius est mane horis aliquot ante cibum.

Sic etiam species hæ misceri possunt syrupis, pilulis, conseruis, conditis, opiatis & similibus medicamentis, quibus etiam apozemata aromatizantur. Sic ad hepatis & renum intemperiem calidam corrigendam

\mathfrak{z} . Specier. diatrag. frig. \mathfrak{z} i.

Specier. triasant. \mathfrak{z} ii.

semin. papau. albi, endiuie, flor. nymphae. viol.
an. \mathfrak{z} i.

cum saccharo in aqua endiuie dissoluto f. tabella.

Ad horum puluerum imitationem pro re nata Medici alios præscribunt, vt ad Epilepsiam:

\mathfrak{z} . Cranii human. pulueriz. \mathfrak{z} ii.

radic. & sem. pæoniae an. \mathfrak{z} ss.

visi quercini \mathfrak{z} ii.

rad. angelicae \mathfrak{z} i.

sacchari triplum, fiat puluis, cuius dosis \mathfrak{z} i.

cum aq. pæoniae vel betonicae exhibeatur horis
tribus ante cibum.

Ad visum acuendum:

\mathfrak{z} . Folior. euphrasiae \mathfrak{z} i.

maceris \mathfrak{z} ij.

flor. rosmar. sem. fœniculi, verbenae siccae, an.
 \mathfrak{z} i. ss.

piperis \mathfrak{z} ii.

f. puluis, qui cum aqua fœniculi vel euphrasiae
mane ante cibum sumitur,

L 2

vel

Vel huius pulueris addito saccharo ; loco salis cum cibis vltus esse potest.

Ad cordis affectus paratur ex rasura cornu cerui, osse de corde cerui, ebore, vniconu. Sic etiam ex fragmentis pteciosorum lapidum, margaritis; item ex floribus nymphaeae, violarum, semine citri & saccharo rosato excipiuntur. Sic etiam aduersus aeris contagia ex radicibus zedoariae, pimpinellae, angelicae, valerianae, foliis scordii, dictamni cretici, florib. borragin. buglossi calendulae, cum tantillo boli armeni, quibus caelo frigidiore vtimur : calidiore vero ex refrigerantibus, vt floribus rosar. violar. nymph. buglossi. borraginis, osse de corde cerui, corallio, margaritis, & cum aq. rosar. vel violarum exhibentur.

Ad vlcus pulmonum detergendum, siccandum & adstringendum, ex cinere cancrorum, bolo armeno, terra sigillata, gummi tragacanthi. Sic etiam ad intemperiem calidam corrigendam, additur semen papau. albi, melonum, cucumeris. Ad detergendum pulu. liquiritiae, sacchar. rosat. & mane cum lacte caprino vel asinino exhibentur. In pleuritide puluis ex dente apri & priapo cerui vel tauri, cum aq. cardui mariae incipiente fluxione exhiberi potest.

Ad ventriculum imbecilliores & laxiores:

℥. Sem. coriand. prepar. ℥. ss.

sem. anisi, foeniculi an. ℥. ij.

coralli vtriusque, corticis citri sicci, carnis cydonior. siccor. ℥. i.

sacchari duplum. f. puluis crassiusculus,

cui in ventriculo frigidiore cinnamomi electi

℥. i.

¶ i. addi potest. Huius cochleare vnum ante cibum sumatur.

Ad iuuandam concoctionem ventriculi talis parabitur:

℞. Coriandi prepar. ʒj. ℞.

fœniculi. ʒj.

anisi, cinamomi, an. ʒ. ℞.

sacchari rosati quadrup. f. puluis,

quo statim à cibo vtatur, nihil superbibendo. Sunt tamen, qui medicamenta coctionem iuuantia malint ante cibum sumere, eo quod vi sua attenuante & calida chylum crudum celerius distribuunt, & pro cruditate ventriculi aliis partibus communicent crudum alimentum. Verum frequentissimus puluis, qui à cibo sumitur, is est, quem communiter puluerem post pastum vocant, cuius variæ descriptiones. Alii ex seminibus fœniculi, anisi, coriandri æquis partibus addito micæ panis albiss. in furno siccata & pulu. quadruplo cum saccharo, nonnihil quoq; carnis cydoniorum ad vapores deprimendos.

Ad colicam flatulentam profunt species diacalamenthi, diacymini, aromatici rosati: Vel

℞. Rad. enula, galange an. ʒ. ℞.

specier. aromatici rosati ʒi.

cum vino Hippocratico exhibe.

Ad dolorem nephriticum, arenulas & calculos minores promouendos parantur ex diuersis supra propositis, exempli gratia:

℞. Nucleor. mespilor. combustor. & in vino albo macerat. rad. eryngii, gummi tragacanthi an. ʒ. ℞.

L 3

qua-

quatuor sem. frigidor. maior. pulu. liquiritiæ,
sem. saxifragiæ, milii solis, geniste an. ʒ i.
sem. altheæ ʒ ii.
sacchari ʒ. ʒ. f. puluis.

Exhibeatur ʒ i. cum aqua potentillæ siue argenti-
næ, vel parietariæ vel corticis fabarū, vel onony-
dis; Vel exhiberi potest puluis maxillæ lucii: Vel:

℥. Specier. lithontribi ʒ i. ʒ.
pulueris baccar. iuniperi, oculor. cancri, an. ʒ. j.
lapidis iudaici ʒ i.
f. puluis;

quibus præcautionis ergo vtendum, si prius die-
bus aliquot ante syrup. de althæa fuerit exhibitus.
At doloribus præsentibus, nisi vrina sit suppressa,
abstinendum: Vel

℥ Sem. coriand. prepar. ʒ j.
sem. fœnicul. anisi, an. ʒ. ʒ.
urtica ʒ ii.
oculor. cancr. ʒ i.
nuc. persic. nr. ij.
sacchari Maderensis ʒ i.
f. puluis tenuissimus,
qui cum aqua ononydis assumatur.

Sic ad menstrua mouenda:

℥. Limatura chalybis bene prepar. ʒ ii.
specier. aromatici ros. ʒ ii.
vel tantundem diamoschi, rad. & sem. pæoniæ,
rubie tinctorum, an. ʒ. ʒ.
sacchari quadruplum.

Dosis erit ʒ i. cum aqua pulegii vel hyssopi vel ar-
themisiæ vel vino albo. Quod si vero chalybem
metuas, limaturam eius per noctem in liquore
mace-

macerabis, dein percolabis, & cum hoc liquore puluerem conuenientem exhibebis. Notandum tamen, eiusmodi pulueribus tam in nephritide, quam mensibus mouendis non, nisi vniuersalibus præmissis, vtendum esse.

Quidam vero expurgantes humores in officinis habentur, quales sunt puluis folior. sennæ, hieræ picræ, hieræ cū agarico, diacolo quinthid. puluis sennæ, qui ex foliis sennæ in puluerem contritis ℥i. ℞. zingiberis, maceris an. ℥iij. tartari vini albi ℥i. ℞. componitur, humores crassos & adustos euacuat. Dosis est à ℥i. ad ij. cum iusculo carniū, vel decocto conuenienti. Quod si generosius velis & pituitam bilemque; flauam euacuare:

℞. Pulueris sennæ ℥j. sem. cartham. excortic. ℥. ℞.
diagrydii ℥j.
salis Indi ℥i.
maceris ℥ii.
cinnamom. ℥i. f. puluis.

Sic & puluis hermodactylorum in affectibus articulorum in robustis præcautionis loco exhibetur, cuius hæc forma est:

℞. Hermodactyl. ℥i.
cinnamom. zingiberis. anisi, an. ℥i. ℞.
salis Indi ℥i.
diagrydii ℥. ℞.
fiat puluis.

Dosis à ℥i. ad ℥ii.

Sic etiam pulueris hieræ picræ à ℥i. ad ii. in humidiorē ventriculo vsus. Parari etiam possunt pulueres ad eorum similitudinem. Vt ad purgandam bilem & pituitam:

L 4

℞. Rha-

℞. Rhabarb. electi ℥ iij.
 mastice, spica an. gr. iiij.
 turpethi electi ℥. ℞.
 sacchari ad pondus omnium. fiat pulvis.

Dosis est ℥ j. ℞.

*De antidotis mollibus & electuariis siue
 opiatis vulgo dictis.*

C A P. XXIX.

Antidotis siccis & solidiore forma confectis
 succedunt liquida, quæ vulgo Electuaria di-
 cuntur, & à multis opiata molles nominantur. Ve-
 teribus tamen opiata medicamenta dicebantur,
 quod opium recipiebant; cuiusmodi est theriaca,
 mithridatium, philonium Romanum & alia id
 genus medicamenta, quæ propter fluxionis vehe-
 mentiam & acrimoniam, doloris quinetiam ma-
 gnitudinem, opium recipiunt. Recentiores opi-
 ata nomē usurpant pro quavis confectioe molli,
 mellis consistentiam habente. Verum rectius, si
 electuarium molle dixeris, vel iubeas fieri mixtu-
 ram ad opiata consistentiam. Proinde plures dif-
 ferentiæ existunt: Aliæ enim sunt purgantes, aliæ
 alterantes, aliæ roborantes, aliæ deniq; anodynæ &
 narcoticæ, quib. propriè nomē opiata competit.
 Antidota purgantia parantur ex pulueribus sim-
 pliciū purgantium, vel ex vsitatis electuariis siccis
 purgantibus, vel omnibus simul saccharo dissolu-
 to, melle vel syrupo aliquo conditis, ea propor-
 tione, ut ad ℥ j. puluerum ℥ j. aut ℥ j. ℞. liquorum
 affundatur.

Notan-

Notandum tamen, vt semper aliquid, quod stomachum roboret, cum pleraque purgantia stomacho aduersentur, admisceatur. Habentur autem in officinis aluum emollientia, diaprunum simplex & composit. quæ ad aluum leniendam & in acutis febribus à ℥ iij ad vj exhibentur. Electuarium solutiuum seu diasenna, diamanna. Sic parari potest leniens ex cassia recenter extracta & saccharo partibus æqualibus. Phlegmagoga sunt diaphenicum, hiera picra Galeni, vel cum agerico, benedicta laxatiu. electuarium Indum minus. Cholagoga, electuar. de succo rosarum, de psyllio, de sebesten. Melanagoga, diasenna, confectio hammech, hiera logadi. Ad horum imitationem parari possunt ex conseruis aluum lenientibus, ex pulpa cassiæ hoc pacto:

℥. Cassiæ recent. extract. ℥ ij.
conseru. violar. & buglossæ an. ℥. ss. misce,
Dosis est ℥ i. ante cibum.

Et si ventriculus flatulentus sit, cinamomi ℥ j. vel specier. diarhodi abbatis ℥ ij. addantur.

Conficiuntur etiam maiori artificio, vt:

℥. Rad. quinque aperitiu. an. ℥. ss.
cichorii totius, scariola, malua, bugloss. bor-
rag an. m. i.
prunor. damascen. sebesten. an. num. xii.
quatuor semin. frigidior. maior. vt foenicul.
an. ℥ ii.
flor. violar. rosar. pallid. an. m. i.
coquantur in sufficiente quantitate aquæ ad
quartaria iii.
in colatura infunde folior. sen. mundat. ℥ iii.
L 5 f. ebul-

febullitio & expressio, in qua dissolue
chari quartaria iij.

f. syrupus perfecte coctus. Dein adde cassia
center extract. ℥ iij.

pulv. diarhodi abb. ℥ i. ℞.

f. electuarium ad consistentiam opiata.

Dosis ℥ vi vel ℥ ℞. Efficacior erit, si folior. senn
pulveris. ℥ ℞. addas.

Vsus horum electuariorum in iis, in quibus alui
natura adstrictior & clysterum vsus molestus est
& qui morbis periodicis obnoxii sunt.

Alterum genus ad alterandum & confortan
dum fit ex aromatibus & simplicibus convenien
tibus tritis, vel pulveribus, quos species in officio
nis vocant, mixtis cum saccharo dissoluto aut
melle, vel ex conferuis appropriatis. Mixtura talis
ratio est, ut ad ℥ i. pulverum, liquoris ℥ i. vel ℥ i. ℞.
miscantur.

Ad ventriculū refrigerandū parabitur hoc pacto:

℥. Conferu. flor. betonic. rosmarin. an. ℥ ii.

acori conditi ℥ i. ℞.

spec. arom. rosati & diarhodi abbat. an. ℥ ℞.

cum syrupo de conferua citri f. electuarium

ad consistentiam opiata, cuius vsus sit

hora vna antecibum. Quod si intemperies maior
sit, tum zingiberis conditi ℥ i. ℞. pulveris aromatici ro-
satigaryophyllati ℥ i. addi potest.

Sic ad ventriculum frigidum & humidum:

℥. Conferua rosar. ℥ ℞.

mirobalan. chebulor. conditarum cortic. ci-

tri conditor. an. ℥ i. ℞.

specier. diamoschi, cornu cervini vsti an. Di.

cum

cum syrupo myrtillorum f. opiata.

Sic in lenteria, diarrhoea, dysenteria, præmissa purgatione talis electuarii usus esto:

℞. Conseru. rosar. antiquissima, myrobalan. conditor. an. ℥ ii.

coralli vtriusque, cornu ceruini vsti, terra sigillata, boli arm. lota in aq. rosar. aut plantagin. an. ℥ i.

cum syrupo cydoniorum fiat electuarium.

Verum confortantia electuaria duum sunt generum, aut Vsualia, quæ iam parata habentur; aut Magistralia, quæ ex mixtione diuersorum pro iudicio Medici conficiuntur.

Vsualia sunt, quæ ex pulueribus præcedenti capite explicatis cum syrupo conueniente vel melle miscentur.

Magistrale confortans caput:

℞. Conseru. maioran. flor. betonic. rorismar. an. ℥ ss.

cum syrup. de stoechade f. electuar. molle vel mixtura ad formam opiata.

Ad corroborationem cordis:

℞. Conseru. flor. borrag. & bugloss. an. ℥ vi.

spec. diamarg. calidi ℥ i.

cortic. citri conditor. ℥ ss.

cum syrupo de acetositate citri f. electuarium.

Pro melancholicis ad hilaritatem excitandam & lienem corroborandum:

℞. Conseru. melisse, ceterach. flor. borrag. & bugloss. an. ℥ i.

conseru. maioran. flor. betonic. an. ℥ ss.

cortic. citri condit. ℥ i. ss.

Speci-

Specier. aromatic. rosati garyophyllati, dia-
rhod. Abbatis an. ℥ ij.
cum syrupo de acetos. citri q. s. fiat mi-
xtura.

Paratur etiam ad melancholicum affectum,
 suffocationem hystericam, palpitationem cordis,
 aut omnibus his affectibus complicatis, tale:

℥. *Confer. flor. violar. bugloss. borrag. melissæ*
an. ℥ iij.
mithridatii ℥ ii.
cum syrupo de pomis. f. electuarium molle.

Commendatur etiam confectio Alkermes, ut
 & ad animi deliquium. Cauendum tamen, ne fe-
 bre aut capitis dolore præsentē utamur, idque
 propter ambram & moschum, quæ recipit.

Anodyna denique electuaria duplicia sunt,
 Quædam Anodyna & *παρανοία* veteribus dicta,
 quæ dolores mitigant: Quædam vero fortiora,
 quæ narcotica, id est, stupefacientia dicuntur, qui-
 bus opiatæ nomen, cum opium recipiant, recte
 conuenit. Eiusmodi opiatæ in officinis paratæ
 habentur, athanasia, aurea Alexandrina, theria-
 ca recens, mithridatium, philonium Romanum,
 requies Nicolai, tryphera magna.

Possumus etiam ad dolorē sedandum & som-
 num conciliandum cum conferuis, scopo accom-
 modatis, ut vel maioranæ vel betonicæ, aliquid re-
 quiei Nicolai vel philonii aut opii gr. i. vel ii. pro
 dosi vna addere: Vel:

℥. *Theriaca optim. & mithridatii, an.*
℥. ss.
opii gr. ii.

con-

conseru. anthos 3 i. *misce.*

Hæc est nostra theriaca diatessaron noua.

Vsus autem narcoticorum est in magnis doloribus, præsertim colicis. Verum hæc etiam non dolorem solum sedant & somnum conciliant, sed etiam destillationes & fluxiones diuersarum partium, vt alui, vteri &c. Veteres ad nucis auellanae magnitudinem exhibebant. Vera tamen dosis est a 3 i. ad 3 i. exhibendo hora somni & aliquid vini superbibendo, vel cum vino miscendo: Quemadmodum extracti philonii dosis est 3 ss.

Aduertendum tandem in opiatis narcoticis conficiendis non minorem quam in purgantibus diligentiam adhibendam esse, ne opium vna in parte subsistat, sed diligenter commisceatur. Hæc in vase stanneo, & quidem loco temperato ad siccitatem declinante, reponi debet: & quemadmodum cõmuniter in decennium viribus cõstat; sic etiam non facile antè semestre exhiberi debent. Quare operculi cauo mixtionis tempus inscribi debet. Sed hæc de re plenius in tractatu nostro de theriaca.

De conseruis.

C A P. XXX.

Conseruæ sunt flores vel herbae exactissime concisæ vel contusæ, & saccharo mixtæ, quæ vel calefaciunt, vel refrigerant. Eiusmodi habentur in officinis. Calefacientes quidem caput, conserua flor. rorismar. quæ anthos dicitur, betonica, stoechad. saluia, pœonia, primula veris, herbarum, majorana, radic. acori, Pectus, hyssopi, meliss.

meliss. capilli Veneris. Cor, flor. borrag. bugloss.
anthos: herbar. meliss. scabios. Ventriculum, her-
bar. absynth. menth. rad. enulæ. Hepar, conseru.
absynth. fumariæ. Splenem, conseru. ceterach, fu-
mariæ. Vterum, conseru. maioran. meliss. anthos.
Articulos, flor. stoechad. rorismarini. Ad lumbric-
cos pellend. conseru. flor. persicorum.

Refrigerantes caput conseru. flor. nymphaeæ:
Corroborantes, rosar. violar. Pectus, flor. violar.
Cor, violar. rosar. herbæ acetos. Ventriculum,
splenem, renes, vterum, iuncturas, conseru. flor.
rosar. vel violar. Hepar conseru. flor. cichorii. rosar.
violarum.

Conficiuntur autem hoc pacto. Floribus vel
radicibus vel herbis concisis additur saccharum,
quæ mortario bene mundato simul iniiciuntur,
miscentur, conduntur, dein soli ad aliquot dies
exponuntur. Cauendum tamen, ne vas ad sum-
mum repleatur, ne fermentando diffuat, quod
in conserua florum borrag. vel buglossi potissi-
mum vsuuenit. Singulis vnciis materierum sac-
chari libræ duæ addantur. Si vero herbæ vel na-
tura vel ratione cœli aridiores sint, cum non fa-
cile cum saccharo commisceantur, saccharum
vltra syrupi consistentiam coquendum, dein su-
per prunas aliquandiu simul miscenda. Vasis vi-
treis vel fictilibus densis, bene obturatis inden-
da, & sic ad annum vel biennium asseruari pos-
sunt. Aliæ namque conseruæ, vt rosarum, diutius
conseruari possunt. Aliæ cito corrumpuntur, vel
acescendo, vel arecendo, ita vt in superficie tan-
quam à vermiculis corrosæ videantur, quod

in

in conseruis violarum, buglossi, borrag. frequenter conspicitur. Odor tamen & sapor de bonitate rectius iudicabunt.

Vlus earum præcipue diluculo & in introitu lecti, quantitate nucis iuglandis, vel per se vel admixtis speciebus aromaticis parti affectæ appropriatis & robur addentibus, quæ simul syrupo excipiuntur.

Exemplum ad capitis frigidioris & humidioris corroboracionem:

℞. Conseru. flor. beton. ℥ i.
cons. flor. salu. rorism. an. ℥ ss.
spec. ier. tabul. nucis mosch ℥ ij.
cum syrupo de stoechad. fiat mixtura.

In Hepate calidiore:

℞. Conseru. flor. ci horii. ℥ ii.
specier. tria santali ℥ ij.
cum syrupo de acetosa, misceantur.

De conditis.

C A P. XXXI.

Condita appellant eas confectiones, quæ ex simplicibus saccharo conditis fiunt, quæ ab opiatis differunt in eo, quod hæ syrupum recipiāt: Illæ vero loco syrupi saccharum. Dein conditi consistentia minus mollis, quam opiata. Minus etiam sicca, quam puluis.

Fiunt vero ex floribus, fructibus, radicibus, cordicib. Ex floribus minutiss. incisis vel tuis & saccharo conditis. Pauci enim flores integri seruantur, vt Arantiorum. Quidam & rolarum
folia

folia integra condiunt: capparorum flores & genistæ sale & aceto condiuntur.

Fructus condiuntur dupliciter, vel à cordice & ossibus repurgati, æquis partibus cum saccharo & aqua lento igne coquantur, donec saccharum totam fructuum substantiam penetrarit, & ad iustam coctionem perducti sint: quod deprehenditur, si iulepus digitis ductus fila tenuia mittat.

Peregrini vero macerati primum, dein cocti cum iulepo dilutiore, quem longum vocant, condiuntur: & ad singulas iulepi libras, pulpæ ℥ iiij. adiciuntur, lento igne coquantur, donec ad rectam consistentiā sint perducti, vt nec nimium liquidi, nec nimia coctione aridi sint redditi. Quod cognoscitur, si guttula in marmore effusa & refrigerata, manus non inquinet.

Radices condiuntur expurgatæ cortice exteriori & in partes sectæ, dein in iulepo dilutiore coquantur, eo modo, vt fructus: Peregrinæ vero humectantur prius, dein condiuntur.

Cortices etiam condiuntur, amarorum quidem, vt citriorum, limonum. Primum diebus aliquot aqua macerantur, sæpius aqua mutata: dein aq. incoquantur, donec mollescant, mox in aquam recentem semel atque iterum iniiciuntur; postremo in iulepum aut mel, cui multa aqua sit admixta iniecti ad iustam crassitiem coquantur, pyxidibus aut vasis bene obturatis reponuntur. In annum aut biennium conseruari possunt: cortices vero diutius. Quare alia simplicia, alia composita in officinis habentur.

Simplicia condita vel calefaciunt, vel refrigerant.

rant, vt calefacientia & corroborantia cor, nux
moschata condita; citria condita, myrobalani
chebuli conditi. Ventericulum, zingiber condit.
nux moschata, rad. calami, rad. acori, iuglandes.
Renes vero radix eryngii condita. Refrigerantia
& corroborantia ventericulum myrobalani embli-
ci, mespila, cerasa, sorba, pyra, pruna. Iecur vero
radices cichor. condit.

Composita vero pauca habentur in officinis;
vt corpus calefaciens diacitonites compos. Pur-
gantia, diacitonites purgans. Ad similitudinem
horum fiat conditum compositum ad cordis af-
fectus.

℞. Conseru. meliss. bugloss. borrag. an. ℥ iii.
rasura eboris, cornu cerui, margarit. elect. ossis
de corde cerui an. ℥ i.

specier. diamargarit. calid. ℥ ss.
cum saccharo rosato fiat conditum.

Sumatur cochlear hora j. ante cibum.

Ad corroborandum ventericulum:

℞. Corticum citri conditor. siccor. ℥ ss.
carnis nucis mosch. condit. ℥ i.
nucis condit. numero j.
conseru. rosar. ℥ ii.
sacchari rosati ad quantitatem omnium,
f. conditum.

Huius vsus hora j. mane, & vesperi ante cibum
ad cochlear vntum.

Ad aluum constringendam:

℞. Carnis cydonior sicca ℥ ii.
coralli vtriusque, semin plantag. an. ℥ i.
conseru. rosar. cornorum an. ℥ ss.

M

specier.

spec'ier. diarhodi abbatu ʒ. ʒ.

*cum syrupo cydonior. vel myrtillorum, vel de
rosis ficcis. f. conditum.*

Addi possunt huic condito terra figillata, polus
armena, sed tum quantitas conseruarum augen-
da, ita vt puluerum ʒ i. ʒ. ad conseru. ʒ i. sit quan-
titas. Quod si ventriculus plus æquo calidior sit:

ʒ. Conseru ros. ʒ j.

conseru. violar. ʒ. ʒ.

pulu. diamargariti frigid. & diatragacanthi
frigidi an. ʒ ii.

cum saccharo rosato, fiat conditum.

Sic etiam interdum præscribuntur composita
ex conseruis, conditis fructuum, corticum, radi-
cum, speciebus & saccharo. Sic tamen vt conser-
uæ ʒ ij. aut iij. specierum, si acres sint, ʒ j. si lenes ʒ
j. ʒ. sacchari q. l. Auri folia 3. aut 4. pro diuitibus ad-
duntur: cauendum etiam, ne quid palato nimis
ingratum admisceatur.

De Trochiscis siue Pastillis.

C A P. XXXII.

<sup>a Auctar. 5.
method. 1.</sup> **T**^{Ποχίσκος} Græci vocant à figura circulari ^a, quã
obtinent. Hinc à quibusdam ^{κυκλίσκοι} dicun-
tur. Latini à figura orbiculari orbiculos seu pastil-
<sup>b Cels. lib. 5.
cap. 17.</sup> los ^b, licet communiter ad lupinorum formam ef-
fingantur, circumferentia nonnunquam rotunda;
nonnunquam angulari, vtraque tamen superficie
plana, qui præcipue ad simplicium conseruationem
inuenti sunt.

Materia trochiscorum sunt succi, sunt etiam
omnis

Omnis generis medicamenta, ut ex Galeno constat, quæ trita, vel liquore vel mucilagine aliqua excipi, & in umbra desiccari possunt, qui facile asseruantur, cumque iis utendum est, humore aliquo conuenienti diluuntur. Dantur tamen, qui non comminuta recipiunt, ut sunt trochisci de vipera, ex carne viperarum, trochisci de squilla, qui squillam recipiunt. Differunt tamen hi à prioribus, quod per se in usum non veniant, sed antidotis magnis miscentur.

c 5. de comp.
med. secun-
dum genera.

Genus eorum triplex est, sicut ex antyllo Orbasius d, Paulus e & Myrepsius f tradiderunt: Alii sunt potabiles, alii in aluum iniiciuntur, alii illi nuntur. Eorum, qui bibuntur, alii aluum comprimunt, aut sanguinem; aut aliam fluxionem refrigerando, adstringendo, opplendo, vel desiccando: alii dolores mitigant vel obtusefaciendo, vel humores diffundendo: alii renes, lienem aut iecur obstructione liberant. Eorum, qui in aluum iniiciuntur, alii acrimoniam obtundunt, alii adstringunt, alii sanguinis profluvium sistunt, alii adurunt. Similiter vero & qui oblinuntur, ad usum ex iis aliquem adhibentur.

d 10. collect.
24.
e lib. 7. c. 12.
f sect. 41. in
init.

Trochisci purgandi facultate præditi in officinis habentur, ut sunt trochisci de agarico, confecti ex agarico laryceo albissimo, in vino macerato, cum paucis zingibere. Trochisci alhandal, quibus potissimum in suppositoriis utimur. Alii obstructiones cum leui adstrictione aperiunt, ut trochisci de rhabar. trochis. ramich. Alii sine adstrictione idem præstant, ut hepatis, trochisci de eupatorio,

M 2 de ab-

de absynth. Lienis, trochisci de capparibus. Vt et
trochisci de myrrha, qui ad menses ciendos tam
per os exhibentur, quam ad suffitum vsurpantur.

Alii vero fluxiones, vt sanguinem vndiquaque pau-
promanantem, cohibent, vt trochisci de carabe,
de terra sigillata, de bolo armeno. Sic quidam im-
modicos sudores sistunt, vt trochisci de camphora.

Rursus quidam calefaciunt, vt trochisci de gal-
lia moschata, qui in morbis frigidis tam cerebri,
quam cordis vsurpantur. Quidam refrigerant &
partium intemperiem corrigunt.

Quidam renibus exulceratis & dolentibus
profunt. Eiusmodi sunt trochisci de alkekengi,
qui & sine & cum opio conficiuntur, quibus &
in ardore vrinae vtimur. Qui vel in conuenienti
liquore, vel in lacte caprino, vel syrupo accom-
modato à ʒ ij. ad ʒ i. exhibentur.

Exhibentur autem anodynii quidem in introi-
tu lecti. Deobstruentes vero horis matutinis, san-
guinem sistentes necessitate requirente. Ad ho-
rum imitationem trochiscis in conuenienti li-
quore dissolutis ad ciendos menses talis potiun-
cula parari potest:

℞. Trochiscor. de myrrha pulueri ʒ. ʒ i.
exhibe cum vino albo, vel in syrupo de hyssop-
po ʒ i.
vel cum aq. arthemis.

duabus aut tribus ante cibum horis, quemadmo-
dum & ceteri exhiberi solent.

Sic ad sanguinem sistendum:

℞. Trochiscor. de bolo armē. & de carab. pul. an. ʒ. ʒ. ʒ.
syrupi cydonior. ʒ j.

aq.

aq. plantag. ℥ ij.

misce, exhibeatur, præmissa tamen euacuatione.

Vel hoc pacto:

℥. Corallii vtriusq, lapid. hæmatitid. carab. an.
℥. ss.

trochisc. de terra sigillat. ℥ ii.

sacchari rosati ℥ ij.

aq. portulacæ & rosarum an. ℥ j. ss. f. haustus.

Quod si trochisci prædicti vel non habeantur,
vel vetustiores sint, recentes præscribere oportet,
vt, e g. Ad menses ciendos:

℥. Radic. dictamni, pæonia & sem. eius an. ℥. ss.
myrrhæ ℥ i.
cinnamomi ℥ i.

omnibus contusis cum syrupo de arthemisia fi-
ant trochisci.

Aliud genus est eorum, qui in affectibus fauci-
um, asperæ arteriæ & pulmonum, vsurpantur, qui
ore retinentur & deglutuntur, vt sunt trochisci
becchici albi & nigri. Quare & pilulæ hypogloti-
des & medicamenta arteriacea g dicuntur, quo
partes illæ suo lentore leniant.

g A. ginet. l.

3. c. 28. Aet.

Ex gummitragacantho, amylo, saccharo & aq. ros. fiunt. Ad faucium asperitatem à destillatione
calida caussatam: 4. c. 51.

℥. Semin. quatuor maior. frigid. excortic. sem.
papau. albi an. ℥ iii.
violar. puluer. ℥ i. ss.
cum mucilagine seminis psyllii in aq. violar.
extract.

vel cum syrupo violato, fiant trochisci, qui sub lin-
gua deinceantur.

M 3

Ad

Ad destillationem acrem sistendam:

- ℞. Boli armen. ℥ ii.
 gummi Arab. ℥ iij.
 cum mucilag. gummi tragacanth. q. s. f. tro-
 chisci.

Vel:

- ℞. Tab. diatragacanthi frigid. ℥ i. ℞.
 boli arm. loti in aqua rosar. ℥ i. ℞.
 terre sigillate lota ℥. ℞.
 cum syrup. myrtillor. fiant trochisci lupinis sē-
 miles, qui in umbra siccantur.

Quod si ob continuam tussim somnus impedia-
 tur, opii aliquid cum sapa aut vino generoso dis-
 soluto addi poterit.

Ad sputum sanguinis:

- ℞. Trochisc. de carab. ℥ i.
 de bolo armen. & terra sigillat. an. ℥ ii.
 lapid. hematitid. & coralli utriusque an. ℥ j.
 cum syrup. de rosis siccis vel mucilag. sem. cydo-
 nior. in aq. rosar. extract. f. trochisci.

Ad vlcus pulmonum abstegendum & agglu-
tinandum:

- ℞. Conseru. rad. symphyti, conseru. rosar. veteris
 an. ℥ ℞.
 gummi Arab. & tragacanthi in aqua tussilag.
 dissolutor an. ℥ i.
 pulmonis vulpis bene preparati, cineris can-
 cror. fluuiatil. lotor. ut decet, in aq. rosar.
 an. ℥ i. ℞.
 succi liquiritie, terre sigill. boli arm. an.
 ℥ ij.
 semin. pimpinell. ℥. ℞.

pulu.

putu. rad. ireos florentina \mathfrak{D} j.

sacchar. rosat. \mathfrak{Z} v.

f. trochisci, qui in umbra siccentur,
in aq. rosar. dissoluti.

Denique ad fœtorem oris:

\mathfrak{Z} . Pulu. galliæ mosch. gr. v.

cum syrup. de conseru. citri, vel aqua naphæ, id
est, aqua ex florib. arantior. elicita, fiant orbi-
culi.

Vel pro magnatibus:

\mathfrak{Z} . Moschi \mathfrak{D} i.

Ambra \mathfrak{D} ij.

sacchari rosati in aq. rosar. dissoluti \mathfrak{Z} vi.
fiant trochisci.

D Ecclegmatis sine Lohoch.

C A P XXXIII.

Medicamentum, quod Latinis Linctus siue
Illinctus à lingēdo dicitur, id Græci ἐκλειγ-

μα α & ἐκλεικτὸν ἀπὸ τῆς λείγειν à lingendo. Nonnulli β α Aegin. lib.
ἀρτηριακόν, alii εἰγμα nominant. Arabes Lohoch. 7. cap. ii.

Medicamentum est, consistentiam mediam,
eamque viscidam habens, & humorem in thora-

cem delapsum expectorationi idoneum reddens.
Etenim glutinosa quædam recipit, ne præpropere
madicamentum in ventriculum deglutiat, sed
media quadam via subsistat, & sic pulmonibus &
thoraci aliquid communicetur. Quare lamben-
do colloque leniter obtorto, quo sensim se in fau-
ces iusinet, assumitur. Quare hoc remedium ad
faucium, asperæ arteriæ, præcipue vero thoracis
internos & pulmonum affectus inuentum.

M 4

Sunt

α Aegin. lib.
7. cap. ii.
β Gal. 7.
compos. se-
cū dūm loca.

Sunt autem alia simplicia, alia composita. Simplicia ex solius medicamenti simplicis decocto aut succo, & saccharo seu melle, aliove humore mixto parantur, vt exempli gratia. Lohoch de squilla, è succi squillæ & mellis despumati æquis partibus simul coctis conficitur. Sic Lohoch de caulibus è succo caulium, cum sapa vini & melle conficitur. Sic Lohoch de psyllio e mucilag. sem. ʒ ii. & sacchari clarificati lb. i. quod acres delabentes humores inspissat. Sic de tussilagine, ex radic. decoctæ contusæ lb. i. & mellis lb. ii. ecclagma abstergens conficitur: pari pacto Lohoch de althea.

Composita vero fructus, gummata & aromata recipiunt: Fructus sunt vuæ passæ, ficus, dactyli, iuiubæ, sebesten. Sic semina frigida maiora, maluæ, bombacis, papau. albi. Succo, vt succus de liquirit. de squilla, de brassio, de hyssopo. Gummata, gummitragacanth. Arabicum. Species, vt diatragacanth. frigid. de penidiis. Sic syrapi, violatus, de tussilagine, hyssopo, de iuiubis, de papau. diacodion. Conseru. violar. rosar. scabiosæ, tussilaginis, enulæ, nenupharis, saccharum item candum, rosaceum, penidium. Fiunt autem ex his contusis & melle aut saccharo coctis, aut syrupo aut mucilagine accommodata, excipiuntur ad mediam consistentiam mellis, aut pultis instar. Rursus alia sunt in officinis vsitata, alia vero magistralia. In officinis habentur eccligmata de nucleis pini, quo utimur in asthma ad crassos & lentos humores incidendos & detergendos, ad quod etiam valet Lohoch ad asthma dictum. Idem præstat, sed efficacius

ficacius Lohoch sanum & expertum. Hoc vero fortius, Lohoch de squilla. Sic ad suspiriosos & pulmones imbecilles, & vlceratos abstergendos & consolidandos, Lohoch de pulmone vulpis. Ad tussim & asperæ arteriæ asperitatem à catarrho calido, Lohoch de papauere.

Magistralia sunt, quæ à Medicis pro re nata præscribuntur, pro ratione loci affecti vel causæ, admiscentes syrupos, interdum conseruas & species, ea tamen proportionem, ut eccligmatum vſitatorum dosis sit ab ℥. ss. ad ℥ i. species. à ℥ iii. ad ℥ i. conseruarum ab ℥ ii. ad ℥ iii. syrupos. q. s. ad consistentiam ipsius Lohoch.

Sumuntur & differentia ab effectu: quædam enim ad leniendum simul & incrassandum, ut in principio destillationis tenuis & acris, præscribuntur hoc modo:

- ℥. Pulpæ iuiubar. ℥. ss.
amyli ℥ ii.
gummi Arab. & tragacanthi an. ℥ j.
cum syrup. de papau. f. Lohoch.
Vel:
- ℥. Spec. electuar. diatragacanth. frigid. ℥ j.
sacchari candi & penidii an. ℥ ii.
cum syrupo violaceo vel de papau. f. Lohoch.
Vel:
- ℥. Iuiubar. mixarum, prunor. damascen. an.
numero xii.
sem. melon. papau. albi, malua an. ℥ ii.
flor. violar. p. i.
coquantur ad ℥ iii.
omnia simul, per setaceum traiciantur,
M s conseru.

conseru. violar. & rosar. an. ℥. ℞.
addantur, & cum syrupo de iuiubis q. s. fiat
Lohoch.

Ad pituitam impactam & crassam inciden-
dam:

℥. Spec. diaireos simpl. & diaireos salom. an. ℥ ii.
lohoch de pino ℥ i.
conseru. enula ℥ ℞.
oxymel. squill. q. s. ad exceptionem.

Si vero maiore opus sit deterfione, quam inci-
sione, detergentium quantitas augenda, & pro
oxymelite squillitico syrup. de liquirit. vel de
prassio, vel de hyssopo sumendus.

Sic in principio pleuritidis, vbi materia fluit:

℥. Diatragacanth. frig. ℥ iii.
penidiar. rec. beccicarum albar. an. ℥ ii.
syrupi violati q. s.

Si vero materia partim fluxa est, partim fluens:

℥. Specier. diaireos simpl. ℥ ℞.
diatragacanth. frig. ℥ ii.
penidiar. recent. ℥ i. ℞.
syrup. de hyssopo q. s.

Detergentia & sputum mouentia conficiuntur
ex conserua capillor. Veneris, florib. tussilag. radi-
cibus enulae, passulis exacinatis, amygdalis dolci-
bus, pistaciis, nucleis pini, ficibus, daetylīs, specie-
bus, diaireos simpl. & diaireos salom. saccharo
candido, syrupo de tussilag. de prassio, de hyssopo,
de liquirit. de capill. Veneris, oxymelite, melle
&c. Exemplum si febris adsit:

℥. Spec. diaireos simp. ℥ j.
specier. diatragacanthi frigid. ℥ ℞.

passu-

passular. mundat. amygdalar. dulcium exco-
ricat. & simul contusar. an. ℥i.

sacchari candi & penidii an. ℥i.

cum syrup. de liquiritia. f. Lohoch.

Quod si vero febris absit, materię excipi poterunt
vino, vel ipsi fructus cum affusione vini contun-
di & addita sapa Lohoch fieri.

Ad sputum sanguinis parantur ex conferu. ro-
sar. antiquiss. consolid. maioris, miua cydonior.
mucilage, sem. psyllii, cydonior. in aqua sca-
biofæ extractæ, trochiscis de terra sigillata, de
carabe, de bolo, corallo rubro, lapid. hæmatiti-
de: Ita tamen, vt portio quædam detergentium
admisceatur, vt est conserua capillor. Veneris,
syrup. de liquirit. & de capillo Veneris.

Vltus ecclegmatum est & ante, & post cibum,
potiss. mane & vesperi fabæ quantitate, sumen-
do cum baculo liquiritiæ, ad alterum extremum
contuso, & quidem sensim lambendo. Commo-
dissime autem fiet, si æger supinus iaceat, vel re-
clinato capite collum tantillum obtorqueat. At
si hora somni catarrhum sistentibus & expecto-
rationem impredientibus vsi fuerimus, tum se-
quenti die mane expectorante & detergente vti-
mur, vt si forte quid somni tempore in pulmo-
nes defluxit, in iis retentum pulmones corrumpat.
Reseruari debent ecclegmata vasis figulinis
vitratæ, simplicia quidem in annum, compo-
sita vero ad biennium, modo amgydalas, pineas
& pistacia non recipiant, cum hæc breui tempore
rancorem acquirant, & nauseabundum medica-
mentum reddant.

De

PAndaleonis & nomen & forma ab Arabibus aut iunioribus inuenta, ad mutationem & formæ remedii, & ad gratificandum ægris, cum ecclegmate propter consistentiam solidiorem & duriores gratior sit. Materia eadem, quæ etiam tabellarum, à quibus forma duntaxat differt, & ecclegmatum. Componuntur autem hoc pacto:

Fructus, semina, contunduntur, cum pulueribus & conseruis miscentur in pyxide lignea, simul coquuntur, affusso saccharo in conueniente aqua soluto, & ad consistentiam syrupi cocto, quæ omnia in pyxide condensari permittuntur.

Notandum, vbi conseruas commiscere volumus, ne nimis durum reddatur pandaleon, aut conseruarum minuenda quantitas, aut plus saccharum coquendum. Sic & pro pauperibus loco sacchari mel usurpari potest, & parabuntur ex melle cocto, fortiter agitato, donec saccharo candidius reddatur.

Vsus pandaleonum ad eadem, ad quæ ecclegmatum est, nimirum ad pulmonum & thoracis affectus. Quando vero æger vti volet, cultelli cuspidem, aut cochleari frustum aliquod franger, & instar tabellæ ore, quoad liquecat, detinebit, postmodum ecclegmatis instar sensim deglutiat.

Exemplum in affectibus calidis, in quibus materia tenuis est, aut cum febris adest, pastas duras seu pandalea ex saccharo sic conficimus:

℞. Spe-

℞. Specier. diatragacanth. frigid. ℥ ij.
sacchari cand. & penidii. an. ℥ i.
in aq. violar. dissol. fiat pandaleon.

Ad maiorem expectorationem:

℞. Specier. diaireos simpl. ℥ j.
diatragacanth. frig. ℥ ij.
sacchari Maderensis, aq. rosar. solut. q. s.
f. pandaleon.

In materia crassa ac lenta è thorace educenda:

℞. Specier. diaireos simpl. ℥. ss.
piperis gr. i o.
mellis despumati & cocti, q. s. f. pasta solida
vel pandaleon.

Cum conseruis ad expectorationem:

℞. Conseru. violar. specier. diatrag. frigid. an.
℥ ij.
sacchari in aq. scabiose dissoluti & perfectè
cocti q. s. & ubi fuerit perfectè coctum,
conserua primum ponatur & exicce-
tur paulatim; donec in puluerem redigi
possit, qui tritura nō eget: ponatur omnia
in pyxide, & f. pandaleon.

Ad expectorationes vero:

℞. Conseru. enūla diligenter pistata ℥ ii.
conseru. capill. Veneris ℥ i.
specier. diaireos simpl. ℥ ij.
sacchari in aq. hyssop. dissol. q. s. f. pandaleon.

Sic tūriones à Gallis conficiuntur, qui à tor-
rendo dicti videntur: Conficiuntur ex auellanis,
vel amygdalis torrefactis, melle cocto exceptis,
Vel hoc modo:

℞. Pinearū contusar. & auellandar. cōtusar. an. ℥. ss.
mellis

mellis cocti, donec concreascit, quartarium ℞.
reducantur in formam turionum.

De Pasta regia vel pane Marcio.

C A P. XXXV.

QUod Electuarium regium Mesues nominat, nunc pastam regiam, quia ex hac magnatibus patinae formantur, & simul cum cibis deuorantur. Alii placentam siue panem dulciarium, panem Marficum, alii martium panem, à Gallico mazepan vocant: & in affectibus pulmonum & thoracis ad detergendum sputumque promouendum, utuntur: maxime vero in phthisi & atrophia, cum ex iis, quæ multum sanguinem generant, componantur, cuiusmodi sunt amygdal. dulc. ex-corticatae, pistac. nuclei pinei, dactylor. pulpa, passulæ exacinatae, caro capi elixi vel perdicis: quibus additur gummi tragacanthi, amyllum &c. Verum amygdalæ, si deterfione opus est, in aqua hordei; si vero nutritione, in iusculo capi, reliqua, ut & amygdalæ, in aq. rosarum macerantur. Dein simul cōrunduntur, sacchari quantitas sufficiens additur, & in massam simul rediguntur, ex qua placentæ diuersarum figurarum efformantur, quæ sensim in furno, vel vase cupreo, pane azymo vel charta subtrata, ne comburatur, coquuntur. Vulgaris panis amygdalinus ex amygdalis dulcibus mundatis & subtiliter contusis ℞. ℞. & sacchari optimi puluerizati ℞. j. affusa ad contusionem aq. rosar. q. s. conficitur.

Pro

Pro affectus necessitate materiæ mutatur, aliave admiscuntur. Nam si febris adsit, semina frigida maiora, recentia, mundata, sem. endiu. papau. albi singul. ℥. ii. ad ℥ i. amygdalarum. Reliquorum vero fructuum ad ℥. β. amyli ℥ i. β. vel ℥ ij. gummi ℥ j. β. aut ℥ ii. admiscebuntur. Vbi vero summa fuerit ventriculi refrigeratio, ambræ vel moschi gr. aliquot, vel species electuarii diarhodi Abbat, galliæ moschata, addi poterunt, vt:

℥. Amygdal. excorticat. ℥ ij.

nucleor. pineor. pistaceor. an. ℥ vj.

macerentur in aquæ ros. deinde simul contundantur, adde specier. diatragacanthi frigidi ℥. β.

cum saccharo & aquæ ros. q. s. fiat pasta,

ex qua formæ variæ fieri possunt, & vti dictum, coquantur, & æger, quando volet, vtatur.

Sunt qui additis conseruis, fructibus, penidiis, saccharo candido & syrupo conficiant, vt:

℥. Conseru. rosar. ℥ β.

conseru. capillor. Veneris ℥ vi.

dactylorum, passular. mundat. ficuum in mortario contusar. & per setaceum traiectar. an. ℥ iij.

sacchari candi puluer. q. s. pasta f. regia, cui syrup. aliquis conueniens, vt capillorum Veneris, vel violaceus addi poterit.

De Pignolato.

C A P. X X V I.

Pignolatum seu pineolatum, Gallis vsitatum
medicamentum ex saccharo in aq. conuenien-
ti

ti bene cocto & purificato, & pineis mundatis conficitur, & posteaquam concreuit, in buccellas siue frustula redigitur. Cuius in detergendis pulmonibus, sputo promouendo, & etiam renibus abstergendis, vsus est. Parari etiam potest hoc modo:

℞. Nucleorum pini ꝯ iij.
 amygdal. dulcium excortic. ꝯ ij.
 pistacior. ꝯ i.
 folior. rosar. rub. ꝯ j.
 santali, citrini & cinamomi an ʒ. ss.
 sacchari in aq. rosar. soluti q. s. f. pasta.

De Leucophago.

C A P. XXXVII.

Remedium leucophagum, à colore dictum, & à recentioribus inuentum, ex amygdalis dulcibus expurgatis, in aqua rosar. maceratis, carne caponis elixa, in mortario quam diligentissime contusa, per setaceum traiecta, cum tantillo amyli ad consistentiam, & saccharo, quæ omnia simul coquuntur, paratur: & ad corporis absorptionem, phthisin & virium prostrationem vtimur. Quod si ventriculi intemperies frigida adsit, vinum album, & cinnamomum, addi poterunt. Sic in alui profluuiio quocunque pulvis vtriusque coralli, lapidis hæmatitidis admisceatur, & in formam solidiorem cum iure carniū concreto, quod Gelatinam nominant, confici poterit. Sic quoque Gelatinā ex solo succo carniū expresso paratur: Item ex oriza elixa stacte & thorace caponis

ponis cum saccharo, quo medicamento potissimum in nimio alui fluore vti possumus.

De restaurantibus destillatis.

C A P. XXXVIII.

QVando ventriculus omnis generis alimenta solidiora fastidit, & frequenti nutritione indiget, destillata restaurantia vsurpanda, quorum materia est iusculum caponis iuuenis & succulenti, & armi vitulini cum oleribus conuenientibus cocti: vt in febre ardente cum lactuca, acetosa, borragine, seminibus quatur. frigidis maioribus, papau. alb. citri, acetosæ, florib. nymph. rosar. violar. Additur mica panis albi in portione iusculi infusa. Aliquando etiam conseruæ & species electu-
riorum corroborantium, succi, aq. stillatitiæ, quæ omnia in balneo Mariæ, vel alembico lento igne destillantur, exempli gratia:

℞. *Armum vitulinum, decoque cum sequentibus,*
herbar. lactuca, acetosa, endiu. an. m. j.
florum nymph. viol. an. p. j.
sem. quatuor frigid. maior. an. ℥ ij.

Dein

℞. *Iusculi caponis & armi vituli lb. vj. mica*
panis albißima in prædicto iusculo infusi
℥ iij.
conseru. ros. nymph. violar. an. ℥ ij.
specier. diarhodi Abbatis ℥ j. s.
aquar. stillatic. nymph. acetosæ, violar. an.
quartar. j.

N

destil-

destillentur, vt dictum. Huius aqua destillata accipe ℥.ss.

cum saccharo coletur per manicam, vtatur quando volet.

Potest etiam vsus tempore, succus limonum, aut granatorum aut arantiorum addi.

Quando corpus atrophiam, vel febre hectica laborat, sic confici poterit:

℥. Iusculi caponis, cum prae dictis herbis, florib. seminib. & hordeo mundato cocti ℥.v. carnis perdicum & testudinis nemoralis, carnis coxarum ranarum & limacum, an. ℥.ss.

mica panis in lacte infusa ℥.iii.

conseru. violar. nymph. an. ℥.ij.

aq. bugloss. borraginis an. ℥.ss. destillentur vt prius.

Ad alui profluuium aliasve euacuationes immodicas praeparantur ex carne turturum, perdicum, testudinis, mica panis in aq. rosar. infusa, conseruis adstringentibus, granis berberis, mali granati, succis plantag. burse pastoris, aquae rosar. portulac. plantag. corallis, pulueribus adstringentibus, vt:

℥. Carnem turturum duorum, carnem vnus testudinis, mica panis in aq. rosar. infus. ℥.ii. conseru. rosar. infus. ℥.ij. granor. berberis vel mali punici ℥.ss. semin. cydonior. portulac. an. ℥.ij. aq. res. portulac. plantag. an. q. sita vt aqua exsuperet, trochiscor. de terra sigillata. specier. electuarii triasuntali an. ℥.i. ss.

destil-

destillentur lento igne in diplomate.

℞. Aq. destill. ℞. B.

iulepi rosacei q. s. ad dul. orandum, quo potu sapius & in pastu, & inter pastus uti debet.

Possumus etiam, si febres adsint malignæ, aquas scabios. borrag. bugloss. admiscere cum saccharo. Et si aciditas ægro placeat, succi limonum, vel granator. aliquid addere.

Solent aliquando Medici ipsis destillatis in officinis præparatis pro delicatulis rheubarb. infundere, & sic eos purgare. Tempore vero pestis, vel si pestilenti febre laborans instaurante egeat, malo contraria addere oportet, ut sunt radices angelicæ, zedoariæ, pimpinellæ, herbæ scabios. meliss. bugloss. borragin. flores cordiales: semina acetosæ, ocymi. Conseruas aquas & pulveres cordiales, additis theriaca & mithridatio, simul, uti dictum fuit, destillari possunt.

De Emulsionibus.

C A P. XXXIX.

EMulsio, quod forte nomē ex eo inuenit, quod affectus demulceat, forma à posterioribus Medicis inuenta. Est autem Medicamentum, quod ex seminibus mundatis, vel fructibus, vel utrisque conficitur. Quo in calidis affectibus renum, vesicæ, ut ardore urinae, stranguria, urinae stillicidio: Item renum & vesicæ exulcerationibus utimur: Nonnunquam etiam ad somnum conciliandum, sitim extinguendam. Rarius in pectoris & pulmonum inflammationibus.

N

a

Mata

Materia sunt amygdalæ dulces excorticatæ, semina frigida maiora recentia, mundata; quæ blande detergunt, semen papau. albi, portulacæ, lactucæ, vbi maiore refrigeratione opus est. Adduntur nonnunquam prædictis coctis contusis, colatis syriupi conuenientes.

Formula communis hæc est:

℞. Amygdal. dulc. excortic. ℥ i.
 quatuor. semin. frigid. maior. recent. &
 mundat. an. ℥. ss.
 coq. in aq. fontan. q. s. deinde contundantur
 in mortario lapideo, affundendo paulatim
 aq. hord. ℔. ss. vel ℔. i.
 ne attritu pinguescant, cum multum succi
 pinguis fundant, reponantur in vas vi-
 treum.

Huius ℥ iii. vel iiij. horis iii. ante prandium vel coenam tepide exhibentur.

Quod si maiore refrigeratione opus sit, dolo-remq; mitigare velimus, sem. papau. albi. ℥. ss. sem. portulacæ, lactucæ, addere oportet, & simul contundere. Nonnunquam syrupus violatus, vel de nymphæa, vel de alth. singul. ℥. ss. vel alterutrius ℥ i. ss. admiscetur singulis dosibus. Nonnunquam loco syrup. tabella vna diatrag. frigid. ad singulas doses. Aliquando pro aq. hordei, vbi maiore refrigeratione opus est, aqua lactucæ, nymph. vel similis affunditur. Vel vna aut duæ harum cum æquali portione aq. hordei miscentur.

Si vero magis lenire volumus, decoctum sebestæ, sem. melon. papau. affundimus, exempli gratia:

℞. Amygdal. dulc. excortic. an. ℥ ij.

quat.

quat. sem. frigid. mai. an. ℥. ss.
 sem. papau. albi, lactuca an. ℥ i.
 contundantur simul in mortario marmo-
 reo, sensim aq. hord. ℥ ss.
 aq. viol. & lactuc. an. ℥ iij.
 affundendo, deinde coletur & sacchari pul-
 ueriz. ℥ i. addatur,
 f. emulsio pro quatuor dosibus.

Hoc refrigerat, acrimoniam vrinæ obtundit, par-
 tem exasperatam lenit, blande detergit, & leniter
 vrinam mouet.

Ad purulentos vero renes expurgando qua-
 tuor sem. frigid. papau. albi, amygdal. dulc. cum
 decocto radicis liquiritiæ rasæ terantur, & in cola-
 tura dissolue syrup. capil. Veneris, violati an. ℥ i.
 tempore exhibitionis. Pauperibus præscribenda
 aqua alba, Gallis vulgo dicta, quæ paratur ex amy-
 gdal. contusis, cum aqua hordei, vel lac amygdal.
 dulcium.

In affectibus vero pectoris conficietur ex nu-
 cleis pini recentibus, amygd. dulcibus, ficub. re-
 centibus syrupo aliquo leniente, vt de liquiritia
 vel tussilagine addito.

Sic ad somnū conciliandum ex seminib. papau.
 albi & amygdalis dulcibus emulsio paratur.

De Gargarismatibus.

CAP. XL.

Gargarisma ἀπὸ τῆς γαργαρίσειν, à fauciū collutio-
 ne, vt ex Dioscoride colligitur, nomē habet,
 quæ ἀναγαργαρίσειν vocat, Medicamentum est, consistentia
 N 3 liqui-

liquidum, quod tepidum citra deglutitionem ore sumitur, & aliquandiu detinetur, mox respuitur. Huius materia in vniuersum est liquor aliquis, vt aquæ communis, aquæ stillatitiæ, lac, succi, decoctū plantarum, acetum, omphacium, prout hic, vel ille affectus requirit. In quibus diuersa dissoluuntur, vt mel cōmune vel rosaceum, diamorū, dianucū : syrupi conuenientes, oxymel. Aliquando pulueres radicū & seminū. Plerumque alumen ad exiccā- dum & adstringendum. Horum autem pondus aliqui non obseruant : aliqui sumunt liquorū ℥ vi. syrupi & succorum ℥ ii. alii decocti ℥ ss. puluerum ℥ ii. vel iii. admiscunt. Cum autem facile corrumpantur, recenter semper parari debent.

Valent autem Gargarismata in affectibus cerebri, vt paralyti, epilepsia, grauitate capitis ad pituitam eliciendam, deinde ad affectus faucium, vt earundem inflammationes. Item humores inhibendos, vel discutiendos, vel vlcera detergenda & consolidanda. Sic ad tonsillarum, vuulæ, palati inflammationē, viscidæq; pituitæ deterfionem.

Quod si vero humor è cerebro in fauces, pulmones, ventriculum fluat, tunc à gargarismatibus & apophlegmatismis abstinendum, & errhinis vtendum. Vtendi tempus commodissimum erit matutinum, & vespertinum ante cibum.

Ad pituitam è cerebro euocandam ex incidē- tibus & detergentibus, quæ nec sapore, nec odore nimium sint ingrato, confici debent, vt maiorana, betonica, origano, hyssopo, passalis, glyzyrrhiza, pyrethro & similibus, ex quibus decoctū in aqua paratur; decocto colato additur mel, oxymel. syr. de stoechade. exempli loco:

℥

℞. Summitatum betonica, origani, calamin-
tha an. m. i.

ficus concisas numero iiij.

passul. mundat. radic. liquirit. rase & radie.

pyrethri an. ℥. ss.

piperis ℥ i.

f. decoctum in lb. i.

colatura dissolue mellis vel oxymelitis squill.

℥ iiij.

f. gargarisma. quo calido sæpe vtatur.

Ad Inflammationes faucium, vel tonsillarum,
vel etiam vuulæ in principio, humore adhuc fluē-
te, parantur ex succis fructuum acerborum, aci-
dorum, austerorum, adstringentiū cum portione
aquæ, vt ceraforū, cydoniorū, prunorum, sorborū,
pyrorum, vel ex aquis stillatitiis refrigerantibus,
adstringentibus, vt plantaginis, bursæ pastoris, cē-
tinodii, solani, portulacæ: aut decocto eorundem
fructuum, aut herbarum, vel succis granatorum,
de moris, de berberi. In hisce decoctis vel aquis sy-
rupus conueniens dissoluitur, vt rosarum liccarū,
cydoniorum, granator. vel succi diamoron, dia-
nucum vel rosarum. Exemplum;

℞. Aq. plantag. solani, rosar. an. ℥ ij.

aceti ℥ j.

syrupi granator. vel de rosis siccis ℥ ij.

f. gargarisma.

Vel:

℞. Aquæ prunellæ. plantag. solan. an. ℥ ii.

diamori dianucum an. ℥. j.

mellis rosati ℥ i. ss.

f. gargarisma.

N

4

In

In augmento vero & statu inflammationis repellentibus digerentia admiscenda, vt hordeum, glyzyrrhiza rasa, simul decoquendi. Syrupus etiam de althea vel glyzyrrhiza in decocto dissolui possunt, sumendo decocti partes duas, syrupi vero partem vnam.

In declinatione ex hordeo integro, glyzyrrhiza, hyssopo, scabiosa, decoctis in aq. vel hydro-melite additur semen altheæ, ficus, passulæ, in decocto dissoluitur mel, syrup. de althea, oxymel.

Vulgarissimum Gargarisma in faucium doloribus paratur ex decocto hordei integri, flor. rosar. purpur. flor. malux arborescentis (nonnunquam foliis aliquot saluix additis) & in colatura mel dissoluitur.

Alias ad faucium inflammationem sine tumore proderit gargarisma in principio inflammationis præscriptum, admixtis aliquot lenientibus, vt hordeo mundato, sebesten, sem. papau. albi, seminib. quatuor frigid. maiorib. Quod si vero adsit vlcus ex abstergentibus & siccantibus parabitur, vt decocto hordei integri, foliis plantag. solani, agrimon. corticib. granator. sumach. fructibus acerbis, cum melle rosaceo ad lb. eiusmodi decocti syrupi conuenientes, vt rosar. siccarum, vel rosar. pallid. & diamoron. ad \bar{z} ij. aluminis vero ad maiorem exiccationem & adstrictionem \bar{z} j. additur. exempli gratia.

℞. Folior. pyri syuest. vel rubi, plantag. rosar. rubear. an. m. j.

in f. aqua, fiat ad tertia partis absorptionem decoctio in lb. j.

dissol-

dissolue diamori ℥ ij
aluminis ℥ j. misce.

Huius gargarismatis in vuula relaxata vsus esse debet.

In hanc classem oris collutiones referre oportet, quas apophlegmatismos nonnulli *a* vocant, ^{a Trallian. lib. 3. c. 6.} quæ ad dolores dentium & oris fœtorem parantur. ^{Oribas. l. 4. de locis affect. cur. c. 60.}

Ad dentium dolores in principio fluxionis, & causa frigida, decoctum ex adstringentibus & calefacientibus, vt radic. cyperi, balauistiis, corticibus citri, saluia & similibus in vino generoso decoctis parabitur. In fluxione vero calida, ex adstringentibus frigidis, vt radice pentaphyli, nuce cupressi, gallis. Fluxione vero iam facta eaque frigida, magis calefacientia addenda, vt rad. pyrethri, hederæ, piper, cubebæ, garyophylli, quæ in vino adstringente decoquenda: Exemplum.

℥. Rad. pyrethri ℥. ℞.
rad. quinquefolii ℥ j.
cubebæ. garyophyllor. an. ℥. ij.
piperis longi ℥ i.

Si vero fluxio calida sit, frigida admiscenda erunt, & si dolor intolerabilis sit, opii gr. ij. in aceto acerrimo & vino elixanda, quo decocto dentes colluantur: Vel, pilulæ parentur, quæ dentis cauo indantur, vt:

℥. Opii, croci, an. gr. ij. cum cera fiat pilula.
Vel,

℥. Sem. apii ℥ j.
opii, hyoscyami an. ℥. ℞. cum vino odorifero fiant pilula.

N s

qua-

quarum vna denti indatur, & saliuam exspue.

Sunt, qui hoc decocto vtantur:

℞. Ligni quaiac. ℔. i.
cortic. eiusdem ℥ ij.
galbani ℥ i.
vini albi ℔. iij.
f. putrefactio per dies octo.

Deinde per alembicum destillentur. Serue-
tur ad vsum.

Vfus tempore huius ℥ ij. ore detinenda. Addunt
nonnulli salis & piperis longi an. ℥ ii. In frigido
vero dolore summo, collutio fiet ex aq. vite, in qua
theriaca, ammoniacum item, vernicis quinetiam,
(cuius fumus solus dolorem dentium sistit) ali-
quantisper ferbuerit. Deinde fit colatura, qua dēs
colluitur. Et etiam cum linteo baculo appposito,
vel bombace abstergitur.

Ad foetorem oris:

℞. Rosar. p. i.
cortic. citri ℥ ij.
garyophyll. cinnamomi an. ℥ iij.
f. decoctio in aqua, tantillo aceti addito, os
coluatur.

De Apophlegmatismis siue masti- catoriis.

CAP. XLI.

A Pophlegmatismi medicamenta sunt, quae vel com-
manducata vel palato i. lita, pituitam e capite in os
a lib. 3. c. 6. prouocant, & pituitam oris partibus adharentem, abster-
gunt, vel quae saliuā, vt habet Trallianus a, per os educunt.
Siquidem ἀποφλεγματισμὸν pituitā purgo siue elicio,
Dio-

Discoridi *b* significet. Hinc eidē *c* remedium hoc
 ἀποφλεγματισμός dicitur. Dicūtur barbaris mastica-
 toria, vel quod ore mandantur, vel quod plerum-
 que mastichen recipiant. Horum materia, mastix
 per se manducata, vva passa in ore huc & illuc de-
 uoluta, truncus saluiae (Alii folia in ore detinent)
 sinapi tulum, piper longum, nasturtium, sta-
 physagria. Sic & aromata, vt sunt garyophylli, nux
 moschata, cubebæ, radic. ireos, angelicæ & similia,
 Quibus singulis vel per se vel in puluerm commi-
 nutis, & vel succo aliquo, vel liquore, vel melle
 vel mastiche liquata vel cera exceptis, & in tro-
 chiscorum formā lupinorum instat efformatis vt
 licet, quorum vnus serico panno inuolutus ore
 retinetur & masticator. Nonnunquam theriaca
 & mithridatium etiam vsurpantur. exemplum

Ad dolorem capitis:

℞. Pyrethri, piperis albi, zingiberis an ʒj.
 cubebæ ʒ.ß.
 cum melle excipiantur & fiant pastilli.

Ad dolores dentium:

℞. Piperis pyrethri an. ʒ. j. ß.
 mastice ʒi.
 mellis q. s. fiant pastilli, lupinorum instar, ʒiii.
 pondere. d.

d. Actuar. 2.
 meth. 11.

atq; vsu appetente vnum commanducandū exhi-
 bito. Vel ex prædictis cōtusis fiant noduli, & pan-
 no serico vel linteo tenui indātur & masticeantur.

℞. Mastice ʒ.ß.
 piperis longi, pyrethri, garyoph. staphysagria
 an. ʒii. sacchari candi ʒi.
 spuluis, ex quo fiant noduli.

His

c Oribas. 8.
coll. 10.

His vtendum, vbi cetera remedia fuerint adhibita, & iam potius remediis localibus opus est, ventriculo ieiuno. Modus autem, vt ore diu teneantur, mastificentur, caput *d* deorsum flectatur & per interualla, quo congestus humor effluat, os aperiendum & commansa expuenda. Posthæc aqua *d* calida (vel *e* melicratum) ore continenda, cumque multus morsus perferentur, effundenda. Vel, si vehemens morsus remanserit, lacte aut rosaceo calido os colluendum. Quare quæ ingrati sunt saporis, apophlegmaticis neutiquam sunt miscenda. Notandum tamen, ne masticatoriis, quando pituita è cerebro in fauces, pulmones & ventriculū fluit, sed errhinis vtamur. Ex iisdem rebus decoctis diuque in ore retentis etiam vti licet. Sic etiam ex hisce vnguenta fiunt, quibus palatum illinitur.

De Collyriis.

C A P. XLII.

a Oribas. 10.
coll. 23. sign-
ram cauda
muris simi-
lem tribuit.

KOLLYRION siue Collyrium, veteribus medicamentum fuit oblongum *a*, rotundum, ex liquoribus, succis herbarum, fructuum, seminum & metallicis, ad vsus varios compositum & asseruatum, quo vel integro utebantur, vel in puluerem redigebant, qui vel siccus, vel humore aliquo dilutus, vel linimento exceptus parti adhibebatur. Hinc veteres pleraque medicamenta in collyrii formam fingenda præcipiunt, & ad omnes omnium partium affectiones, quibus admoueri possunt, diuersarum omnino facultatum comparant. Nari-

Naribus etenim, item & auribus Galenus ^{b 3. de comp. secundum loc.} imposuit: Vtero *a* item, quæ tamen proprie Pessaria dicuntur: Ano *c* quoque, quibus glandis nomen ^{c Aetius, Scribonius, Columella lib. 6. c. 6.} nunc tribuitur: Fistulis *d* etiam: Vtitur similiter ^{d Aetius lib. 14. cap. de fistulis.} Aetius *e* ad suffitus, ad tussim per infundibulum. Sed hîc de medicamento oculari sermo est, quod ^{παρὰ τὸ κολλᾶν τὸν ῥοῦν.} proprie collyrium *a* dicitur. Dictum volunt ^{παρὰ τὸ κολλῆναι.} quod comprimat fluxionem. Aliis ^{Orib. 10. coll. 23.}

Duplicia facimus *f*, arida & humida. Illa ^{καλλύεαι, hæc ὑγροκαλλύεαι} *g* ^{dicuntur.} Arida collyria, ^{f Aegin. l. 7. c. 8.} Sieff Barbaris, potissimum ex metallicis constant, ^{triplicia, quædam simpliciter} feminibus, fructibus aromatis & alia sicca materia, quæ humore aliquo, vel gummate colliguntur & condensantur, quæ in æneum vas, cum ab ^{plasta appellantur, quædam arida, quadam liquida, exstant.} ære meliora fiant, reponi debent, & vetustate ^{Sic Aetius ter. 2. ser. 2. c. 97.} præstantiora euadunt. Humida vero ex liquoribus, succis, melle, animalium felle & aliis ^{compositis illitiones, collyria arida & collyria liquida.} pluribus humidis, quibus protinus uti licet, cum vetustate euanescent. Hæcque priuatim collyria dicuntur, quæ rursus duplicia, vel mollia, mellis consistentia, ^{πλάσα} *g* faliquando vocata, quod affectæ parti delinantur; vel liquida.

Arida in pyramidis formam vel trochiscorum rediguntur, quæ tempore vsus vel trita ac læuigata insufflantur, aut palpebris subiiciuntur, vel in tenuissimum pollinem redacta, & conuenienti aliquo liquore dissoluta, oculorum angulis guttæ aliquot instillantur, quorum ζ j. in ζ j. β . vel ζ ij. liquoris dissoluitur. Horum materia ut & liquidorum, multiplex pro affectuum diuersitate. Et licet varia apud Græcos *g* habeantur collyria, ^{fuis}

Myrepsius
sect. 24. Cel.
sius lib. 6. c. 6.
Scribonius.
c. 3. 4. Mar-
cell. c. 8.

suis nominibus distincta, communiter tamen hæc parata habentur: Trochisci albi Rhafis, qui, ut eiusdem collyrium rubrum, leniunt & glutinant. Collyrium è plumbo, quod glutinat & siccatur, quemadmodum & illud, quod e thure conficitur: Collyrium vero ex myrrha tenues & acres fluxiones lenit & concoquit. Collyrium e pompholyge siccatur & glutinat. Quod vero viride à Rhase dicitur, erodit. Verum ad horum imitationem varia pro re nata præscribi possunt, ut, ad lachrymas & fluxiones:

℞. Tutia prepar. sarcocoll. in lacte muliebri nutrita, aloes, mastice, an. æquas partes. excipiantur aqua rosarum, fiat collyrium siccum in formam trochiscorum.

Vel ubi dolor magis urget, & leniendum, siccandum & refrigerandum est, tum

℞. Ceresa lota in aq. rosar. & rursus exiccata ℥ ii.
camphor. gr. x.
albumine oui excipiantur, & fiant trochisci ad usum.

Mollia, quæ mellis consistentiam habent, & quibus utendum, cū diutius adhærere volumus, eiusmodi est collyrium ex pompholyge, vel tale:

℞. Tutia preparata & subtiliss. puluerisat. & in aq. rosar. lota ℥. ss.
pomada ℥ j.
amylī ℥ ij.
agitentur diu in mortario, affusa paulatim aqua solani ablutionis gratia.

Hoc extremæ palpebræ illinatur, & tantillum in-

tra oculum ponatur. Quod si vlcus adsit, collyrio ex aqua plang. solani, cum syrupo ros. sicc. vel melle rosac. vtendum. Alia vero sunt liquida ad oculorum dolores leniendos, vt in ophthalmia Sed quemadmodum & diuersa sunt ophthalmia & epiphora, alteriusve in oculum fluxionis tempora: sic etiam collyria variare debent, cum initio fluxionis præmissis vniuersalibus repellentibus & leuiter adstringentibus locus sit, quo humor fluens à parte affecta repellatur. Initio autem adhiberi debent ea, quæ anodyna sunt, vt est aq. rosac. solani, plantag. albumen oui, mucilagines sem. psyllii, cydonior. in iisdem aquis extractæ. Succus etiam herbarum adstringentium, seu repellentiũ frigidarum, in quibus trochiscor. albor. Rhasis sine opio ℥ j. dissolui potest, nisi mitioribus, vt mucilagine sem. cydonior. in aq. plantag. extracta, cū albumine oui diligenter agitata mitigetur. vt:

℥. Album. oui vnius, agitetur cum aq. rosar. vel plantag. misce, indatur in oculum.

Vel,

℥. Mucilag. sem. cydonior. extract. cum aq. plantag. vel rosar. ℥ j. misce cum albumine oui, diligenter agitando cum spatula. In incremento vero prædictis admiscenda sunt digerentia, ita tamen, vt adstringentia præpolleant, vt:

℥. Aq. rosar. plantag. an. ℥. ℞. mucilaginis sem. psyllii & lini extract. in aq. solani, & fœniculi, an. ℥. ℞. tutia preparat. & subtiliss. p. aueriz ℥. ℞. vel tutia & sarcocolla in muliebri lacte nutrita, an. ℥ j. misce.

In

In statu coquentia & resoluentia prædictis ad-
dere oportet, vt:

℞. Aq. fœnic. euphras. an. ℥ vi.
mucilag. sem. lini. altheæ extract. in aq. ro-
sar. & plantag. an. ℥. ℞.
thuris subtiliss. pulueriz. ℥. ℞.
croci ℥. ℞.
misce, f. collyrium.

Sic & lac muliebre cum saccharo vel decoctum
meliloti in aqua rosar. vel euphras. vel etiam in aq.
fontana cum saccharo valet. In declinatione ad
reliquias absumentas, ex digerentibus parari de-
bent, vt ex prædictis aquis, mucilaginibus, sarco-
colla, tutia, aloë. Vel collyrii loco erit sanguis, ex
vena sub ala columbi viui secta, oculo instillatus,
qui reliquias absumere, calorem natium robo-
rare, & dolorem etiam mitigare potest.

Commendatur maxime sequens collyrium:

℞. Aq. rosar. ℥ ij.
vini albi ℥ i.
tutia, sacch. candi pulueriz. an. ℥ i.
simul indantur vitro, soli exponantur, & a-
liquoties commisceantur.

Subsequens ad plures vsus valet:

℞. Tutia prepar. ℥ i.
sacchari candi ℥. ℞.
aloes ℥ iiij.
chalcitidis vsta ℥. ℞.
camphor. gr. v. aut vj.
Aq. rosar. ℥ ij.
diligenter trita misceantur.

Quod si tantum lordes expurgare oporteat, col-
lyrium

lyrium parabitur ex tutia præparata, aloë lota, lapide calaminari, & similibus, quæ liquore conuenienti excipi debent, vel puluere sicco vti possumus, cum sic eæ sordes rectius abstergantur & exciccentur. Molliâ rursus, quæ liquida sunt & dolorem mitigant, sunt aquæ destillatæ, vel etiam succi rosarum violar. solani, lactucæ, hyoscyami, papau. Sic etiam album. oui cum prædictis aquis conuassatum: succi pomorum, pyrorum adstringentium; decoctum quineriam prædictarum plantarum: seminum item lini, althææ, fœnugr. fœniculi, florum chamom. meliloti, quorum in humore frigido vsus esse potest. In dolore à causa calida mucilago sem. psyllii, cydonior. in aquis refrigerantibus extracta, sic etiam mucilag. sem. lini, althææ.

Dolores etiam lenit collyrium album Rhasis, seu trochisci albi, sine vel cum opio, lac muliebri, vaccinum, asininum recens mulsum, in quibus mica panis albißimi incoquitur, exprimitur, expressum cum linteolo oculo applicatur. Albumen oui per se lenit, contemperat, refrigerat, & suo lentore oculum, ne facile ab humore acri lædatur, illinit.

Parari autem potest & tale:

℞. Aq. rosar. plantag. solani, an. ℥j.
albumen vnus oui, agitentur simul, & tepide
oculo instilletur, & linteolum in eodem
intinctum applicetur, & aliquoties in die
repetatur.

Dolore magis urgente:

℞. Mucilag. sem. psyllii, cydonior. extract. in aqua
papau.

papau. i. el si magis refrigerandum hyo-
scyami an. ζ i.

aq. p' antag. solani an. ζ . β . misce.

In dolore vero intensissimo narcotica adden-
da, exempli gratia:

\mathcal{R} . Trochisc. alborum Rhafis cum opio subtilissi-
me supra marmor leuigatorum ζ i.

lactis muliebris ζ ii.

vel aqua solani & violarum an. ζ i.

fiat collyrium.

vide Tralli- quo cum cautione vtendum. Doloresedato, ocu-
an. lib. 2. c. 1. lus decocto leuiter calefaciente, vt est decoctum
meliloti, semin. lini, fœnugræci, &c. fouendus.

Ad oculos vero lacrymantes & rubentes:

\mathcal{R} . Tutia præpar. ζ i.

aq. plantag. & rosar. an. ζ j. misce.

Huic tepido linteolum molle immersum angulis
oculorum & inferiori palpebræ admoueat. In
fluxu vero vehementi addere oportet vitreoli al-
bi \mathfrak{D} j. vel ζ β .

Ea autem, quæ collyriis miscentur, diligenter
comminui debent, & in tenuissimum pollinem
redigi: minus enim exacte trita, asperitate & suo
contactu partem adeo sensilem exasperant; cuius
nomine præstat pulueres cum portione aliqua a-
quarum per linteum transcolare.

Collyria sicca præparantur, quemadmodum
i In Philonis Celsus i & Oribasius k monent, qui omnia medi-
collyrio lib. 6. camenta, quæ collyrium constituunt, singula pri-
c. 6. mum per se terenda sunt, metallica quidem longo
k 10. colle- tempore, succi autem exiguo. Deinde mixta ite-
rum. 23. rum, adiecta aqua, præsertim pluuiiali, aut vino
aut

aut alio liquore, non copiose l' affuso, ne metallica
subsideant, aromata supernatent, sed paulatim, vt
salium modo teri possint. Mox gummi adiicien-
dum, quod præter quasdam facultates, quas ha-
bet, hoc maxime præstat, vt vbi collyria facta ina-
ruerint, glutinata sint, neq; fricentur. In formam
reducta, vasis vitreis, maxime æneis reponenda
sunt.

¹ Aegineth.
l. 7. c. 16.

De Errhinis siue nasalibus.

CAP. XLIII.

ERrhina, q. ἐν ῥίνα à naribus denominata, medi-
camenta sunt, quæ per nares a purgant. Nari-
bus induntur ad piritam è cerebro euocandam,
meatum obstructionem, vel exulcerationem
tollendam, sternutamenta mouenda, & sanguinis
e naribus fluxum sistendum. Hæc duplicia b sunt,
vel humida, vel arida. Humida vel mollia, cerati
forma, vel liquida, quæ à quibusdam errhina li-
quida, & caputpurgia dicuntur. Arida vero er-
rhina in specie, quibusdam barbaris Nasalia di-
cuntur. Liquidorum materia eadem, quæ garga-
rismatum ad vsum eundem descriptorum.

a Trall. lib.
3. c. 6. Añu-
ar. de spi-
rit. anima-
li act. c. 13. &
3. meth. 6.
b vt ex My-
reps. sect. 15.
coll. gatur.
Tralliam.
lib. 1. c. 11.
Aegineth.
lib. 3. c. 1.

Aq. stillatitiæ, vt betonicæ, maioran. rorismar.
saluiæ, succi & decocta herbarū cephalicarū: ma-
ioran. beton. hyssop. origan. vel aliarū, vt anagall.
mercurial. Vel radicum, vt betæ, cyclam. bryoniæ,
oreos, quæ singula per se vsurpantur, vel miscentur:
Vel deniq; his pulueres miscetur, vt agarie. turpe-
chi, oreos, ellebori, nigellæ, myrrhæ. Nonnūquam
puluis

pulvis hieræ picræ dissoluitur; & hæc vel naribus attrahuntur, vel infunduntur: vel succis & pulueribus simul ad vnguenti spissitudinem mixtis, internis narium partibus illinuntur.

Exemplum ad pituitam purgandam:

℞. Succu betæ vel mercurialis ℥ ii.
agarici trochisc. ℥ ii.
vini parum, f. decoctum in collatura dissolue
mellis q. s.

Ad pituitam detergendam:

℞. Hordei integ. p. i.
lupinor. p. s.
origan. m. j.
maioran. m. s.
f. decoctio in lb. j.
decocti colati dissol. mellis squillit. ℥ j. s.

Ad vlcera detergeuda:

℞. Decocti hordei lb. j.
mell. ros. col. ℥ iij. misce. attrahatur.

Ad detergenda & simul consolidanda:

℞. Succu plantag. solani, rosar. an. ℥ ij.
vini albi, mellis an. ℥ i. s. misce.

Ad sanguinem narium suppressendum:

℞. Succu plantag. bursæ pastoris, an. ℥ i. s. misce.
Vel:

℞. Sang. dracon. boli armen. pulueriz. an. ℥ j.
lanuginis salicis, pilor. leporis minutiss. con-
cisorum an. p. s.
simul omnia albumine oui excipiantur, &
naribus indantur.

Ad sternutationem pulvis ireos, pyrethri, staphydisagriæ: Simul pulueres hi aliquo liquore excipi-

cipiantur, & instar linimenti naribus inungantur.

Arida vero errhina duplicia sunt, vel materia sunt coacta, vel dissipata. Quæ coacta, oblonga forma ex pulueribus, oleis, & succis quibusdam acrioribus, cera exceptis, panno vel serico inuoluta conficiuntur, naribus immittuntur, filo tamen alligata, vt retrahi possint. Dissipata vero sunt pulueres sicci, qui calamo naribus insufflantur, & proprie sternutatoria dicuntur.

Ad sanguinem sistendum:

℞. Thuris ℥ ii.

aloes ℥ i.

contrita in puluerem ex albumine oui subigantur, & mollissimis pilis leporinis adiectis, in penicilli formam redigantur & naribus indantur.

Sic sternutamenta excitantia vel sola fibra rad. hellebori albi naribus inditur, vel pulueres acres & mordicantes inspirantur, vt ex helleboro albo, pyrethro, iride, pipere, semine nigellæ vel staphydisagriæ. Vel errhinum compositum ex c cyclamino dictum, quod ex cyclamini radice parti-
bus duabus, & vini rubri parte vna conficitur. V-
sus horum omnium in diuturnis capitis affectibus
& narium obstructionibus, vlceribus & odoratus difficultate.

Vtendi tempus est vniuersalibus præmissis, & ventriculo ieiuno. Modus autem vtendi errhini, mollis quidem, nares d subunguntur, & attrahere
iubetur; liquidi, materia ad 3. s. è cauo manus, vel calice, capite in posteriora reclinato attrahitur, ita tamen, vt os aqua repletum sit, ne succi

O

3

attra-

*d Trallian.
lib. I. c. 6. &
II.*

attracti per amplum palati foramen, ori & naribus commune, diffuant. Arida vero probe trita per *d* arundinem inspirantur, sursum inclinando attrahuntur, dein æger deorsum pronuere debet, quo videlicet coactus humor destillet, & etiam id, quod in ore congregatur, expuere debet. Cauendum autem est ab errhinis, dum oculi afficiuntur, propter viciniam narium & oculorum, & tum apophlegmatismis vtendum.

DE MEDICAMENTIS SEV REMEDIIIS EXTERNIS; & primum

De Oleis,

C A P. XLIV.

& simplicia

Absoluta internorum medicamentorum historia, externorum compositionem subiiciemus. Ordinem autem ab oleis, tanquam simplicissimis, cum ad linimentorum, vnguentorum, ceratorum, emplastrorum & similium compositionem requirantur. Sunt autem oleorum duo genera prima: Simplex & compositum. Simplicia olea dicuntur à Galeno omnia ea, quæ è solis fructuum seminumque nucleis, quæ pinguem in nucleo vel semine, ceu medullam habent, exprimuntur: sic dicta, quod illis educendis vel exprimendis aliud misceri non consueuerit, præterquam quibusdam paucillum aquæ.

Est vero simplex duorum quoque generum, pro
ratio:

ratione præparationis: Vnum expressione fit, alterum ignis vehementia extrahitur seu destillatione elicitur. Expressione fit ex fructibus, vt oliuis, & iis vel immaturis, vel maturis.

Ex immaturis, satius tamen, expressum oleum omphacium dictum, ceteris oleis refrigerantibus, adstringentibus, roborantibus, præparandis, vt oleo rosac. oleo cydoniorum magis accommodatum est. Alterum vero maturum ex maturis baccis exprimitur, & oleum simpliciter, vel oleum oliuarum nominatur, quod laxat, digerit & mollit. Ad cuius similitudinem ex aliis fructibus, baccis & seminibus oleosis in mortario tritis, & vapore aquæ calidæ tepefactis sacculo inclusa, torculari subiiciuntur, vt per expressionem oleum purum effluat.

Hoc pacto conficiuntur oleum amygdal. dulc. amar. pistacior. nucum, baccarum iuniperi, lauri, myrthi, sem. lini, cannabis, papau. hyoscyami, cucurbitæ, melonum &c.

Destillatione vero eliciuntur ex liquoribus, succis, gummatibus, resina, cera, melle, lignis resinosis, aromatibus, seminibus, herbis. Fit autem vel per descensum, vel per ascensum: Per descensum elicitur oleum ex lignorum corticibus, vt oleum guaiacinum: ex lignis ipsis, vt ex ligno iuniperi: ex quibusdam etiam herbis aridis, item oleum e baccis iuniperi, à tartaro, oleum philosophicum dictum, quod & è lateribus nominatur. Alia vero per ascensum destillatione eliciuntur ex diuersis, quod aliqui spiritum, alii quintam essentiam nominant.

Compositum est, quod ex simplicibus fit, ut arborum, fruticum, herbarum foliis, floribus, seminibus aut aliis partibus medica vi pollentibus, oleo oliuarum aut oleo simplici, vel maceratis, vel insolatis, vel incoctis. Ex floribus enim insolatu conficiuntur, cum concoctionem non tollerent. Et ex his quidam diu, quidam pauco tempore insolantur, ut meliloti keyri, sambuci. Quædam insolatu tenuiora redduntur & utiliora, ut ex rosis, chamomelo, liliis albis. Quædam antequam colentur, duplici vasi incoquuntur, ut anethinum, nardinum. Hæc tam diu in olla relinquuntur, usque dum oleum materiæ vires prorsus exceperit, & tum exprimitur & reconditur. Quæ olei conficiendi ratio pharmacopœis vſitatissima est, quibus etiam sine dispendio vti licet, cum contra destillatione elicitis, non nisi cum magna cautione vti liceat.

Ex oleis vſitatis quædam calefaciunt, quædam vero refrigerant. Calefacientia, rarefacientia & quæ digerunt, sunt, chamomelin. anethinum, quibus efficacius est oleum amygdalarum amararum, nucum, ex semine ricini, ex cocto, ex ruta. Potentius erit oleum vulpinum. His destillata de origano, de aniso, hyperico, thymo; sic de castoreo, de croco, expressum etiam ex baccis iuniperi, lauri, de lateribus.

Verum nonnulla calefaciunt & humectant, simulque laxant, ut liliaceum, amygdal. dulc. de sesamo, sic etiam quæ destillatione eliciuntur ex gummatis, ammoniaco, sagapeno, opopanace, galbano, ladano, quibus ad frigidos dolores
poda-

podagricos mitigandos, tophos emolliendos vtimur.

Alia sunt, quæ calefaciunt, adstringunt, roborant, fluxiones arcent, vt est mastichinum, lentiscinũ, & destillata ex mētha, absynthio, sulphure.

Sunt quæ calefaciunt & detergunt, vt oleum de myrrha, de ouis, frumento, tartaro, iunipero, ex quibus etiam, quemadmodum ex metallicis, arte chymica eliciuntur olea, tenuium valde partium. Quare altius subeunt, & potentius resoluunt. Cuiusmodi est etiam oleum de cera, de therebinthina, quod attenuat, resoluit. Sic etiam quod è butyro elicitor, insigne est anodynum, præcipue ad dolores partium neruosarum, maxime vero oleum de citellis. Eliciuntur etiam ex aromatibus, quæ ventriculum reficiunt, & corroborant, vt ex nuce moschata, quod per expressionem & per destillationem elicitor, ex cinnamomo, garyophyllis, pipere. His vero per destillationem elicitis, aliquot tantum guttis vtimur.

Quæ vero ex lacrymis & gummatibus per destillationem eliciuntur, duos tumores emolliunt, podagricos dolores sedant. At quæ ex metallicis, vt antimonio, chalchantho seu vitriolo & similibus eliciuntur, his ad virulenta vlcera & fistulas, vel per se, vel cum oleo de myrrha, cum putredinem arcent, vtimur. Quod vero è sulphure elicitor, eo ad dolores dentium à causa frigida vtilicer. Sic etiam oleo vitrioli in febribus ad sitim sedandam, guttis aliquot aquæ communi admixtis, vtili possumus. Sed Chymicis his oleis caute magnoque cum iudicio vtendum.

Quæ-

Quædam vero refrigerant, exiccant, adstringunt, fluxiones intercipiunt, & partem roborant, vt est oleum rosac. cydon. myrtillorum, nenupharinum. Hisce oleis & præsertim rosaceo, si aceti quara pars permisceatur, fit oxyrhodinum validissimum.

Alia refrigerant & humectant, vt est oleum violatum, ex floribus papau. nymph. quæ conciliando somno vtilia sunt. His potentiora, quæ ex mandragora hyoscyamo parantur. Hoc vero, cum sua proprietate caput lædat, in affectibus capitis omittendum: in doloribus vero podagricis calidis eo, vt ceteris, vti licet.

Quæ vero olea huic vel alteri parti profunt, nunc explicandum.

Capiti calefacto olea refrigerantia conueniunt. Cautione tamen hic opus est. A summe enim frigidis abstinendum est, nisi summi dolores id requirant, viribus tamen adhuc robustis. Ab oleo vero ex hyoscyamo abstinendum.

Refrigerato vero cerebro olea calefacientia applicari possunt, ita tamen vt quæ summe odorata sunt, & acuti odoris, per ablutionem cum aquis capitalibus, corrigenda.

Nervosis partibus affectis, in quacunque tandem sit corporis parte, olea principio spinalis medullæ, hoc est, nuclæ applicanda sunt, vti sunt, oleum vulpinum, costinum, itinum, nardinum, lumbricorum, de castorio, de lateribus, de therebinthina: quibus in paralyti utimur, quemadmodum etiam oleis arte chymia elicitis, vt est oleum de therebinthina, oleum saluæ (cuius guttæ aliquot
vel

vel naribus vel ori induntur) maioranæ, rosmari-
ni. Quo vero olea hæc, quæ nuchæ applicantur, vi-
res suas melius exerant, meliusque penetrent, cum
aqua vitæ & saluæ abluenda sunt.

Thoraci & partibus in eo cōtentis calefactis, vt
in pleuritide, peripneumonia, tussi, oleū violatū,
oleum amygdalar. dulcium recens, vel solum, vel
aliis, maxime butyro, leniendi & relaxandi gra-
tia, mixtum inungitur: abstinendo ab iis oleis,
quæ vna cum vi refrigerante vim adstringendi ha-
bent. Quod si autem thoracis partes defluxione
frigida infestentur, oleum chamomelinum, ane-
thinum, liliacum, ex semine lini, keyrinum prod-
erunt. Vbi vero fluxio magna est, tam in calidis,
quam in frigidis affectibus, nisi toti corpori sit
prospectum, his abstinendum.

Ventriculo calefacto oleū rosac. cydonior. quod
melinum dicitur, oleum myrtillorum. Si vero in-
flammatiō adfuerit, admiscenda erunt, quæ simul
refrigerando humectant, vt est oleum nenuphari-
num, papauerinum. Refrigerato vero ventriculo
& relaxato proderit oleum de mastiche, de men-
tha, de absynthio, nardinum & nucis moschatæ
per expressionem. Hepati conueniunt olea, quæ
ventriculo, ita tamen, vt in applicatione aliquid
vinum, quemadmodum in lienis affectibus aceti ali-
quid, penerrationis gratia, admisceatur.

Liene affecto eoque obstructo commendantur
oleum amygdal. amarar. & si induratum existime-
tur, oleum liliorum, & quæ ex lacrymis & gum-
matib. extrahuntur. In primis vero oleum de cap-
sularibus in omnibus affectibus lienis vtile est.

Reni-

Renibus male habentibus & calefactis lenientia & laxantia applicantur, ut est violat. amygdal. dulc. e semine lini. Sic etiam, quæ magis dilatant, oleum è scorpionibus, quo calculo hærente in vreteribus, imo & vesica, nil præstantius, si inungatur. Vel etiam per fistulam vesicæ iniici potest, quando vrina, à calculo, à grumo sanguinis, à pituita, suppressa est, ipsa tum vesica vacua existente.

Vtero refrigerato calefacientia odorata conueniunt: maximi fit oleum de behen.

Vsus oleorum: vel solis utimur, vel permiscuntur vehementiora cum imbecillioribus: Eiusque quantitas est pro affectus & partis affectæ magnitudine. Tempus vero inunctioni conueniens est, ante cibum, præsertim vbi partes naturales afficiuntur.

De Linimentis & vnguentis.

C A P. XLV.

Linimenta & vnguenta sola consistentia inter se differunt, cum linimentorum liquidior, vnguentorum crassior sit. Linimentum ab illinendo dictum, mediæ est inter oleum & vnguentum consistentiæ: quod ipsis oleis, cum pertinacius adhæreat, efficacius est.

Sic vnguenta ab utendi modo, vel ab inungendo dicta eo, quod illita a tantum opem ferantur. Verum vnguenta, quæ in officinis habentur, cum vnguentis veterum non conueniunt:

*2. Aituar. 5.
method. 1.*

unt: siquidem officinarum vnguenta à veteribus olea composita fuerint dicta. Veteres enim sua vnguenta ex odoramentis confecerunt, cum hodie ex oleis veteribus, succis & cera componantur. Quare quemadmodum veterum vnguenta *μυρα* dicta fuere, sic recentiorū *μυράκοπα* dicenda.

Sunt autem vnguentorum non duo tantum genera, vt Icaſus libello de odoribus voluit; alterum deliciarum, quod *χρῦμα* seu *χρῖσμα* dicitur: alterum palæstris dicatum, quod *ἀλειμμα* cognominatur: Sed tria sunt, vnum ad luxuriam, alterum ad necessitatem, tertiū ad salubritatē. Ad luxuriā veterū Græcorum & Persarum in conuiujs secundis mensis inferantur, pili conuiuarum inungebantur, quæ de re Atheneus, cuius nomine à Solone diuendi prohibita, à Socrate meretricia dicta; quare vnguentarii apud Lacædemonios ciuitate expellebantur. Quæ vnguenta, etsi hoc seculo defierint, in ipsorum tamē locum & ambræ & moschus succedere. Ad necessitatē verō fuisse, quibus athletæ utebantur, corporibus post certamina iniunctis. Tertium genus eorum est, quæ ad valetudinem faciunt. Ad hæc genera tria, officinarum vnguenta neūtiq̃am referenda sunt, sed vt dictum, ad olea composita veterum, eo quod non solum ex odoratis, sed oleo, pulueribus, farinis, succis & cerâ conficiantur. Adiciuntur nonnunquam oleis, adipēs, butyrum, mucilagines, miscentur nonnunquam gummatâ & lacrymæ: quæ sanē materia non solum vnguentorum, sed & linimentorum existit, quibus aliquando & aquas stillatitias, & acerum & vinum ad-

misce-

b 4. de sani-
tat. tuend.

lib. 7. c. 17.

miscemus, animalium quinetiā excrementa, vt fel, quorum tamē omnium in linimentis ea proportio esse debet, vt ad oleorum vel succorum ℥ vi. vel ℥ j. specierum ℥ j. ceræ, vt & mellis, adipis, axungia ℥ ij. admisceantur. Si vero vnguentum conficere velis, olei partes quatuor pro vna aliorum ingredientium sumes. Habenda tamen est & temporis & vsus ratio. Temporis, siquidem vnguenta æstiuo tempore plus ceræ, hyberno vero minus requirāt: Vtus, sic interdum firmitus & diutius, interdum leuius partibus adhærere volumus. Quare consultius, vt componentis iudicio relinquatur. Galenus b tamen ceræ quartæ parti, resinæ duodecimam immiscet. Hac enim ratione vnguentum, quod optime parti adhæret, conficitur. Quæ etiam Oribasii in vnguento ex euphorbio, & Aeginetæ c fuit sententia.

Variant vero pulueres seu species pro diuersitate affectuum. Cera vero additur, quo conuenientem consistentiam acquirat. Pleraq; tamen ex solis pulueribus cum oleo mixtis, & tantillo ceræ, conficiuntur.

Exempla subiungamus:

Ad ventriculum frigida intemperie laborantem, eundemque adstringendum:

℥. Olei de absynthio, mastichini an. ℥ vi.
pulu. ros. rubear. rad. cyperi an. ℥ i.
ceræ q. s. f. linimentum.

Vel loco ceræ addatur cerati stomachici q. s. In diuitibus molchi vel ambrae gr. ii. odoris gratia addere possumus.

Ad vētriculum vero calidiorem & relaxatum:

℥. Olei

℞. Olei myrtillorum, cydonior. rosar. an. ℥. ℞.
pulu. coralli, rosar. rub. nucis cupress. an. ℥. ij.
cera q. s. f. linimentū, ante pastū illinendū.

Fiunt etiam ex foliis, floribus, seminibus, fructibus, radicibus in aliquo liquore, vel in vino, vel oleo per aliquot dies maceratis, quæ ad vini absorptionem coquuntur & exprimuntur. Id quod expressum erit, denuo cum oleo, succis, pulueribus & cera ad consumptionem succorum coquitur; Exemplum ad ventriculum intemperie frigida laborantem corroborandum & ad ventris dolores flatulentos:

℞. Cyperi ℥. i. rad. galang. ℥. ℞.
summitatum maiorana, origani, absynthii,
flor. chamom. anethi, meliloti an. m. j.
sem. anisi, baccar. lauri, iuniperi cōtus. an. ℥. ℞.
in olei suff. quantitate per dies duos vel tres macerentur, dein coquantur & exprimantur:
expresso adde olei anethini, chamom. ℥. ii.
pulueris nucis mosch. garyophyll. squinanthi,
an. ℥. ii.
flor. anethi, sem. anisi. an. ℥. j. ℞.
vini ℥. iij. vel. iij. cera q. j. coquantur omnia
ad consumptionem vini, & f. vnguentum.

Paratur aliquando ex oleis, adipe, mucilaginis, butyro, ut ad materiam frigidam contumacem pectori impactam:

℞. Olei chamom. lilior. adip. gallinae an. ℥. vi.
mucilag. sem. lini, & rad. altheæ extract. in aq.
chamomel. vel scabiose an. ℥. j. f. linimentum. Quod si vnguentum desideres, his adde vnguenti de althea ℥. ℞.

Conf.

Conficiuntur etiam ex oleis, succis & butyro,
vt in pleuritide:

℞. Oleor. violati, amygd. dul. rec. butyri rec.
non saliti in aqua violac. loti an. ℥. ss.
fiat linimentum.

Cuius loco vti possumus vnguento pectorali, vel
vnguento resumptiuo.

Alia fiunt ex gummatis & lacrymis, vt ad
splenis duritiem emolliendam:

℞. Ammon. in aceto fortiss. dissol. ℥ i.
adipis gallin. & anserini, medulla ceruin.
an. ℥. ss.
cum oleo lilior. vel de capparib. f. linimen-
tum.

Vel adiectis radicib. hoc modo:

℞. Rad. althea, ebuli an. ℥ i.
fol. ruta, ceterach. ling. ceruina, an. m. i.
sem. viticis ℥. ss.
coq. in suff. q. olei lilior. ad radic. perfectam
emollitionem. Dein omnia in mortario
contundantur, per setaceum mittantur,
& predicto linimento addantur, & fiat
vnguentum.

Ad vteri dolores & suffocationes:

℞. Sagapeni ℥ i.
dissol. cum oleo chamom. q. s. f. linimentum:
Vel, si maius, vnguentum addita cera, in
cuius fine moschi grana aliquot adde,
& pectini applicato.

Quod attinet vnguenta, quæ in officinis ha-
bentur, & certis corporis partibus accommoda-
tur, quædam horum sunt, quæ emolliunt & dige-
runt,

runt, ut est vnguentum de althæa, martiatum, Agrippæ. Quædam refrigerant & humectant, ut vnguentum populeon, rosatum: quod calidis affectibus & doloribus sedandis accommodatum. Quædã refrigerant & exiccant, ut vnguentũ albũ Rhasis: quod si cãphora addatur, magis refrigerabit & exiccabit. Vnguentũ e lithargyro fluxionib. reprimendis vtilissimum, quemadmodum & vnguentum comitisæ, quod etiam lumbis & ossi sacro admotum, pollutiones nocturnas cohibet: Vbi vero pubi & ventri inferiori, parte tam anteriore, quam posteriore, applicatur, sanguinem menstruum nimium fluentem cohibet. Sic certis partibus quædam accommodantur, ut vnguentum citrinum maculas faciei à sole mustas & impetigines tollit. Thoraci vero & pulmonibus dilatandis, vnguentum resumptiuum accommodatum, præferim si aliquid croci, obscuro capitis dolore existente, admiscetur.

Vnguentum e cyclamino seu de arthanita aluum vmbilico admotum soluit. Ex his cum prædictis materiebus linimenta, vnguenta, singulis partibus corporis idonea parari possunt. Habetur etiam vnguentum basilicon dictum, ad recentia vulnera curanda, & sordes amouendas accommodatum.

Ad capitis dolorem à causa calida, delirium sedandum, & somnum conciliandum:

℞. Vnguenti populeonis, cerati infrigidantis
Galenī an. ℥ j.

flor. nenuph. violar. an. m. j. ℔.

sem. papau. lactuce an. ℥ iiii.

P

succi

succi lactuca & portulacæ an. q. s. f. vnguentum.

quod fronti & temporibus, dolore intentissimo existente, admoneatur, & si à prædictis mitigari non possit, ad vnguenti ℥ i. opii gr. vi. admisceri poterunt.

Ad dolores tam calidos, quam frigidos mitigandos tale vnguentum à quibusdam præscribitur:

℥. Alabastris subtilissime pulueriz. per dies aliquot in fortissimo aceto macerati ℥ iij.
succi rosar. & chamomill. an. ℥ ij.
succi betonica & ruta an. ℥ i. ℞.
succi altheæ ℥ i.
olei rosati omphac. ℔ i.
cum cera alba. f. vnguentum, cuius ℥. ℞.
temporibus admoueat.

Ad vlcera capitis manantia ex incidentibus, attenuantibus, digerentibus & ex alto trahentibus conficitur tale: In pueris quidem:

℥. Succi rad. oxylapathi, enula, herbar. fumarie, scabios. an. ℔. ℞.
lythargyr. ℥. ℞.
axungie suille q. s. f. vnguentum.

Efficacius erit:

℥. Cerussæ lotæ in aq. scabios. lythargyr. cadmie gallarum perforatarum an. ℥ i.
cum aceto & fece olei veteris f. linimentum
vel cum oleo nucum & cera f. vnguentum.

Efficacissimum erit sequens:

℥. Rad. ireos vulgaris, bryonia an. ℥ ii.
fol. lepidii. m. i.

Coq.

Coq. simul ad perfectam radic. emollitionem, adde chalytidis ℥. ℞.

granor. iuniperi, nucum vstarum an. ℥. ℞.

argenti viui in aceto fortiss. extincti ℥ i.

olei iuniperini, laurini, de abrotano an. ℥. ii.

cum cera q. s. fiat vnguentum.

Addi possunt sulphuris in succo enulæ campænæ extincti ℥ iii. Nonnunquam cinnabaris ℥ ii. Fortius erit, si sublimati ℥ i. addatur. Quod si parti potentius adhærere velis, loco ceræ picem addito. Hoc vnguento in adultioribus vtendum.

Ad capillorum defluxum relaxata cute:

℞. Olei cydoniorum, myrtillor. an. ℥ i.

ladani ℥ ii.

acaciæ, hypocyssidos, aluminis an. ℥ i.

ceræ albæ q. s. f. vnguentum. Illinatur pars glabra.

Si vero à prauis humoribus radices capillorum erodantur, iis, quæ acrimoniam humorum attemperant, vtendum, vt oleo oliuarum vel amygdalarum dulcium, butyro recenti, lacte, oleo rosaceo simul mixtis.

Ad epilepsiam præcauendam:

℞. Sem. & rad. pæoniæ, rad. angelic. sem. nigell. Roman. folior. maior. an. roris. an. ℥ i.

olei nardini q. s. f. vnguentum, quo synciput & narium pars interior somni tempore inungatur.

Ad palpebras inflammatas:

P 2

℞. Mu-

℞. Mucilag. sem. cydonior. psyllii extract. in aq. rosar. an. ℥. ss.

vnguenti rosat. vel pomad. ℥ i.

f. vnguentum. In declinatione vero:

℞. Mucilag. sem. alth. fœnogr. lini in aq. fœnicul. extract. ℥. ss.

sarcocoll. in lacte muliebri nutrita ℥ i. ss.

aloes, myrrhæ, an. ℥. ss.

croci gr. iij. Misce.

Ad lacrymarum fluxum ex modice adstringentibus & siccantibus:

℞. Cortic. thuris, masticis an. ℥ i.

gummi tragacani hi, sarcocoll. coralli an. ℥ i.

tutia prepar. antimonii, boli armen. sanguin. draconis an. ℥. ss.

cum syrupo cydonior. f. vnguentum.

Sic in Aegypto:

℞. Plumbi pulueriz. masticis, sarcocoll. an. ℥ i.

alum. coralli, an. ℥. ss.

antimonii ℥ i.

succi solani & ceræ q. s. f. linimentum.

Si vero partes oris internæ vel labia sint exulcerata, parabuntur ex iis, quæ nec sapore nec odore nimium sint ingrata, vt pote ex melle rosato, addita farina hordei vel cicerum ad deterfionem.

Vel si maturare volueris:

℞. Syrupi de althea ℥ i.

passular. mundat. ℥ iij.

ficuum ℥. ss.

in mortario contusis, affunde syrup. q. s. ad formam vnguenti.

Sic

Sic linimentum ad fissuras labiorum conueniens erit vel ex pomada, vel ex oleo vitellorum ouorū.

Ad maculas post morbillos relictas ex radic. enulæ, oxylapathi, ireos, fol. veronicæ, scabiosæ, in sero lactis per aliquot dies maceratis, dein coctis, & per setaceum transmissis, additis farina fabarum, non excorticatar. farina lupinor. Addunt aliqui etiam therebinthinam in aqua scabiosæ lotam & cum oleo ouorum vel amygdal. amararum vel tartaro. f. vnguentum.

Ad genarum scabiem & vlcera:

℞. Vnguenti rosati ℥. ℞.
vnguenti albi Rhasis sine opio ℥ ij.
emplastri de cerussa in oleo ouorū soluti. ℥ i.
tutiae prepar. ℥ i. ℞.
Antimonii ℥. ℞. f. vnguentum.

Vel vngento citrino vtere.

Si vero pruritus sine partis vlcere immodico adsit, ex digerentibus, detergentibus & siccantibus parabitur, vt:

℞. Rad. oxylapathi, enula, an. ℥ ij.
radic. serpentar. minor. ℥ i.
in aceto ad emollitionem coquantur, dein
contundantur, & per setaceum traiciantur. Adde lithargyri. ℥ i. ℞.
axungie squilla, olei de frumento, tantum q. s.
f. vnguentum.

In affectibus thoracis à refrigerantibus & immodice exiccantibus abstinendum, si cū his respiratio impediatur. Sic in sputo sanguinis parabitur

℞. Thuris in lacte vel vino dulci nutriti, myrrha,
mastice an. ℥ i.

cineris cancror. ℥ j. ℞.

farin. fabar. ℥. ℞.

terebinthin. in aq. scabios. lota ℥ ij.

olei mastichini q. s. fiat vnguentum. Quod si maiore exiccatione opus, lythargyrium, vel trochisci de carabe, vel de bolo addi possunt.

Ad hepar, lienem, si tumeant, si scirrhus laborent, sitque laxandum vel emolliendum, perpetuo aliquid, quod adstringat, addendum. ut si hepatis intemperies sit calida, adstringentia frigida, ut est santaloni, corallus: Si vero intemperies frigida, calida, ut absynthium, spica nardi, cypereus.

Ad duritiem iecoris cum intemperie frigida:

℥. *Mucilag. sem. althea, fœnugr. lini, in aq. agrimonie extracta an.* ℥ j.

adip gallin. & anseris, an. ℥ ℞.

masticis ℥ ii.

pulueris absynth. ℥ i.

cum oleo liliorum, de absynthio & cera q. s.

f. vnguentum. Inunctionis tempore ad penetrationem & robur tantillum vini affundi poterit.

In intemperie vero calida:

℥. *Mucilag. semin. althea, lini extract. in aqua violar. an.* ℥ j.

adipis gallinae, anseris, an. ℥. ℞.

santali utriusque puluerizati, rosar. rubear. an. ℥ ij.

spica nardi (penetrationis gratia) ℥. ℞.

olei rosati & mastichini q. s. vsus tempore tantillum aceti addatur.

Sic

Sic in hydropo ab hepatis intemperie frigida caussata, vbi addenda sunt aperientia semina, flores, radices, succi, oleum nardinum, vinum maluatium : cauendo tamen, ne à nimium calefacientibus calor natiuus, qui superest, resoluatur, vt:

℞. Succi apii ℥ j.

ol. nardin. lilior. an. ℥ j. ℞.

aceti albi ℥. ℞.

coquantur ad succi consumptionem, adde gummi ammoniac. in aceto dissol. ℥. ℞.

rad. asari, santal. rub. an. ℥ j.

sem. apii. ℥. ℞.

cera q. s. f. vnguentum; prodest etiam vnguentum Agrippæ.

In lienis tumore scirrroso præter ea, quæ dicta sunt, vsurpari possunt succus cyclaminis, mercurialis, ebuli, sambuci cum farina lupinorum, semine lini, althææ, vino maluatico, oleis laxantibus, gummatibus, vt ammoniaco, sagapeno in aceto dissolutis; & sic resina abietis sola in formam vnguenti applicata idem præstare posset. Ad hoc valet vnguentum de arthanita minus, vnguentum martiatum.

Renibus æstuantibus ex oleo amygdal. dulc. violarum, adipe gallinæ, butyro recenti simul mixtis, vnguentum fit. Sic ad renes roborandos & nocturnam pollutionem, valet vnguentum comitissæ.

Si vero cum dolore calculus hæreat, vel arenæ in renibus & etiam vteribus, ex relaxantibus prædictis cum oleo scorpionum, & cera fit linimentum.

P 4

Sic

Sic intestinis infantum male affectis illinitur venter infimus oleo amygdalarum dulcium, anethino, chamomelino, & cum adipe gallinæ & cera fit linimentum, cui tantillum croci aut mithridatii admiscetur. Sic ad aluum emolliendam:

℞. Succī colocynth. ellebori an. ℥. ℞.
diagridii ℥. ℞.

cum felle taurino, & predictis farinis fiat
vnguentum vmbilico imponendum.

Hoc autem fortius est vnguentum de arthanita maius, quod in officinis habetur.

In dolore colico flatulento ex ol. anethino, chamom. puluer. garyophyll. piperis, spicæ nardi cum cera. Vel:

℞. Sapa ℥. ij.
sem. scenic. anisi an. ℥. ℞.
mithridatii ℥. iij.
cum pice, fiat vnguentum.

Addi potest & terebinthina, sic & oleum de castorio, laurinum, rutaceum, vel vnguentum Aragon applicetur.

Ad hæmorrhoidas si cum dolore, applicabitur vnguentum confectum ex vnguenti populeonis & rosati partibus æqualibus, vel cerati refrigerantis Galeni, vt:

℞. Olei violati, de papau. de cucurbita, an. ℥. ℞.
vnguenti rosati ℥. vj. f. linimentum.

Si vero durities adsit, ex mucilag. sem. lini, altheæ in aq. violæ extractis cum adipe, vel additis oleo lilior. vel decoquantur radices liliorum altheæ, passul. ficus in lacte vel oleo. Adduntur folia verbasci, quæ simul contusa transmittuntur per setaceum,

ceum, & applicantur. Si nimius eorum sit fluxus, vnguentum comitissæ vsurpetur.

Ad fissuras ani ex oleo rosac. violaceo, nenupharino cum vitello oui ad sedandum dolorem; Quo sedato, vnguentum ex cerussa in aqua solani lota, & pomada addito lithargyro f. linimentum. Vel ex terra sigillata, addito succo sedi maioris, simul in mortario plumbeo mixtis, f. linimentum.

Vtero frigidiores post fomenta & infusus linimenta cum oleis & pulueribus conficiuntur, vt ad nimium mensium fluxum:

℞. Boli arm. sang. draconis an. ℥. ss.
nucis cupressi, thuris, mastice, an. ℥ j.
sem. plantag. portulac. flor. rosar. rubear. an.
℥ j. ss. cum vnguento comitissæ loco cere.
f. vnguentum lumbis & hypogastrio
applicandum.

Possunt etiam pulueres prædicto succo excipi consolidæ maioris, plantag. album. ouorum & oleo rosato.

Sic ad abortum propter laxitatem ligamentorum impediendum ex vnguento comitissæ cum puluere nucis cupressi, mali citrii, thure, mastice, & oleo myrtillorum, vel rosac. omphac. & cera f. vnguentum.

In morbo articulari in initio dolore urgente, parte calente & rubente, ex mucilag. sem. psyllii, cydonior. in aq. solani extractæ, cum cerato refrigerante Galeni, f. linimentum. Si vero tantus non sit calor:

℞. Olei violar. & rosac. an. ℥. i.

P

S

croci

croci ℞.

camphor. gr. ij.

vitellos ouor. numero iii.

f. linimentum.

In crudelissimis vero doloribus ipsis anodynis ad-
di potest nonnihil opii. Sic ad vlcera varia in offi-
cinis vnguenta habentur, vt ad virgæ vlcera, vn-
guentum rubeum camphoratum. Ad ambusta &
erysipelata, vnguentum album camphoratum.
Ad tibiaram vlcera & erysipelata vnguētum dia-
pompholygos. Ad vlcera, scabiem & adustionem,
vnguentum album. Ad vulnera glutinanda, vn-
guentum aureum. Ad vlcera antiqua extergenda
& fistulas, vnguentum Ægyptiacum, vnguen-
tum Apostolorum, & pro re nata à Medico præ-
scribi possunt, & qui volet, vnguentorum ca-
talogum amplum apud Nicolaum Myrepsium d
inueniet.

d sect. 3.

e Oribas. 10.
coll. 27.

Vnguentorum potissimum vsus est e in iis par-
tibus, quibus cataplasmata applicari non possunt,
nec madefactioni locus est, vt sunt, palpebræ,
aures, nasus totaque facies: & iis partibus, quæ
multum mouentur, feruidis inflammationibus,
quæ erysipelatis naturam referunt, tentantur,
cum in illis consistere non possint: Hæ vero ab
illis irritantur: cutis exulcerationibus, quæ à ca-
taplasmatibus aggrauantur. Sic denique laxos
tumores aliaque multa inungimus. Hæc
de linimentis & vn-
guentis.

De

De Ceratis.

CAP. XLVI.

CEratum, siue cerotum, *Κηρωτόν*, Galeno, quod magna ex parte cera constet, vel à cera & oleo nomen habet, & à Græcis, referente Galeno *a*, emplastrum & malagma, ab Ægineta *b* *μυρμαχόπον* vocatum: Medicamenti genus est ex oleis, gummatibus, succis, aliisq; simul cera vnitis constans: consistētia inter vnguentum & emplastrum medium: Illo enim solidius: hoc vero minus, quamuis non semper eadem sit forma, cum aliquando humidius, aliquando siccus fieri possit.

Horum materia eadem est, quæ linimentorum & vnguentorum vtpote cera, propolis, pix, resina, adeps, oleum & pulueres. In quorum mixtione proportio seruanda, quæ ex Galeno *c* in cerati rofacei descriptione colligitur; vt tripla vel quadrupla proportio sit olei ad ceram, & tale ceratum Galenus *d* humidum vocat, e.g. Si olei ζ ij. sint, ceræ sit ζ . β . resinæ ζ ij. pulueris vel specier. ζ ij. vel ζ iij. additur resina, vt tenacius parti adhæreat, & diutius, quod ex Galeno *e* colligitur, in quem etiam finem forma hæc inuēta. Omnium autem accommodatissima resina est terebinthina, aut larycea.

Sunt autem duplicia: alia enim sunt vere cerata; alia vero minus proprie; & à similitudine sic dicta, quæ præter oleum & ceram, herbas & alia recipiunt: Proprie enim dicta cerata ex cera & oleo componuntur.

Rursus

a 7. de comp. pos. secundum gener. 5.
b lib. 7. cap. 20.

c de comp. secundum genera 2.

d 10. meth.

e 1. de comp. med. secundum genera 12.

Rursus quædam in officinis parata habentur, quædam pro voluntate Medici conficiuntur: siquidem quædam parata habere oportet, vt sunt ea, quæ vetustate vires non amittunt, vt sunt calida, quale est stomachicū, vel quæ certo anni tēpore tantum confici possunt, vt est Oesypi. Vel quæ difficilius parantur, & per otium confici debent: alia enim parata seruanda non sunt, vel parua solum quantitate, cuiusmodi est ceratum album vel infrigidās Galeni. Vel si paratum sit, quādo in vsum reuocabitur, aqua frigida lauandum, vt magis refrigeret.

f cerata varia
habet
Myrrep. sect.
30.

In officinis f. vſitatissima sunt, ceratum stomachicū, quod ventriculi intemperiem frigidam corrigit, inflationem discutit, cōcoctionem adiuuat. Ceratum santalinum proprie ad hepatis intemperiem calidiorem: ceratum album vel infrigidans Galeni ad partes quascunque nimium incalefactas, capite quidem, ipsa tempora, in febribus ardentibus, & hepar, & spinam dorsi inungendo. Quod tamen magis refrigerabit, si quid camphoræ addatur: vel si lauetur aqua aliqua refrigerante, vt endiu, cichor. Sic etiam vbi præter refrigerationem adstrictione opus est, eius vſus esse potest, si misceatur aliquod resoluens, valebit ad partes contusas, ad contumaces dolores. Ceratum matricale, etiam habetur, & creatum ad rupturam Guidonis, cuiusmodi etiam est ceratum de pelle arietina Vigonis.

Quod si vero recentia præscribere lubeat, eadem erit materia, vt in febribus ardentibus & affectibus capitis calidioribus:

℞. Vn-

℞. Unguenti populeonis & rosacei an. ℥. ss.
lauentur in aq. nymphaeae, adde mucilaginem sem.
psyllii, cydonior. sem. papau albi contus. an.
℥ i. ss.
cum cera q. s. fiat ceratum.

In phrenitide vero & grauissimis affectibus, vi-
ribus adhuc constantibus:

℞. Cerati predicti ℥ i.
opii gr. iiii. vel v. misce.

Ad ventriculum corroborandum in alui pro-
fluio:

℞. Carnis cydonior. (nonnulli solam carnem
cydoniorum applicant.) mastice, an.
℥ ss.
pulu. coralli rubr. rosar. rubear. myrtillor. an.
℥ ii.
cum oleo cydonior. q. s. & terebinthina pauca
fiat ceratum.

quod extensum super alutam mollem & tenuem
ad formam scuti ventriculo applicatur: verum ci-
bi tempore remouendum. Quod si maiore opus
sit adstrictione, bolus arm. addi potest. In liente-
ria, carni cydoniorum & mastici, cerati stomachi-
ci portio addi poterit, cum oleo nardino, vel de
absynthio, vel de mentha, vel mastichino.

Hepate refrigerato, vt in hepatica fluxione:

℞. Cerati santalini & stomachici, an. ℥ i.
olei de absynthio q. s. fiat ceratum, quod sto-
macho ieiuno applicetur.

Splene indurato:

℞. Ammoniacy in aceto forti soluti ℥ i.
olei de capparibus, liliorum albor. & cera q. s.
fiat

fiat ceratum, quod super corium instar
linguæ bubulæ oblongum extendatur.

Ad dolores & inordinatos motus vteri:

℞. Galbani in aceto dissoluti q. s. extendatur
sub alutam.

Vel adde puluerem arthemisiæ & matricariæ, &
bdellii parum. f. ceratum hystericum forma fere
triangulari, cuius apici pubem spectanti moschi
gr. ii. vel iii. addantur.

Ad dolores articulorum à causa calida & ini-
tio fluxionis:

℞. Mucilag. sem p syllii, cydonior. extract. in
aceto, an. ℥ i.
olei violati & rosati an. ℥. vi.
cum cera in oleis liquata. fiat ceratum.

Si à causa frigida ad digerendum, fluxionem
arcedam, partes roborandas:

℞. Mucilagin. sem. lini, fœnugr. althea in aq.
chamæpyt. & aceto forti extractæ an. ℥. ℞.
farin. lupin. sem. lini, pulu. lumbricor. terrest.
an. ℥ i. ℞.
ol. vulpin. lumbric. an. q. s. ol. de croco pa-
rum, cum cera sufficiente, fiat ceratum.

Ad dolorem coxendicis ex oleo rosar. de man-
drag. cum gummi opopanace, sagapen. resina,
cum cera, fiat ceratum.

Ad gonagram:

℞. Flor. chamomel farin. fabar. fursurum. an. ℥. i.
stercoris caprini ℥ i. ℞.
decoctis in oxycrato cū oleo anethino f. ceratū.

Ad tumores tophaceos:

℞. Ammoniac. in aq. chamæpyth. soluti, pingued.
veteris ℥ i. cum

cum oleo lumbricor. & cera q. s. fiat ceratum.

Præstantius fiet, si in aqua vitæ & saluæ lauentur omnia.

Fiunt etiam cerata ex emplastris, in oleo conuenienti dissolutis, quando scilicet pars affecta emplastri duritiem ferre nequit, vt ad tumorem articulorum discutiendum, vbi iam dolor sublatu-
tus est:

℞. Emplastri de meliloto, diachyli, ireati, an. ℥ i.
pulueris hermodactyl. chamæpyth. lumbricor.
an. ℥ ss.
olei irini vel chamemelini q. s. fiat ceratum,

De Emplastris.

C A P. XLVII.

EMPLASTRA, ^{ἐμπλάστρα} Græcis, videntur dicta ea
medicamenta, quæ linteis ^a expansa, vel pelli-
bus tenuibus inducta imponuntur, quo tenaciter
corporis partibus adhæreant. Quare à materia <sup>a Actuar. 5.
meth med. 1.</sup>
emplastica & glutinosa nomē habent, cuiusmodi <sup>b De mate -
ria emplastr.</sup>
est cerussa ^b, pompholyx, cadmia, calx lota, bolus,
armen. terra sigillata, creta, amyllum, cera, & præter <sup>vide Aegin.
lib. 7. c. 17.</sup>
hæc quædā, quæ & vnguentorū & ceratorum cō-
positionem ingrediuntur, vt sunt lacrymæ, resinæ,
pix, terebinthina, mastiche, ladanū & similia vi-
scosa. Quædam etiam alia, vt pulueres, quæ nihil
viscidi licet habeant, viscosis tamen & glutinosis
vniuntur. Ipsorum enim consistentia solidior
est & durior, quam sit ceratorum, quam à
prædictis nanciscuntur, præsetim à creta, ly-
thargyro, (quod materia emplastrorum à Galeno
dici-

dicatur) gummi aut omnibus simul permixtis, quibus oleum, adeps, quo pulueres apte cohæreant, & parti recte admoucantur, adduntur.

Sunt autem duplicia: alia coctura fiunt, quæ vera sunt pharmacopœorum emplastra; alia sine coctura fiunt, sed incorporantur mucilagine aut pane aut farina, ut est emplastr. de cructra panis, quæ non vera sunt emplastra.

Differunt etiam vel ratione partis, cui applicantur, vel ratione effectus, ut sunt cephalica, ut de betonica, de gratia Dei, stomachica.

*vide Cels.
lib. 5. c. 17.*

Compositionis *c* autem ratio & ordo talis est:

Cera in oleo liquenda, lythargyrum in mortario terendum, oleum sensim affundendum & cum eo decoquendum. Adduntur plantarum succi conuenientes, vel alii liquores, ut vium, acetum, aq. vitæ, quæ quidem ad consumptionem vsque liquorum simul coquuntur; Postmodum adeps, gummata, resinæ permiscuntur, vel, per se, vel aliquo liquore soluta. Tandem terebinthina cum opus est, infunditur, quibus simul subactis & agitatatis, pulueres adiiciuntur, ubi legitimam cocturam nacti fuerint, & ad conuenientem permixtionem semper mouendum, vsque dum in massam abeant, ex qua, manibus oleo lilior. aut amygdalarum inunctis, subacta fiunt magdaleones, quibus nonnunquam odoris gratia moschus & ambra, resolutionis gratia crocus additur, quæ ignis vim non ferunt. Deligi vero debent in compositione ea, quæ magis affectui conueniunt.

Notandum, diutius decoquenda ea, quæ multa humida recipiunt, vel succos, vel acetum, vel aquam

quam, quia humiditas illa contraria est viscosis, & adhæſionem impedit.

Tempore etiam variat coctura. Aestate enim magis coquuntur, vel olei minus additur, ne ob humiditatem nimiam diffuant & calore soluantur. Hyeme minus coquuntur, quia ipsorum consistencia dura, aeris frigiditate conseruatur.

Simplicior emplastri forma est, cum omissis glutinosis & viscidis, plus ceræ cum oleo liquatur, vt pulueres excipiat. Fiunt etiam ex farinis, succis, pulueribus, mucilaginibus, absque cera. Oportet enim Pharmacopœum emplastra reponere, partim, quod quædam magno artificio parentur; quæ si iis egeamus, non ita cito recte parantur: partim quod quædam tantummodo certis temporibus conficiantur, vt sunt emplastra ex succis herbarum. Accedit etiam, quod emplastra non facile antiquitate corrumpantur. Sunt autem emplastra communiter in officinis vsitata, diachylon simpl. quod tumores duros emollit & discutit. Idem præstat diachylon magnum, quod potentius est, è mucilagine seu diachylon compos. ad idem valet; verum etiam abscessus maturat. Sic etiam emplastrum de meliloto, quod omnes dolores hepatis, lienis, ventriculi lenit, sic etiam tumores emollit & discuit. Emplastrum diuinum mollit etiam, doloribus frigidis thoracis, scapularum medetur.

Oxycroceum, ab aceto & croco dictum, mollit, discutit, lenit, dolores iuncturarum, & quæ circa periostium sunt, tollit. Emplastrum contra rupturam, adstringit, repercutit, fluxiones intercipit.

Q

De

*Emplastrorum
catalogum
vide apud
C. Celsum
lib. 5. c. 19.
Aegin. l. 7.
c. 17.*

De mastiche digerit, exiccat, quate & fluxiones sistit. De crusta panis in vomitu puerorum, quod diu conseruari non potest, nisi ceram addamus, & olei mastichini dohn augeamus.

E baccis lauri dolores à causa frigida cuiuscunque partis, & à flatibus mitigat. Quod ad hydro- pem quoque valet, si ster- cus caprinum addatur & cyperi radix triplicetur.

Empl. de ranis seu de vigo cum Mercurio ex ℥ iiii. hydrargyro pro libra, quascunq; durities emollit & resoluit; potentius id facit, si hydrargyrum in dupla dosi sumatur. Quod etiam quarumvis partium dolores, thoracis & abdominis exceptis, lenit.

De cerussa partes exulceratas exiccat & lenit. Sic emplastrum album coctū exco- riat, à calceamentis, opitulatur. Triapharmacum carnem in vulneribus regenerat, & ea consolidat. Apostolicum ad vulnera, ad neruos præcisos, morsus animalium putredine ablata concauitates carne replet, & cicatricem inducit. Sic emplastrum basilicum, vlcera inflammatione carentia, præsertim partium neruosarum abstergit, & carne replet. Ex his ergo vel per se, vel pro ratione partis affectæ, vel morborum complicatione cum oleo liquatis, & incorporatis fiunt emplastra.

Ad diuturnos & graues capitis dolores ab humore frigido:

℥. Empl. de betonica ℥ iiii.

pulueris beton. cyperi, ireos florēt. nigel. an. ℥ iiii.

picis liqu. q. s. misce, capite raso applicetur.

Poterit etiam hoc pacto recens parari:

℥. Fur-

℞. Furfuris ℥ iij.

salis ℥ B.

bulliant cum sapa, leni ebullitione ad consistentiam.

Vel hoc pacto:

℞. Olei omphac. ℔ B.

olei rosacei ℥ j. B.

vitellos ouor. numero vj.

misceantur simul in sartagine super cineres calidos ass. due moriendo, adde farine hordei, amyli, an. ℥ ij.

cro. i ℥ j. B. f. emplastrum.

Exemplum in dolore lateris declinante:

℞. Empl. de meliloto, de mucilag. an. ℥ B.

olei liliorum albor. & picis q. s. f. emplastrum.

Ad hepatis tumorem durum emolliendum:

℞. Emplastri diachyli simpl. & de meliloto an. ℥ B.

pulueris absynth. cyperi, nardi, an. ℥ ij.

cum oleo de absynth. f. emplastr. quod he-

pati admoueat.

Ad lienis duritiem:

℞. Ammoniaci in aceto acerrimo dissoluti ℥ B.

puluer. ceterach. ℥ iiii.

emplastr. de mucilag. de meliloto, an. ℥ B.

olei de capparib. q. s. f. emplastrum, quod lien applicetur.

Ad alui profluuium:

℞. Rad. cyperi, cortic. mali granati, nucis cupressi an. ℥ B.

sanguin dracon. boli armen. terre sigillat, coralli vtriusq. rosar. rubear. an. ℥ iij.

Q 2

puluer.

pulueriz. omnibus, excipiantur mucilagin
gummi tragacanthi & sem. cydonior. ex
tract. in vino austero, cum sufficiente farina
na hordei assata, & f. emplastrum.

quale etiam ex succis adstringentibus, plantagin
bursæ & virgæ pastoris, centinodiæ, berberis, gra
nator. malor. pyrorum constringentium confici
potest. Additis pulueribus prædictis, cum farina
auenæ & hordei.

Ad fœtum continendum.

℥. Terra sigillata, boli armena, in aq. rosar. lota
an. ℥. j.

masticis, sanguin. dracon. an. ℥. ℞.

radic. bistortæ, balaustiar. gallar. nucis cupress.
an. ℥. j. ℞.

vnguenti comitissæ & ceræ, & olei myrtillor.

an. q. s. f. emplastrum, lumbis potissi
mum admouendum.

Ad gonagram siue genuum tumores cū dolore:

℥. Stercoris caprini ℥. j. ℞.

bulliant cum oxycrato & sapa ad debitam con
sistentiam, ol. cham. anethi an. q. s. f. empl.

Ad coxendicis dolorem:

℥. Empl. diacalciteos, vnguenti desiccatur. rubri an.
℥. ij.

empl. keyronii, diachyli simplic. an. ℥. j.

styrac. calam. thuris, mastic. an. ℥. ℞.

flor. chamomel. meliloti, camepyt. pulueris. an.
℥. j.

incorporentur simul omnia cum ol. chamomel.
& irino.

Ad antiqua vlcera parabitur emplastr. de plum
bo vocatum.

℥. Ly-

℞. Lytharg. aurei ℥ iiij.

plumbi vsti. ℥ ij.

tutia preparata ℥ j.

minii ℥ i. ℞.

cerussa ℥. ℞.

olei ros. ℥ viii.

cera nou. ℥. ij. f. emplastrum, quod parentis

nei fuit, à nemine haecenus descriptum.

Ad partes contusas ex casu ab alto parabitur sic:

℞. Boli armen ℥ i.

sanguin. dracon. ℥. ℞. qua pulverizata excipi-

enda oleo rosato & album. ouor cum tan-

tillo aceti, quod initio ad fluxionem

impediendam, applicandum.

Fluxione vero sedata:

℞. Gummi sagapen. in aqua chamom. dissol. ℥ ii.

thuris, masticeis an. ℥. ℞.

farin hordei fabar. an. ℥ ii.

pulu. meliloti, chamomel. ireos florent. an. ℥ i.

olei chamom. & irini q. s. cum cera noua f. em-
plastrum.

Quod si vero ex vnguento emplastrum confi-
cere velis, resinam, picemque addes, vel minus o-
lei & plus ceræ.

Vsus: Valent ad roborandum & siccandum,
humores impactos digerendos, cōtumaces tumo-
res molliendos, concoquendos. Ab his, vbi refri-
geratione opus est, abstinendum. Quando autem
emplastris in officinis vsitatis vti volumus, si vel
antiquata sint, vel exiccata, malaxari debent, hoc
est, emolliri, vel in aqua calida, vel cum oleo, quo
lentescant, emolliantur, & recte parti adhæreant.

De Telis emplasticis.

CAP. XLVIII.

EMplastris succedunt Telæ emplasticæ, quæ
 & easdem vires cum emplastris obtinent, &
 pro partis affectæ magnitudine conficiuntur, &
 ratione effectus variant; siquidem aliæ digerant;
 aliæ expurgent; aliæ adglutinent; aliæ cicatricem
 inducant. Confectionis hic modus est; Telam ve-
 rustate detritam, minime tamen laceram, materiæ
 emplasticæ, posteaquam coctione legitimam cō-
 sistentiam acquisiuit, immergunt, materia hac in-
 sectam extendunt, quo refrigerata induretur,
 tandem obuolutam in vsum reponunt, e.g.

℞. Olei ros. ℥ iiij.

ol. chamom. ℥ ii.

ranas virentes numero iii.

flor. chamom. melilori an. ℥ ii.

vini odorati cyath. i.

coq. ad vini consumptionem, colentur per se-
 taceum, adde ceræ ℥ ii.

cui mixtioni tela immergatur, cuius vsum sit
 ad digerendum, resoluendum, dolores podagri-
 cos leniendos.

Vel hoc pacto ad molliendum & digerendum;

℞. Olei communis, axungie suillæ liquat. lythar-
 gyrii, an. lb. ss.adipis arietis, picis naualis, ceræ virgin. an.
 quart. j.

simul lento igne coquantur, quibus idoneam
 consistentiam nactis, tela tam diu immer-
 gatur, vsque dum vtrinque sit imbuta.

Hoc

Hoc modo etiam paratur, quod Chyrurgi spatrapum vocant, cuius compositio talis est:

℞. Farina volatilis, thuris, mastice, boli arm. picia,
an. ℥. ii.
adipis aut seui arietini, cera alb an ℔. ℞.
cera & seuo liquatis, reliqua addantur. & tela
sepius immergatur, cuius vsus est in
fracturis.

Paratur etiam ad modicè refrigerandum & ex-
iccandum hoc modo:

℞. Olei communis ℔. ℞.
ceruss quart. j.
lythargyr aur. an. ℥. j.
myrrha, ℥. ℞.
camphora ℥ i. misce.

De Cataplasmatibus.

C A P. XLIX.

Cataplasma medicamentum est molle, & consis-
tentia mediocre, quod repellendo, concoquendo, digeren-
do, resoluendo, laxando, vacuando, detergendo, calfaci-
endo, siccando, refrigerando, dolorique sedando adhi-
betur. Quare variæ sunt cataplasmatum vires, va-
riique vsus, cum non solum ex materia valde di-
uersa componi, sed etiã partibus variis ad moueri
possint. Et licet apud antiquos magna ex parte ex
melle & resina, terebinthina, aut ex vtrisque prius
coctis, fuerit confectũ, cui medicamenta vel sicca
inspergebantur, nec præterea coquebantur, vel inco-
cta essent: sepiissime vero & ex pane, oleo & farina,

Oribaf. 9

coll. 24.

b. lib. 2. ad
Glauc.

250

Cassari Bauhini

vt videre est apud Galenum b. Tamen materia sunt plantarum partes, vel decoctæ, vel in puluerem redactæ, vel earundem succi extracti, deinde furfures, farina, mica panis, lacrymæ, resina, adipēs, axungia, bolus armen. terra sigillat. olea, vnguenta, cerata, emplastra cum oleo soluta.

Iam vero cataplasmata alia a sine aqua, alia sine decoctione, & alia cocta parantur. Quæ non decoquuntur, pinfa ab Oribasio c nominantur, quorum apparatus terminus est, vt valde læuigata & in vnum coacta sint, ne inquinent, nec etiam defluant. Coctis vero non est statutus terminus, vt non inquinent.

d de cata-
plas. ex pane
vide Orib. 9.
col. 26. quæ-
admodum
E de aliis
ad libri fi-
nem usque
Act. tetr. 1.
ser. 3. c. 177.
Myreps. sect.
29.

Cataplasma simpliciter anodynum paratur e mica panis d decocta in lacte:

℞. Mica panis ℥ iiij.

macerati in lacte, deinde decoque, semper a-
gitando, additis tribus vitellis ouorum,
croci ℥ j. f. cataplasma,

quod magis erit anodynum, si in lacte caprino decoquatur. Quod si calor vrgeat, addi poterit oleum rosatum, vel de papauere. Intensiore vero calore oleum de mandragora, vel hyoscyamo. Sunt qui vnguentum rosatum addant. Dolo- re intensissimo existente, ad cataplasmatiss ℥ ii. opii gr. vi vel viii. addere possumus.

Ad refrigerandum & fluxionem sistendam:

℞. Farinæ hordei. fabar. lentium an. ℥ j.

decoq. in oxycrato, adde mucilag. sem cydo-
nior. psyllii extract. in aqua rosar. ad
℥ ij.

vitellos ouor. numero ii. f. catapl.

Vel

Vel ex succis refrigerantibus & adstringentibus,
vt polygoni, plantaginis, semperuiui, solani, cum
earundem aquis & farinis supra nominatis.

Ad dolores à causâ frigida ex calefacientibus,
discutientibus & laxantibus:

℥. Rad. enulæ, altheæ, lilior. an. ℥ i.
folior. thapsi barbati, absynthii, rutæ, flor.
chamom. meliloti an. m. j.
sem. anisi, fœniculi, dauci, baccar. lauri,
iuniperi contusar. an. ℥. B.
coque in vino vel hydromel. ad perfectam
emollitionem, contundantur in morta-
rio, per setaceum traiciantur: Adde olei
anethini, chamom. rosac. an. ℥ iij.
sape ℥. ij.
cum farina lupinor. f. cataplasma.

Quod si dolor latus afficiat, ex emolliētibus &
resoluentibus, vt decoct. maluæ, alth. violar. flor.
chamom. meliloti, sem. lini, cum farina hordei, &
oleo lilior, vel si æstus adsit, oleo violato, cataplas-
ma paratur.

In nephritico dolore à calculo seu vrinæ are-
nulis, pituita crassa, grumo sanguinis, quemad-
modum si hæc eadem in vesica subsistant, & vri-
nam supprimant, parabitur ex parietaria, vel sola,
vel cū hederâ terrestri, quæ frigenda sunt in buty-
ro, & parti applicanda. Vel decoquenda in lacte
yna cum laxantibus, malua, althea, violaria, semi-
nelini & fœnogræci cum butyro & oleo amy-
gdal. dulc. Potentius erit, si folia anagallidis, a-
quat. nasturtii, raphani & eius radix addantur. In
primis vero proderit, si oleum de scorpionib, ipsi
decoctocolato addatur,

Emollientia cataplasmata, quæ tumoribus seu abscessibus duris applicantur, fiunt ex materia emolliente, vt radicib. alth. liliorum, foliis quatuor herbarum emollientium, sem. fœnugr. lini, quæ vel in aqua, vel oleo communi decoquantur, materia cocta contunditur. Deinde adduntur adipēs, axungie, mucilagines, nonnunquam & gummata, vt ammoniacum, opopanax: Sic & vnguenta emollientia, vt est de meliloto, vel martiatum, vt:

℞. Rad. altheæ, lilior. an. ℥ iij.
herbarum emollientium, an. m. j.
ficuum concisurum nr. vj.
sem. alth. fœnogr. an. ℥ j.

(quod si incidendum & attenuandum sit, propter frigidos & contumaces humores, addi poterit radicem bryoniæ, ireos an. ℥ j.) coq. in s. q. aquæ ad perfectam emollicionem. Deinde per setaceum transmittantur, adde farinæ sem. fœnogr. lini, an. ℥ i. B. axungie suille q. s. cum oleo lilior. f. cataplasma.

Emolliens vero & resoluens tale erit.

℞. Rad. alth. lilior. ireos, an. ℥ i.
herbar. violar. malu. an. m. i.
parietaria, verbasci, absynth. an. m. B.
ficus numero iij.
sem. fœnug. lini, an. ℥ B.
flor. meliloti, chamom. an. p. ii.
coq. vsque dum mollescant omnia. contusis
& cribratis adde farinæ lini ℥ ii.
axungie porci. ℥ i. B.
olei chamom. q. s. f. cataplasma.

Quod si dolor etiam vrgeat, vitelli ouor. numero ii. vel. iii. cum croci ℥ i. addi poterunt.

Ad

Ad maturandum & suppurandum paratur ex emollientibus, digerentibus omiffis, vt:

℞. Rad. lilior. ℥ ii. alth. ℥ i.

ficuum concisar. numero iiii.

coctis ad perfectam emollitionem, contusis & traiectis, adde mica panis albiss. vel farin. eriticea. ℥ ii.

butyri recent. non saliti, axung. suill. an. q. s. f. cataplasma.

Quod si abscessum sponte rumpi velimus, superiori cataplasmatibus parti, fermenti ℥ iii. vel iiii. apponantur.

Digerentia fiunt ex farinis lupinor. fabar. hordei coctis in aq. & vino, adduntur pulueres flor. chamom. meliloti, semin. lini, fœnugr. radic. ireos cū oleis resoluentib. chamomel. anethino, irino.

Sic ad anginam digerens tale:

℞. Vnguenti dialthea, ℥ iiij.

olei lilior. albor. ℥ iiij.

stercor. hirundin. vel gallinae vel canis. ℥ vi.

f. cataplasma.

Ad fluorem alui sistendum ex decocto rosar. rubear. balaustrarum, psidior. plantag. vtriusque, polygoni, equiseti, bursæ pastoris cum farina fabar. & oleo cydonior. myrtillorū, mastichino, decoctis prius herbis & florib. in vino adstringente.

Sic ad lumbricos paratur cataplasma ex absynthio & felle bubulo in sartagine frixis, vel etiam addita farina lupinorum, oleo absynth. & sem. fantonici, applicatur ipsi vmbilico.

Verū in communi compositione hæc proportio vt plurimum obseruatur, vt herbarū pars vna, fari-

facinarum dimidia oleorum & adipum pars quarta sumatur.

9. coll. 24.

Vsus: Et si cataplasmata potissimum inflammationibus conueniant, quæ neq; madefactiones neq; emplastra apte recipere queunt, eo, quod delicatiores sint, quam vt horum applicationem ferant, vt ex Antyllo Oribasius docet; attamen ad dolores leniendos, tumores concoquendos, materiam digerendam, flatus discutiendos, inflammationes sedandas, fluxus sistendos vtimur. Applicantur autem partibus, materia cataplasmatibus supra pannum lineum aut stupam cannabinam expansa, & parti plus minusve calida imponuntur.

De Pultibus.

C A P. L.

Pultes à cataplasmatibus parum differunt, & potissimum ex farinis, scopo accommodatis & oleis conficiuntur.

*a Act. petr.
1. ser. 1.
b Trallian.
l. 8. c. 8.
c Aegin. l. 7.
c. 5.*

Sunt autem duplices: Vel enim intro sumuntur, vt *cibus a*, vel vt alimentum *b* medicamento-
sum, vel vt *c* medicamentum, de quibus sermo non
est: Vel foris ad tumorum concoctionem appli-
cantur. Vt, ad suppurandum paratur ex farinæ tri-
ticeæ lb. β. coctæ in aq. additis olei chamom.
℥ iij. Si magis emollire velis, lilior. si æstus miti-
gate, violarum. Ad discutiendum vero ex farin.
sem. scænogr. lini, fabar. hordei, cicerum, cum hy-
dromelite mixtis, addito oleo chamom. vel adipe.
Ad adstringendum vero, vt in alui fluore, ex
ori-

orizæ torrefactæ ℥ ij. farinæ lentium ℥ iii. in aq.
rosar. vel aceto vel vtrisque mixtis, coctis, ventri
inferiori applicantur.

De Fomentis & fotibus humidis.

CAP. LI.

FOmenta duplicia a sunt: Alia humida, alia sic- ^{a Oribas. l. 1.}
ca: quibus frequenter utimur, antequam vel ^{synops 25. &}
cataplasmata, vel vnguenta applicemus, idq; eam ^{9. coll. 21. ex}
ob causam, quo cutis pori a referentur, & facile ^{Galeno qui-}
perspirabiles reddantur, partes relaxentur, & via ^{dam & Ae-}
q. aliis remediis paretur. Variant autem ratione ^{tio. tetr. l. 1. ser.}
effectuum. Alia enim ad calefaciendum, digeren- ^{3. c. 175.}
dum & roborandum præscribuntur, ut in contu-
maci capitis dolore ab humore frigido causato:

℥. Betonic. saluie. maioran. stoechad. origani, hys-
sopi siccorum an. m. i.
radic. cyperi ℥ j. ℞.
sem. fœniculi, anisi, an. ℥ i.
flor. chamom. meliloti an m. ℞.
coq. in lixiuio, addendo agarici in nodulo liga-
ti ℥ ℞.
(hermodactyli etiam addi possunt) colentur pro
fotu capitis, capillis deconsis applicatur
cum spongia.

nonnunquam penetrationis causa, & ut calor
excitetur, aquæ vitæ ℥ ℞. addunt.

Alia refrigerant & humectant, simul etiam do-
lorem leniunt, ut in febribus ardentibus:

℥. Rosar. violar. nenuph. lactuca, cucurbita, sem-
peruiui, an. m. j. ℞.

Valde

(Valde vero urgente dolore, tantundem seminis hyoscyami albi addi potest) decoq in aqua, sub finem tantillum aceti affundatur. Addi etiam potest camphora ℥. ℞. Hoc decocto caput cum linteo eidem immerso fouendum est; & caput oleo conuenienti inungendum.

Ad dolores lateris in initio, Hippocrate docente, fofus applicari potest ex anodynis, vt:

℞. Malua, violar. althea, an. m. j.

sem. lini. ℥. j.

flor. chamom. meliloti an. m. ℞.

qua omnia sacculo induntur, in aq. decoquuntur, quo fofu latus bis aut ter in die foveatur.

Quod si vero hyberno fuerit tempore, vel frigidiore aere, tutus erit fomentorum vſus, si vesicae fuilla indatur.

Ad ventriculum frigidiorē & infirmiorē:

℞. Squinanthi, cyperi, calami aromatici, garyophyll. nucis mosch. an. ℥. i.

radic. galang. ℥. ℞.

mentha sicca, summitatum absynthii, maiorena, origani. an. m. i.

& si flatus vrgeant, adde sem. foeniculi, anisi, an ℥. ℞.

flor. chamom. meliloti, rosar. rubear. an. p. i.

indantur sacculo, bulliant in aqua, & vini rubri tertia parte, foveatur ventriculus bis in die ante cibum.

Quod si & diarrhoea & vomitus adfit, parabitur fofus partim ex praedictis, partim ex adstringentibus, vt foliis plantag. polygoni, nuce cupressu, mali corio. Hepati vero magis conueniunt epithe-

epithemata, nisi ipsum sit induratum, aut valde obstructum. Tunc enim foras conficiuntur ex remolliētibus, althea, malua, violaria, admixtis hepaticis corroborantibus, agrim. chamæd. absynth. eupatorio, frigidiorē existente humore: calidiorē vero cichorio, endiu. & similib. additis, quinetiam santalis. Hæc decoquuntur in aqua, addita tertia parte vini albi, quibus existente duritie hepatis, addi possunt rad. altheæ, liliorum albor. &c.

Ad dolores flatulentos hypochondriacos, ex decocto calefaciente hepatico parabitur, vt ex radicib. aperientibus, foliis acrimon. summitatib. maioran. origani, calamenth. roremarini, baccarū & foliorum lauri, granor. iuniperi, decoctis in aq. & vini æquis partibus.

Sic in difficili respiratione ob hepatis vitium in hydropis initio:

℞. Rad. ireos ℥j.

radic. cyclam. ℥. ℞.

herbar. absynthii, maiorana, betonica, spica celtica, an. m. j.

flor. chamom. meliloti, sambuci, an. p. i.

sem. carui, ℥. iij.

fœnicul. ℥. ii.

gran. iuniperi p. i.

baccarum laur. p. ℞.

conquassentur, & in vino & aqua decoquantur hoc fotu hypochondria cum spongia foueantur.

Notandū tamen supra iecur fotus fieri non debere, nisi aliquid, quod partis rationē habeat, admisceatur, cuiusmodi est absynth. rosæ, spic. nardi.

Lien

Lieni obstructo & indurato ex emollientibus, vt decocto radic. lilior. altheæ, additis appropriatis, vt sunt radix capparis, summitates tamarisci, fraxini, lingua ceruina, ceterach, & similibus emollientibus, incidentibus, attenuantibus, quæ decoqui debent in aqua, cui acetum admisceri debet, vel in oxymelite decoctis, foueatur pars cum spongiis.

Ad renes calculo vel viscidior materia laborantes, parabitur ex decocto sem. lini, fœnogr. quæ sacculo inclusa parti applicabuntur: siquidem hæc, maxime si addantur & herbæ emollientes, partes reddent laxiores, dolores mitigabunt, vel etiam decocto emollienti addi potest parietaria, hederæ terrestris, betula. Hi sacculi calidi admovebuntur, vel decoctum vesicæ suillæ includatur, tempore nimirum frigidior; vel etiam vasi stanneo semicirculum referenti, & renibus applicatur.

Ad dolorem articulorum in declinatione paratur ex discutientibus & roborantibus, ita tamen, vt ea, quæ nervos roborant, adiiciantur, cuiusmodi sunt, chamæpitys, maiorana, salvia, lauend. cyperus. Adduntur & anodyna, flores chamom. meliloti, & rosæ corroborationis gratia decoquuntur in aqua & vino.

Sic ad oedemata contumacia paratur forus ex calefacientibus, siccantibus & roborantibus, additis radicibus cyperi, calami aromatici, galanga, foliis & floribus rorismar. foliis & baccis lauri, florib. chamom. & meliloti, decoq. in aqua. Decocto pars vna aceri vel vini additur; & tumor cum spongia foueatur.

Efficac-

Efficacius erit ad resoluendos humores frigidos, si in lixiuio materiæ conuenientes decoquantur.

Ad vmbilicum infantulorum prominentem, & flatibus turgentem, ex adstringentibus & roborantibus parantur, cuiusmodi sunt, cortices quercus, nuces cupressi, balauisticæ, gallæ, radices consolidæ maioris, bistortæ, tormentillæ, folia ouersæ pastoris, plantag. vtriusq; semin. cydonior. myrti, flores rosarum rubearum, quæ decoquantur in aqua chalybeata, vel aq. fabrorum, addito vino rubro adstringente, quæ sacculis duobus induntur, qui calidi & expressi, alternatim vmbilico adaptantur. Deinde loco siccato emplastrum contra rupturam imponatur, quod efficacius erit, si obolus armena & sarcocolla, succo potëtiliæ excepta, admisceantur. Nimium vero vmbilico flatibus distento, semina discutientia addere oportet. Quod si vero & lamina plumbi exigua imponatur, suo pondere vmbilicum deprimit. Huiusmodi fodus etiam in ceteris herniarum speciebus, à flatu si causentur, vlturpari possunt.

De Fomentis siccis & sacculis.

C A P. LII.

Fomenta sicca veteribus simpliciter fomenta, ut Celso a fomenta calida dicebantur: Hodie vero sacculi. Variant autem ratione partis, cui applicantur: vel enim capiti imponuntur forma cucuphæ vel pileoli, vel frontalis, vel sacculi. Cordi vero forma scuti pyramidalis, ventriculo forma
R scuti.

a lib. 2. c. 16.

& lib. 4. c. 4.

scuti. Sic hepatis, lieni, utero, ad earum partium formam. Horum materia sunt, herbae, flores, radices, semina, ligna aromatica, quae concisa, leuiter contusa, vel serico vel linteo obducuntur, & acu transuersim missa, ne materiae, ex quibus constant, in unam partem labantur, consueuntur, nonnunquam bombacis aliquid additur.

Sacculus capitalis ad cerebrum corroborandum eiusque calorem suscitandum:

℞. *Garyophyll. nucis mosch. cardamon. an. ʒj.*
flor. roris marini, maioran. an. ʒii.
styracis calamit. carabes, gummi iuniperi
an. ʒii.

f. puluis, qui bombace excipiat, panno serico contegatur, f. cucupha, quae singulis diebus mane cum suffitu admoveatur.

Ad destillationem sistendam, fiet ex mastice, carabe, cypero cortice granator. salvia, roremarin. maiorana, rosae rubrae, semina nigell. Roman. Sacculus pro sincipite:

℞. *Maioran beton. an. ʒ.iii.*
cortic. citri sicci ʒj. ʒ.
garyophyllorum, nucis mosch. an. ʒ. j.
thuris ʒ ʒ.

contusa punctim consueantur in sacculum trium digitorum longum & latum.

Frontalis formae in febribus ardentibus ad cephalalgiam, ad aestum & insomnia mitiganda fit ex foliis herbarum refrigerantium, lactucae, semperuiui, portulacae, sem. papau. seminib. frigidis maiorib. additis florib. violar. rosar. nenupharis, quae

quæ linteo raro excipiantur, & vapore aq. rosarum
vel nenuphar. lateri calido infusæ irrorentur.

Cordi corroborando in eius palpitacione:

℞. Flor. rosar. rub. borraginis, bugloss. violar.
nymph. an. p. j.
femin ocymi ℥. i. ℞.
santal. citrini, ligni aloes, cortic. citri, coral-
li veriusque an. ℥. i.
ambr. moschi. an. gr. i.
contusa in sacculo pyramidis forma trans-
uersim consuantur.

Sic tempore pestifero fiunt etiam sacculi, tem-
pore quidem frigido hoc modo:

℞. Rad. zedoarie, dictamni, tormentillæ, rosar.
rubear. cortic. citri sicc. flor. betonica co-
ronaria, garyophyll. nucis mosch. an.
℥. i. ℞.
ambre grysiæ ℥. ℞.
vel eius loco specierum diamargarit. fri-
gid. ℥. i.
f. puluis, qui sacculo sericeo recondatur, &
asspersus aq. rosar. vel vino albo, vel tan-
tillo aceti applicetur.

Aestate vero fiat hoc modo:

℞. Rad. cyperi. flor. rosar. rubear. violar. nymphæ
an. ℥. i. ℞.
flor. arantior. ℥. i.
ambre & moschi an. gr. iij. vel iiii. f. sac-
culus vt dictum.

Ad ventriculum roborandum, calorem e-
ius languidum excitandum paratur scutum hoc
pacto.

R 2

℞. Ab-

- ℞. Absynthii, mētha, maiorā. exiccata, an. ℥ ij.
 rosar. rubear. ℥ i. ℞.
 calami aromatici, cyperi, galang. an. ℥ i.
 garyophyllorum, nucis mosch. an. ℥ ii.
 omnia contusa excipiantur bombace, &
 panno serico contegantur, & interpun-
 ctim conseruentur.

Ventriculo applicetur post assumptum cibum.
 Tempore vero cibi remoueatur. Possent his et-
 iam addi styrax calamita, species diambrae, dia-
 moschi, alipta moschata, ambra & moschus pro
 magnatibus.

Ad lateris dolores flatulentos parabitur saccu-
 lus ex furfure, auena, milio, sem. lini, floribus
 chamom. meliloti, quæ per se, aut simul mixta, &
 in sartagine torrefacta, asperso pauco vino, saccu-
 lo indantur, calida parti affectæ applicentur. Ad-
 di etiam possunt & herbæ, & semina calida, si o-
 pus sit.

Sic in dolore colico flatulento:

- ℞. Cumini p. iiij.
 salis p. iiij.
 contusa aq. vitæ irrorentur, & calida parti
 applicentur. Vel:

De sacculis
 ex milio &
 sale vitæ
 Trallian. lib.
 8. c. 7.

- ℞. Milii torrefacti. p. iiij.
 salis. pug. iiij.
 folior. lauri. p. ii.
 sacco indantur, & in sartagine tantillo
 vino asperso calefiant.

Vsus fomentorum siccorum est ad destillatio-
 nes capitis sistendas, partes corporis roborandas,
 dolores præsertim à flatibus & materia frigida
 ortos

ortos mitigandos. Applicantur ut plurimum | ex
 calfacto lapide aut vino, aut aceto, aliove liquore
 conueniente asperfo; quo calorem contrahat,
 sicque parti applicentur, vel supra laminam ferre-
 am vino extinctam calefiat. Aliquando eorum
 materia in sartagine torrefacta, sacculo indi-
 tur.

De Epithematis.

CAP. LIII.

Veteres omnia medicamenta in malagmatis
 formam composita, quæ extrinsecus mediis
 partibus applicabantur, ἐπιθέματα ab applicando
 vocarunt. Posteriores vero medicamenta hume-
 ctantia, quæ ex aquis stillatitiis vel decoctis plan-
 tarum & pulueribus conficiuntur, sic nominant.

Dosis autem est, ut ad aquar. ℞. j. puluerum ℥ i.
 ℞. vel ℥ ii. addantur, quibus aceti vel vini albi, pe-
 netrationis gratia, octaua vel decima pars additur.
 Exempli gratia, Epithema ad somnum concilian-
 dum:

℥. Aq. rosar. ℥ iij.
 aceti rosati ℥ j.
 album. oui. agitati numero j.
 applicetur fronti.

Ad cor refrigerandum in febre ardente, in ipsi-
 us accessionis vigore, & ad sudores symptomati-
 cos sistendos:

℥. Aq. stillatitiæ, rosar. violar. nenuph. buglos.
 borrag. an. ℥ ii. |

R 3

aceti.

aceti ℥. ℞.

pulu. rosar. rubr. violar. santalor. an. ℥. ii.

Vel loco prædictorum addi potest trochiscor. carabe pulu. ℥. i. nonnulli & crysalli puluerizati ℥. j. ℞. adiiciunt.

Quod si suspicio sit febris pestiferæ, prædictis aquis miscebuntur aq. scabios. meliss. cardui bened. vr:

℥. Aq. rosar. scabios. meliss. violar. nappha, cardui bened. an. ℥. ii.

vini albi ℥. i.

succi citri ℥. ℞.

trochiscor. de camphor. vel specier. diamargarit frigid. ℥. i. ℞.

f. epithema, regioni cordis applicandum, ter aut quater in die repetendum.

Ad palpitationem cordis:

℥. Aquar. rosar. borrag. bugloss. meliss. acetosæ an. ℥. iij.

vini generosi ℥. j.

specier. de gemmis, diambre an. ℥. i.

ligni aloes, croci, an. ℥. ℞.

moschi. gr. ij.

aceti tantillum f. epithema.

Ad hepar vero intemperie calida laborans:

℥. Aq. endiu. lactuc. acetosæ an. ℥. iij.

aq. absynth. ℥. j.

aceti fortiss. ℥. ℞.

specier. triasantali ℥. ii.

Parari etiam poterit ex decocto radic. cichorii syluest. & folior. endiu. scariolæ, absynth. cuius ℥. ℞. addentur aq. violar. cichorii an. ℥. ij. aceti ℥. i. pulueris

meris triasantali ꝓ i. ꝑ. ꝑ. epithema, quod hypochō-
lrio dextro applicetur. Si tamen obstructio ve-
nemens sit, fomentis humidis vti præstat.

Ad febres heceticas parantur ex decocto hordei,
quatuor sem. frigidor. maior. folior. & flor. viola-
rum, rosar. in colatura lb. ij. dissoluatur oleum,
vel succus amygdalarum dulcium, vel oleum vio-
laceum.

Ad testiculos refrigerandos:

℞. Aq. rosar. ꝓ ij.

aq. solani ꝓ i. ꝑ.

vin. albi ꝓ. ꝑ.

trochiscor. de camphor. ꝓ j.

hoc epithemate vtimur ad immodice fluentem
sanguinem cohibendum.

Denique pulsibus corroborationis gratia ex
aq. rosar. aceto rosac. & speciebus cordialibus
epithema conficiatur: & si febris absit, pulue-
ris garyophyllor. aliquid additur: Si suspicio fe-
bris malignæ, succus citri & arantiorum misce-
tur.

Vsus est, ad partium principum corrobora-
tionem, vt cordis, ei vt & carpis applicando in
febri ardente, cor refrigerando, ad hepatis in-
temperiem calidam mitigandam: verum in o-
mnibus epithematibus, ad quamcunque inten-
tionem dirigantur, ea quæ virtutem partis, cui ad-
mouentur, conferuent, admiscenda sunt: Quem-
admodum in medicamentis, quæ intro sumun-
tur, obseruare iubet Galenus. Quare cordialibus
vinum & aliquid croci additur: Hepaticis vero
& lienaribus, leniter adstringentia, vt est absynth.

R 4

cete

ceterach: quinetiam acetum ad vim medicamenti deducendam.

Applicari autem debent post euacuationes, potissimum in febribus. Frequentier autem non solum mane & vesperi, sed quando necessitas urget. Administrantur autem cordialia quidem duplicato serico rubro in liquore tepido intincto; sic & hepatica, vel serico, vel lileo duplicato. Toties autem remouere oportet, quoties exiccatum fuerit.

a vide Oris-
bas. 9. coll.

23. Aetium
tetrab. 1. ser.
3. c. 172.

De Embrochis^a seu irrigationibus.

CAP. LIV.

b tetrab. 1.
ser. 3. c. 174.

QUOD Græcis ἐμβροχον & ἐμβροχμα, id Latinis irrigatio & irroratio dicitur. Est autem *humoris ex alto in partem aliquam destillatio vel irrigatio*; quod ab epithematibus (quæ aliqui male irrigationes dici volunt) differt, quod epithemata parti applicentur: sic etiam à fomentis humidis, humectationem Aerius^b vocat, quod vel per pannum, vel spongiam in decocto madefactam, parti applicetur: Hæc vero parti ex alto guttatim affundantur.

Materia huius remedii sunt herbæ, flores, radic. semina, quæ in aqua, aut vino, aut lixiuio decoquuntur, ea tamen dosi, ut ad plantar. m. ij. puluer. ʒ. ss. liquoris lb. j. affundatur, & ad mediæ partis absorptionem decoquantur. Quod remedii genus, etsi minus virium habeat, quam cataplasma, tamen ubi commode id applicari non potest, ut in capite, commode embrochis utimur.

Deinde

Deinde & in illis, qui propter imbecillitatem cataplasmatum grauitatem ferre non possunt. Sic etiam in præcordiis inflammatis, in principiis morborum, quando cataplasmate necdum vti licet. Denique partibus fractis & contusis; quando emplastris vti non possumus. Vsurpantur autem in affectibus frigidis capitis calidi, quo sensim illabentes guttæ infarctos humores resoluant, discutiant & consumant. Verum sæpius non solum pars affecta liquore aliquo perfunditur; sed etiam post irrigationem lana aut linteum eodem liquore imbutum imponitur. Exemplum.

Ad caput calefaciendum parabuntur ex calefacientibus herbis, saluia, maiorana, origano, hyssopo, calamintha, pulegio, floribus betonicæ, stoechados, rorismarini, radicibus cyperi, acori, ireos, feminibus coriandri, granor. tinctor. anisi, vt in lethargo:

℞. Herbar. calaminth. origani, hyssopi, summitatum betonica an. m. ss.

femin. coriandri preparat. anisi an. ℥ ii.

flor. rosmar. stoechad. an. p. j.

decoqu. in aq. suff. ad ℥b. j. irrigetur caput.

Quod si capitis morbus frigidus cōtumacior fuerit, aq. viræ ℥. ss. addi poterit.

Sic ad refrigerandum caput ex herb. lact. viol. portulac. solani, semperuiuo. floribus violar. nenuph. seminib. lactuc. papau. albi, Exemplum.

Ad somnum conciliandum:

℞. Herbarum solani, semperuiui, lactuc. portulac. an. m. j.

flor. nenuph. violar. rosat. an. p. j.

R S

sem.

sem. papauer. albi. lactuca, an. 3 ii.

corticum mandragor. 3 i.

decoq. in lb. ii. aq.

ad mediæ partis absorptionem.

Huc referri oportet stillicidia aquar. thermalium, quæ in affectibus capitis frigidis, ventriculi & articularum vsurpantur.

De Infessionibus^a seu semicupis.

^a Vide Aerium tetr. I.
ser. 3. c. 173.

C A P. L V.

QUOD Latini infessionem seu semicupium appellant, id Græcis *ἡydroδισμα*, est sessio in aqua medicata, ab imis pedibus, vel feminibus vsque ad umbilicum, ita ut supernæ partes non madescant; In hoc tantum à balneo differens. Variat autem pro ratione affectuum, quo utimur in affectibus renum potissimum nephritide, vteri, mouendis mensibus. Rarius in colicis & iliatis. Quin & ad dolores tibiarum, nonnunquam ad præparationem humorum contumaciorum.

^b Vide Aerium tetr. 3.
serm. 3. c. 5.

In nephriticis ^b fiunt ex emollientibus & diureticis, ut althea, malua, violaria, parietaria, hederæ terrestri, foliis raphani, anagallidis aq. betonicæ, pimpinellæ, sem. lini, fœnogræci, ex his decoctis in aqua fit infessio ad dolorem mitigandum.

Ad ciendos menses conficitur ex emollientibus, attenuantibus & incidentibus decoctis, & semicupio inditis. Sic etiam ad nimium menstruorum fluxum ex adstringentibus, radic. bistortæ, consolid. maior. nucis cupressi, galla immatura

strura, sumach, plantag. polygono, foliis & baccis myrti & similibus decoctis in aq. fabrorum & vino acerbo, quo tamen remedio caute utendum.

Ad colicum affectum à flatu & humore pituitoso caussatum excalescentibus, exiccantibus, incidentibus, admixtis anodynis, ut ex origano, calaminth. hyssopo, nepeta, satureia & similibus seminibus calidis, item lini, fœnugræci, alth. baccis lauri, baccis iuniperi, floribus chamomel. meliloti, decoctis in aq. quibus portio vini albi addi potest.

Ad dolores tiliarum, ubi nimius dolor à rêsione flatulenta, vel humoribus caussatur, præmissis tamen vniuersalibus parabitur ex herbis maluæ, alth. & violar. thapso barbato, floribus chamom. meliloti, sem. lini, fœnogr. in quod decoctum tepidum, æger tibias immitat.

Similis fere lotio ad menses promouendos conficitur ex herbis matricilibus, cuiusmodi sunt arthemisia, matricaria, calamintha, nepeta, melissa, additis floribus chamom. meliloti, quibus decoctis nonnunquam & cineres adduntur. Quæ diebus aliquot ante tempus menstruorum utendum est.

Sic & lotio pedum, imo & brachiorum in febribus ad conciliandum somnum, parabitur ex decocto folior. violar. lactuæ, portulacæ, cucurbitæ, sem. papau. albi, lactuæ, sem. frigidor. tam maiorum, quam minorum.

Ad humores contumaces præparandos ex plantis emollientibus, attenuantibus & incidentibus sunt, qui in seffus parant.

De

*a Vide Ori-
bas. 10. coll.
3. Aet. tetr. 1.
ser. 3. c. 67.
Aegin. lib. 1.
cap. 52.*

Balneorum, βαλανεῖα dictorum, apud antiquos (quemadmodum adhuc apud Germanos) frequentissimus usus fuit, velut totius corporis remedium, non solum ad affectus externos, verum & internos, quod sudandi, lauandi, detergendi-que corporis usibus est deputatum, cuius multæ sunt differentiæ: Aliud enim est naturale *a*, aliud artificiale. Naturale aliud calidum, aliud frigidum, quæ rursus ratione mineræ variant: Si namque calidæ sint, sulphur habent terræ, pinguedinem, quæ accensa à calore subterraneo, calidas reddunt aquas, & hæ Thermæ dicuntur. Si vero sulphur minori sit quantitate, tepidæ redduntur, vel etiam frigidæ permanent, nisi & bitumen admisceatur. Quare balneorum minera vel sulphur est solum, ut in Helueticis, vel sulphur cum alumine, ut in Marchiacis, vel etiam plumbum, quod de Plumbariis creditur, vel ferrum, vel aurum, quod de Fabariis dicitur, vel aliud aliquod metallum.

*b De frigidi
lauacri usu
ex Gal. ha-
bet Oribasi-
us 10. coll. 6.
Aet. tetr. 1.
ser. 3. c. 168.
Aegin. lib. 1.
c. 15.*

Quodcunque autem sulphureum est, aut bituminosum, affectibus cutis utile est. Quod si vero & alumen sit admixtum, absterisionis causa etiam in cutaneis affectibus usurpari potest.

Ad balnea naturalia referri debet lotio in fluminibus *b*, quæ intemperies calidas corrigere, inanitiones corporis immodicas coercere possunt: cum refrigerando, cutim condensare, poris obstructis sudores cohibere, sicque tenuioris substantiæ dissipationem impedire potest.

Arti-

Artificialia & vero ad imitationem naturalium parari possunt, licet naturalia in quibusdam affectibus magis conueniant, vt arthritide, paralyti, menstruis ciendis. Horum tamen penuria etiam artificialia parari possunt, quæ etiam variant, partim ratione affectus, partim etiam ratione aquæ, & eorum, quæ iis incoquuntur, prout morbus exgere videtur, quæ vel calida sunt, vel frigida, vel molliunt, aperiunt, abstergunt, adstringunt, dolorem mitigant. Siquidem quandoque fiant ex sola aqua, & illud balneum aquæ dulcis appellatur, ad differentiam eorum, quæ ex aq. marina, vel falsa, nitrosa, vel aluminosa, aliaue sunt natura vel arte.

Balneum d vero aq. dulcis, quod cum simpliciter dicitur, intelligendum est ex aq. tenuis substantiæ, quæ cito penetret, cõfici debet, qualis est aqua pluuialis vel fluuii, modo cretam, vel alumen, aliaue secum non ducat, cui succedit aq. fontana peroptima, postremum locum habet aqua ex puteo, post hanc aq. palustris. Eiusmodi balnei usus in hecticis potissimum commendatur, præsertim si in ipsum vel frigidiusculum, vel tepidum descendat æger, vt hac ratione corpus, quod à calore sensum abluimitur, refrigeretur, pori ipsius cutis constringantur. Ad sudores prohibendos leuiter adstringentia iniici possunt, vt sunt, rosâ, myrtus, lentiscus, &c. Vel ægro e balneo egresso, inunctio fiat ad thoracem & dorsû spinam, cum oleo rosato, violato, ad sudorem impediendum.

Ad dolorem colicum balneum etiam præscribitur

c Oribas. 16.
coll. 2.

d Vide Orib.
10. coll. 1. de
usu dulcium
balneor. ex
Galen. &
Aet. tetr. 1.
ser. 3. c. 166.
Trallian. lib.
1. c. 15.

bitur, quia communiter ægri in sessiones moleste ferunt. Paratur ex radicibus alth. malua violar. foliis lauri, floribus chamom. meliloti, seminibus carminatiuis, decoctis in aq. partibus duabus, & vini albi parte vna, & diuitibus admisceri potest aliquid vini maluatici.

In dolore nephritico rad. lilior. albor. alth. herbæ parietar. violar. malua, fysymbrium aquaticū, fenecio, flores chamom. meliloti, semina fœnugr. lini, decoquuntur in aqua. Aliquando tamen & olea adduntur, vt lilior. albor. butyrum recens, & dum in balneo sedent, potiones lithontribæ exhibentur. Dum autem æger in balneo sedet, in eo ne sudet, necessum est esse tepidum & apertum.

Ad mouendos menses, etsi in sessus commodiores & efficaciores sint, fieri tamen possunt ex eadem materia, sed multo copiosiore, quæ pro ratione humoris obstruentis deligenda; Vt si pituitosus sit, ex calefacientibus, siccantibus, incidentibus, attenuantibus, detergentibus.

Si melancholicus, ex emollientibus admixtis etiam hystericis, cuiusmodi sunt, calamintha, arthemisia, nepeta, origanum, maiorana. Si vero fiat suppressio ob vteri frigiditatem, & venarum angustiam, eadem materia, quæ ad pituitam, deligi debet. Et talis balnei diebus aliquot ante tempus menstruum vsus esse debet.

Ad conceptionem iuuandam. Si à frigida vteri intemperie eueniat, sumenda erunt, quæ in pituitoso affectu commendantur: Si ab in-

tem-

temperie calida & sicca, balneum tepidum cum humectantibus & refrigerantibus adiectis, quæ tota specie conceptionem iuuent, vt mercuriali vtraque lingua auis. Si à laxitate oris vteri & eius lubricitate semen non retinentis, eueniatur, non solum ea, quæ vterum corroborant, sed etiam adstringunt, sumenda, cuiusmodi sunt radix bistortæ, cyperi, galangæ, aditis rosis, balauistiis, malicorio, nuce cupressi, & similibus odoratis, quæ in aq. decoquenda, & vini rubri adstringentis portio addi debet. Vsurpanda autem sunt post vniuersalem totius corporis præparationem, mensium purgationem, diebusque aliquot, antequam mulier viro miscetur.

Ad affectus cutaneos, vt pruritus, scabiem, lepram maxime commendantur. Vbi enim crustæ aut furfures adsunt, fiunt ex emollientibus, vt radic. liliori albor. alth. admixto furfure, hordeo, & herbis detergentibus, vt scabiosa, agrimonia, verbena, florib. cham. meliloti in aq. decoctis: de in cute præparata & emollita fiunt ex detergentibus, & siccantibus, vt rad. enulæ, oxylapathi, ireos nostrat. bryoniæ, aronis, serpentariæ gentian. lupinis, foliis mercurialis, parietariæ, agrimoniæ, verbenæ, saponariæ, fumariæ, lupuli, centaurii, admixtis seminibus frigidis, ad cōtemperationem, floribus chamom. meliloti, anethi, pampinis vitium decoctis in aqua. Verū & æger abstergendus est in ipso balneo cū sacculo, furture pleno. Quod si affectus fuerit inueteratus & contumax, egrū illinere oportet, è balneo egresso linimento confecto

De usu bal-

neor. vide

Actuariū

3. method.

med. 10 de

spirit. anim.

nutrit.

Oribasius 1.

euporist. 16.

ex

ex axungia suillæ partibus duodecim, argenti viui in salua hominis ieiuni, vel succo limonum, extincti, parte vna vel duabus. Tum balneum detergens & adstringens ex plantagine, thapso, polygono, pilosella, rosis, sale, alumine conficiatur, quo vtimur, materia iam per priora balnea euacuata.

Notare tamen conuenit, licet balnea multis profint, multis etiam obesse: Cacochymicis namque & plethoricis, nisi vniuersim prospectum sit, nocent: Sic etiam iis, quibus visceris imbecillitas, obstructio, hypochondriorum tumor, cum à balneis fluxiones in partes delibiores, sæpe etiam febres concitentur.

Tempus autem ad eundem vsum commodum, matutinum est, & vespertinum, horis aliquot à leuiore prandio. Cauendum autem, ne in balneo, dum sedet æger, horrore aut animi deliquio corripiatur. Quamdiu autem insidere par sit, ex ægri viribus, consuetudine, anni tempore, cæli statu desumendum. Insuper aeris constitutione contagiosa à balneis tam humidis, quam siccis, cum hisce pori cutis referentur, & corpus ad contagium concipiendum aptius reddatur, abstinere oportet. Sic etiam ea die, qua sanguis missus est, vel corpus purgatum, balneum vitandum.

De Lotionibus siue balneis particularibus.

C A P. LVII.

LOtiones, quæ balnei vicem sæpe subeunt, eiusque nomine balnea particularia dici merentur,

mentur, ad diuersas partes accommodantur, non solum absterfionis gratia, sed etiam ad voluptuositatem & ad sanitatem. Ablutionis enim causa fiunt lotiones capitis, ex lixiuio, ad auferendas sordes: corroborationis causa addito agarico: absterfionis gratia, in vlcere capitis, ex lixiuio parato ex abrotano, absynthio, betonica. Sic ad pediculos enecandos adduntur lixiuio amara, vt absynthii, lupini, vel nitrum. Ad furfures detergendos, succi vel decocta herbarum amara, vt absynthii, abrotani, betæ, parietariæ, saponariæ; ita tamen, vt semper capitalia admisceantur, cuiusmodi est betonica. Fiunt autem lixiuia communiter ex cineribus feruentiorum; quod fortius erit, si frequentius per cineres coletur.

Ad fetorem axillarum abluuntur lixiuio confecto ex adstringentibus, vt est lentiscus, myrtus, bleaster, additis odoratis, leuiter adstringentibus, cuiusmodi sunt, rosæ. Abluuntur quin etiam manus & pedes, non solum ad munditiem, sed etiam ad sanitatem, in quam rem vsurpare licet herbarum decocta. Quod si detergere solum velimus, lixiuium parabitur ex detergentibus, corroborantibus & siccantibus.

Sic ad tremorem manuum arcendum, & pedum, lauare oportet vino, in quo decocta sit salina, lauendula, rosamarinus: commendatur etiam ad tremorem, siue fiat ab argento viuo, siue plumbo, lotio ex aqua & vrina,

Sic ad somnum conciliandum, vtpote in febribus fiunt lotiones pedum, tempore, quo eger dormitum ibit, ex decocto fol. maluæ, lactuæ, violar.

S

lar.

lat. salicis & simil. singulor. sumendo m. i. additis floribus nenuph. & violar. sing. p. i. Abluti pedes detergendi non sunt, nonnunquam panno linteo inuoluendi.

Denique in doloribus capitis, destillationibus, tussi quætiā ex humore à capite delabente fieri solent lotiones pedum tempore somni ex herbis capitalibus.

De Suffitibus.

C A P. LVIII.

De suffitiū

usu & con-
fectione vide

Aegin. lib. 7.

c. 22. Oribas.

10. coll. 19.

Aetiū tetr. 1.

ser. 3. c. 144.

Compositio-

nes varia a-

pud Oribas.

3 sympos.

Myreps. sect.

21.

Aetium tet.

4 ser. 4. c.

122.

Suffitus vel ad voluptatem, vel ad sanitatem cōficiuntur. Ad voluptatem ex suauiter olētibus, vt styrace, ladano, benzoino, ambra, moscho. Ad sanitatem vero quædam ex odoratis, quædam ex fœtidis: quædam ex odoratis & fœtidis simul mixtis. Odorata variant ratione formæ. Quædam enim fiunt forma rotunda, eaque maiore, quæ poma odorata, poma ambra dicuntur. Vel minore forma, cuiusmodi mulieres vel collo suspendunt, vel manibus conuoluunt.

Fiunt autem ex ambra, moscho, zibetho, quibus adduntur carbones salicis, partim ad molem augendam, partim ad nigredinem conciliandam. Vel fiunt in forma trochiscorum, cuiusmodi sunt trochisci pro fumo vulgati, trochisci de alypta moschata. Vel ad formam oblongam, quæ auiculæ cypriæ vulgo vocantur. Hæc excipiuntur mucilag. gummi tragac. vel arabici in aqua rosar. mu-

macerati. His relictis ad suffitus, qui valetudinis gratia fiunt, quorum alii ad spiritus dissipatos reficiendos fiunt, ad eosdem à contagio vindicandos, cerebrum roborandum, calefaciendum, siccandumve, eiusdemque fluxiones sistendos, ad tussim compescendam, crassumve in pulmonibus humorem præparandum, ad eos corroborandum, ad intestinorum vlcera, & dolores, menses sistendos, vel mouendos, vteri præfocacionem, conceptus adiuuationem, deniq; ad sudores mouendos in lue venerea cõficiuntur. Materia suffituum nõ solum desumitur à plantis, verum etiam lacry- *Aet. Petr. l. ser. 3. c. 114.* mis, resinis, gummatibus, liquoribus quibusdam metallicis & aliis odoratis, prout parti affectæ accommodatæ sunt. Ex quibus fiunt suffumigia duplici forma, pulueris scilicet aut trochiscorum, magis tamen trochisci conueniunt, eo quod pulueres citius absumantur, & iis nõ ita cõmode omnia misceantur. Iniicitur autẽ puluis crassiuscule contusus siue trochiscus, carbonibus ardentibus, quo sensim igne incalescant, halitum de se edat, qui aliquando linteis, vel partis affectæ tegumentis excipitur, deinde parti admo- uetur.

Ad caput calefaciendum, siccandum & roborandum, paratur ex maiorana, betonica, origano, calamintha, radicibus cypeti, ireos, granis paradyfi, ligno aloes, styraci calamita, aromatibus, vt nuce moschata, garyophyll. Sic floribus lauend. rorismar. stoechados, sem. nigell. Roman. fumendo partes æquas, vel pretiosiorum

partem minorem, & crassiuscule simul contundas, cuius pulueris portio prunis inspergitur, vapor vel fumus cucupha vel pileolo excipitur, & ieiuno ventriculo capiti admouetur. Possunt tamen eadem etiam mucilagin. gummi tragacanth. excipi, & in modum trochiscorum lupini forma efformari.

Ad destillationem à materia frigida caussatam sistendam, calefacientibus & exiccantibus adduntur leuiter adstringentia, cuiusmodi sunt rosæ rubræ, mastiche, gummi iuniperi, gummi hederæ, thus, carabe. Calefacientia vero & exiccantia erunt styrax, macis, garyophyl. nux moschat. semin. nigell. Roman. vt:

℥. Flor. rosar. rub. semin. coriandri, gummi hederæ torrefact. an. ℥ j.

nigella in aceto torrefact. ℥ i. β.

thuris & corticis eiusdem, mastycis an. ℥. iii.

gummi iuniperi ℥ ii.

f. puluis, quo vtimur

nō solum mane ventriculo ieiuno, sed etiam hora somni, cum destillationes noctu magis moueantur.

Ad pulmones crassa pituita repletos, fiunt ex puluere tussilag. prunis insperso, mane ventriculo ieiuno, ore fumus excipitur. Materia vero crassiore existente, addi potest marrubium album, radix iridis florentinæ.

Ad vlcera pulmonum fiunt ex exiccantibus & adstringentibus. Licet aliqui etiam commendent ea, quæ fuligines faciunt, eo quod fuligines vlcera consolidant, cuiusmodi sunt pix, resina, terebinthina, mastiche, gummi iuniperi. Sic quoque ad spu-

sputum sanguinis paratur ex iis, quæ destillatione sistunt, adstringunt, exiccant, ut rosus, nuce cupressi, malicorio, mastice, carabe.

Ad dolores intestinorum & podicem relaxatū, parantur ex thure, mastice, corticibus granator. rosis, cypero, excipitur fumus bombace, & parti dolenti calidus applicatur. In cuius defectu linteis duplicatis utendum.

Ad menses mouendos fiunt ex odoratis & aperientibus, ut radic. cyperi, ireos, cardamomi, nuce moschat. g. ryoph. ligno aloes, styrace calamita, ladano, vel etiam herbar. arthemisiæ, rutæ &c.

℞. Myrrhe styracis, l. dallii an. ʒ. β.
rad ireos, asari. sem. cymini, an. ʒ. iiii.
pulegii si ci, opopanax. an. ʒ. ii.
excipe butyro & t. rebinthina.

Vfus erit post semicupium vel balneum, vel etiam citra hæc, tempore eo, quo erumpere solent menses, & fiunt per embotum seu infundibulum, cuius collum à quibusdam intestino gallinaceo (quo citra molestiam pudendam subire possit) obuoluitur & excipitur. In eundem usum trochisci de myrrha puluerizati, nonnullis odoratis additis, commendantur. Contra vero ad sistendum nimium fluxum, ex his, quæ sanguinem sistunt, fieri debent.

Ad uteri ascensum naribus odoramenta foetida, ut est, ruta, ass. foetida, galbanum, castorium, oleum de gagate, plumæ accensæ, potissimum perdicum, panni veteres vel etiam corium: Sed eodem tempore odorata supponenda, vel ladanum

num cum tantillo moschi, vel zibethi, vel ambre, in nodulum coniecta mulieribus indendum. Contra ad vteri præcipationem mulieribus fœtida, naribus bene olentia, vt est ambra, moschus, styrax calamita, ladanum & similia subiicienda.

Ad dolores articulorum fiunt suffitus ex corroborantibus & exiccantibus, cuiusmodi sunt, saluia, rosmar. lauendula, stoechas, flores chamom. meliloti, sumendo prædictorum sing. ℥i. styracis calamit. benzoini, myrrhæ, rosar. rubear. an. ℥i. ℞. puluis crassiusculus prunis inspergatur. Fumus vero vel linteis mollibus, vel lana vel bombace excipitur, parti dolenti admoveatur. Passunt tamen iidem pulueres terebinthina vel ladano excipi, & fiunt trochisci, qui tempore requirente, in puluerem crassiusculum comminuantur.

Ad luem veneream sudoris promouendi gratia fiunt potiss. ex cinnabari, cum hydrargyri sit particeps, sudores mouet, saluationem excitat. Admiscenda tamen sunt odorata ad fœtorem corrigendum, vt benzoinum, styracem, quæ resina, terebinth. excipiuntur, in formam trochiscorum rediguntur. Exemplum

℥. Cinnabaris ℥ii.
benzoini, styracis calamita, an. ℥i. ℞.
myrrhæ, cortic. pini, an. ℥. ℞.
cum terebinthina fiunt trochisci.

Hoc suffitu totum corpus suffumigetur, aliquando vero tantum pars, aliquando post totius

is curationem reliquæ in parte aliqua externa,
ut brachio, pede, membro virili, remansere.
Quibus pars illa suffumigatur per infundibulum
superius recipiendo. Aduertendum tamen, suf-
fumigationem loco calido fieri debere, deinde
etiam vsus tempore, dum agro administratur,
caput foris detineatur, ob metum suffocationis
(quod multis ob incuriam accidit) vel etiam
traucedinis. Addere lubet vnicum exemplum suf-
fusus odorati.

℞. Rad. ireos florent. ℥. i.

rosar. ℥. ℞.

santal. citrini ℥. iiii.

ligni aloes, benzoini an. ℥. ij.

styracis ℥. i.

Garyophyll. ℥. ℞.

pulueriscentur omnia, Dein adde moschi,
ambra vel zibethi ad placitum,

Hic puluis vulgo puluis violarum, à radice i-
reos, quæ à quibusdam radix violarum voca-
tatur.

De Pilis odoratis.

C A P. LIX.

Pillæ odoratæ, quæ vulgo poma ambrae, eo
quod communiter ambram recipiant, di-
cuntur. Materiam habent eandem, quam &
suffumigia odorata, ut pote styracem, ladanum,
ambram, moschum, & similia. Exemplum pillæ o-
doratæ tempore pestifero:

S 4

℞. La

℥. Ladani ℥ i. ℞.
 styracis calamite. ℥. ℞.
 benzoini ℥ i.
 garyophyllor. ℥ i. ℞.
 rosar. rubear. ℥ i.
 ligni aloes, santali albi an. ℥ ℞.
 meioran. lauend. semin. nigell. an. ℥ i.
 camphor gr. iij.
 styrac. liquid. ℥ ii. fiat pomum.

Ditioribus addi possunt ambra, moschi, grana aliquot, quæ cum gummi tragacanthæ in aq. rosar. dissolut. excipiuntur. Hæc pila tempore pestifero & hyberno usurpari potest. Cælo vero calidior ex minus calidis confici potest. Globuli quinetiam ex iisdem addito moscho & ambra, effinguntur, ad monilia mulierum, vel de collo gestandi, vel carpis applicandi, nō tantum voluptatis causa, sed etiam ad aeris correctionem. Ex eadem materia aues cypriæ ad aerem corrigendum conficiuntur, vt:

℥. Carbonum salic. ℥ iij.
 benzoini, styrac. calamit. an. ℥ i. ℞.
 nucis moschat garyoph. an. ℥ iij.
 f. pasta, quæ incorporetur cum gummi tragacanth. in aq. rosar. macerato.

Ab aliis sic parantur:

℥. Carbonum salicis ℔ i.
 Ladani ℥ ii.
 styracis, benzoini an. ℥ ℞.
 pistetar in mortario, cum aqua rosar. malaxetur simul, & fiant formulæ ad placitum.

Teda ex iisdem conficitur cera addita.

De

De Dropacibus siue picationibus.

C A P. LX.

QUod Græcis, Δράκας, & Latinis Picatio, à pice dicitur, remedium est, quod vel toti corpori, vel certis interdum partibus adhibetur, & morbis diuturnis maxime conuenit. Duplex autem est, simplex vel compositus. Simplex, qui etiam communis, & *πίττωσις* a hoc est, picatio appellatur, ex pice sola liquata cum modico oleo, vt olei parte vna, picis partibus quatuor vel quinq; conficitur. Eiusmodi applicatur partibus tabescentibus ad calefaciendum, sanguinis copiam alliciendâ, sicq; carnem amissam recuperandam, vt Aegineta *b ex lib. 1. c. 58.* Galeno, qui optimum medicamentum ad recuperandam carnem esse perhibuit, præsertim, si diutius parti adhæreat, nec sæpius vno die mutetur. Vtatur etiam in crebro vomentibus, affectuque coeliaco, quæ forma nil aliud est, quam picatio. Alius est compositus, quo ad euocandam materiâ potè profundo ad superficiem, & ad partium calorem humanatum languidum excitandum vtatur, & præter picem & oleum c piper, pyrethrum, lepidium & simili recipit, dimidia nimirum ad oleum portione. Quod si vero magis exiccare, quam calefacere velimus, quod in membris paralyti affectis, & humidioribus corporibus obseruandum, ad picem & oleum sulphur viuum, sal & cineres samentorum addemus. Quod si vellicare velimus, materiam euphrobium miscebimus, quæ trita liquefactis adiiciuntur, vt maiorem calorem excitent.

a Act. 1. c. 180.
ser. 3. c. 180.

*c Materia
posuit Ori-
bas. 1. synops.*

30.
Act. 1. c. 180.
ser. 3. c. 180.

S s

For-

d. Aeginet.
l. 7. c. 19.

e 10. collect.
12.

Forma interdum est liquidiore d, instar cataplas-
matis, interdum sicciore instar emplastri, prout v-
sus exigit. Si namque ægri vires imbecilliores fue-
rint, in forma cataplasomatis fieri debet, & paula-
tim auelli, pili quinetiam abradendi, quod in im-
becillioribus Oribasius e fieri iubet. Deinde dro-
pax calidus applicetur, subinde priusquam refri-
gescat, auferatur, statim ad ignem calefactus repo-
natur, & hoc sæpe reiteretur, vsque dum pars af-
fecta rubescat, & leuiter extumescat. Quod si hu-
mor, qui prius extiterat, subsideat, & pars rubefa-
cta exalbescat, caloris dissipati signum erit.

In robustioribus vero etiam efficaciore dropa-
ce indigentibus, emplastri modo præparabimus,
& pilis non abradis, nisi forte capiti, aut mento, aut
pubi applicandus sit, & confestim auellendus.
Satis autem erit quatuor aut quinque diebus ad-
mouere. Hieme quidem vno die bis, mane & ves-
peri. Aestate vero tertio quoque die, & tantum
semel applicatur, prout humor parti magis aut
minus impactus fuerit. Quod si parti pertinacius
adhæreat, aqua tepida, priusquam auferatur, fo-
ueri debet, eoq; remoto, pars decocto detergente
fouenda, vt fuisse, adiectis f lenientibus, vt vio-
larum, malua. Aliquando vero dropax sinapismū
præcedit, vt materiam præparet. Aliquando post
sinapismum admouetur, vt humoris reliquias dis-
curiat. Exemplum:

f ex Aetio
G Aeginet.
I. c.

℞. Picis, cera, colophon. an. ℥ iij.
nitri. ℥ i. β.
bitum. ℥ i.
sulph. viui ℥ iij.

pipe-

piperis, euphorbii, adarces, an. ʒ ii.

cantharid. ʒ. ʒ.

olei cyrini. ʒ. i. f. dropax.

Verum medicamenta depilatoria, ὡς ἂν λέγεται proprie dicta, etiam dropaces appellantur; forte, quod sola pice constarent in oleo liquata, quemadmodum & dropaces, quæ medicamenta πικρὰ ὡς ἂν Galenus appellauit, & eorum materiam abunde explicauit h, quamuis Oribasius i psilothrum à dropace differre velit, quod eius actio minor sit, quam dropacis.

g com. 3. in

medicat.

aph. 32.

h. i. comp.

med. f. loc.

i Ex Menae

macho. 10.

collect. 13.

De Sinapismis.

C A P. L X I.

Sinapismus, à sinapi nomen habens, nil aliud est, quam cataplasma ex sinapi confectum, ut Archigenes definiuit. Duplex autem est, leuis & fortior. Leuis est, quem Græci φοινικρον, rubificans medicamentum dixerunt, siquidem per medicamentum rubor in aliqua parte excitatur. Fortius, quod proprie vesicatorium dicitur. Quæ inter se differunt, quod sinapismi cuti admoti, calorem & ruborem accendant; Vesicatoria ob diuiniorem moram, vesiculas excitent & exulcerent. Sinapismus autem simplicissimus est, qui ex oleo sinapi confuso & leuigato constat. Alter vesicatorius est, qui ex sinapi & ficibus à veteribus a paratur, et si tres differentiae proponantur, à viris a Aegin. lib. 8. cap. 19. leuis & mixtionis modo sumptæ, imbecillior, cui fit ex sinapi parte j. & ficuum ij. partibus; quo in pueris, mulieribus & exquisitiore sensu

sensu præditis, utimur. Blandior tamen erit, si æqua portio axungię aut adipis, ut gallinę, anatis, & micę panis loco ficuum ipsi sinapi adieceris. Fortior erit, si ex sinapi partibus duabus, & vna ficuum siccorum componatur. Si vero æqualis portio fermenti cum ficubus accesserit, vehementior adhuc erit; vel si semen nasturtii aut thlaspi contusum admisceatur, quo in robustioribus, & hebetiore sensu præditis utimur.

Tertia media est, quę ex æquis partibus ficuum & sinapi conficitur.

b Agin. l. 7.

c. 19.

Oribas. 10.

coll. 13.

Myreps. sect.

40. c. 13.

Parandi b modus talis est; Ficus sicca siue caricę in aqua tepida per diem macerantur, deinde expressę contunduntur, mox sinapi per se contusum subtiliss. lenigatum, inter lenigandum aqua, in qua ficus maduerint, sensim affunditur, & ambo permiscentur in modum cataplasmatum, quod parti calidę & frictione præparatę, admouetur. Quod si vero ipsius sinapi acrimoniam domare velimus, in aceto macerabimus. Si vero & alia adicere libeat, similiter, quemadmodum ficus, maceranda erunt, & contundenda.

c Cassius

Medic. in

problemate

62. querit,

cur sinapi a-

qua subactū

magis rube-

faciat, quam

aceto sub-

actum.

In dolore Ischiadico plerunque utuntur stercore caprino, cum aceto; vehementior erit, si rad. thapsiæ tritę pars j. axungię suillę partes iij. commisceantur. Exemplum:

℞. Rad. bryonię crudę contusę vel cyclami-
ni ℥ j.

axungia ℥ ij.

misceantur, parti applicentur:

Hoc

hoc potentissime attrahit, & quod attractum est, dissipat. vel tale:

℞. Olei costini ℥ j.
olei de castorio, de euphorbio, an.
℥ j. ℞.
sinapis ℥ ij.
sagapeni ℥ j. ℞.
castorii ℥ j.
euphorbi ℥ j.
aceri ℥ j. ℞.
cera q. s. ad emplastri consistentiam.

Tempus autem, quo parti adhærere debet, cerâ definiiri non potest, propter diuersam partium temperiem. Relinquendum tamen, vsque dum pars rubescat; ita tamen, vt sæpius pars inspiciatur, præsertim in paralyticis, qui sensum amiserunt, ne diuturniorem moram pars exulceretur aut induratur. Quo vero facilius sinapismus operetur, partem fouere oportet spongiis, aqua calida aduentibus, cataplasmate adhuc incumbente. Ubi ubi cutis rubebit, auferre oportet, rosaceo pars illinenda, vel lana rosaceo imbuta, vel malua cocta & trita cum pane imponenda, donec nil mali ex sinapismo supersit.

V. Usus sinapismorum est, humores à centro ad superficiem prolicere, qui aliis vinci non potuerunt, vt in acutis morbis, nimirum lethargo, cataplexi; in initio quidem cruribus applicandum: ubi vero materia radices egerit, capiti. Sed & ad luxiones inueteratas, hemicraniam, partes supra modum refrigeratas. Laudantur in paralyticis, in chiadicis, podagricis, contumaci splenis affectu,

ctu; sic etiam quemlibet dolorem contumacem
è frigida causa ortum vel tollet, vel saltem de-
mulcebit.

à Aegin. lib.

7. cap. 19.

Aetius tetr.

1. serm. 3. cap.

181.

Cauendum *d* autem à sinapismo in iis, qui con-
tinua febre laborant, vel vlcus habent in cartila-
ginosis & excarnibus locis: siquidem vlcera nimia
acrimonia exacerbentur, partes vero ex carnes ad-
urentur, interdum etiam nigrescant.

De Vesicatoriis.

C A P. LXII.

Vesicatoria medicamenta sunt, quæ non so-
lum ruborem parti inducunt, vt faciunt sina-
pismi, sed etiam cutim, vesicas seu pustulas exci-
tando, exulcerant, quod remedii genus *φοινιζμός*
veteribus, vt non nulli volunt, dictum.

Materia vesicantium multiplex est, præsertim
nasturtium, flammula, lepidium, cyclaminus, si-
napi, squilla, allium, vrtica, thapsia, esula, euphor-
bium, lac ficulneum, stercus columbinum, can-
tharides, metalla. Radices quidem in aqua vitæ
macerantur, teruntur & applicantur. Compositi
vero fiunt ex saponis nigri & salis æqua portione
in emplastri modum mixtis. Hoc nullo fere dolo-
re pustulas excitat; quemadmodum etiam flammula
contusa, vel per se, vel cum sale applicata.
Cantharides omnium citissime vesicas excitant.
Solent autem & caput & alas, & pedes abicere, &
reliquum exactissime contundere, & cum tripla

axun

unguæ parte miscere: Efficacius hoc modo parabitur:

℥. Cantharid. extremis ablatis ℥ iij.

mice panis crudi ℥ ij.

aceti squillitic. ℥. s.

contundantur simul, & fiat pasta.

Alii vero cantharides cum solo fermento miscent. Efficacius etiam reddunt, addita radice bryoniæ vel cyclamini, vel ranunculi, apii risus dicti, si nimirum ℥ ij. addantur; piperis vero ℥ i. cum parte aliqua fermenti. At si cantharidibus uti velimus, vesicæ prospiciendum, ne lædatur, quod fiet, si cremor lactis, vel succus amygdalar. dulcium cum decocto hordei, & diatraga cantho frigido propinetur.

Quod si vero dolor vehemens cum rubore accesserit, & pustulæ adfuerint, tum linteolum succo malvæ aut decocto fœnugræci cum rosac. madefactum, imponendum erit, deinde cerato rosæ: si cerussa utemur, vesicæ à medicamento excitatæ forcipibus aperiendæ sunt, apertæ retinendæ, donec omnis humor peccans è parte sit vacuatus, quod fiet, si butyri aliquid addatur, admoto folio hederæ, vel tussilaginis, vel brassicæ.

Vsus est ad serosos humores educendos ex quacunq; pene corporis parte, maxime vero si malum à frigida causa ortum ducat. Laudatur potissimū in doloribus dentium, si vel nuchæ vel carpo applicentur. In affectibus oculorum revulsione gratia, derivationis & euacuationis. Sic etiam

in

in pertinacibus doloribus ischiadicis & aliis. Ad reuulsionem quidem, cum ceruici vel occipiti, vel pone aures applicantur, ad humores, qui è capite ad anteriores partes faciei feruntur, reuellendos. Ad deriuationem vero & euacuationem, cum in bubonibus vel carbunculis pestilentialibus parti inferiori è directo adhibentur, ad materiæ virulentæ euacuationem, vt si bubo fuerit in inguine, cruri vesicatorium applicandum.

De Pyroticis siue Cauteriis potentialibus.

C A P. LXIII.

K^{Αυσικά φάρμακα}, adurentia medicamenta: eadem & ^{ισχυρωτικά}, quod crustam partibus vltis inducant. Dicitur etiam ^{καυτήριον}, quod vrendi vim habeat, & vsurpatur tam pro medicamento, quod potestate vrit, quam pro ferro candente.

Cauteria duplicia sunt; alia actualia, alia potentialia. Potentialia, Græcis pyrotica, quod ignis instar adurant, Latinis ruptoria, eo, quod putrefaciendo, & etiam adurendo cutim frangant, & post se crustam relinquant. Materia horum multiplex est: magna tamen ex parte ex lixivio, ex quo sapo fit, conficiuntur, in qua aqua calx viua maceratur, vitreolum, sublimatum, auripigmentum, alumen, sal nitrum & similia. Patatur vulgo hoc pacto:

℞. Aq. stillatitiæ ex calce & cinere, ex qua fiunt saponēs nigri q. s. indatur vasi vitreo: bulliant,

ant, donec ad mellis consistentiam peruenerint, auferatur ab igne, vbi refrigeratum fuerit, lapidescat, quod in frustra ruptum vitro angustissimi oris indatur, quod cera diligenter obturetur, & loco sicco refer uetur.

hanc medicamentum liquefcit. Aqua autem siue lixiuium prædictum, quod capitellum chyrurgi vocant, sic paratur:

℞. Calcis viuae, salis ammoniaci, an. ℥. i.

tritæ indantur lixiuium. Deinde simul indantur ollæ perforatæ in fundo, cui aliud subiiciatur, in quod lixiuium paulatim defluat & excipiat. Vas vtrumque per septem dies defodi debet in fimo. Ex hoc lixiuium addito seuo aut adipe fit sapo.

Efficacius erit capitellum, si ad parandum lixiuium cum scapis fabaceis radices bryoniæ, cyclamini quoque vrantur. Quod si vero opium addere velimus, vt nonnulli faciunt, quo minor dolor causetur, tum hoc pacto parabitur:

℞. Lixiui prædicti ℥. j.

bulliat ad consumptionem tertiæ partis, adde calcis viuæ. ℥. ℞.

opii ℥. ii.

coquantur rursus, tum adde auripigmenti ℥. ii.

fiat massa.

Vel hoc pacto:

℞. Aquæ primæ saponis ℥. i. ℞.

vitrioli, nitri, salis ammoniaci an. ℥. ℞.

dissoluenda dissoluentur in lixiuium prædicto, coquantur in testa ad luti consistentiam.

T

Dein-

Deinde adde opii gr. vi.
coquantur denuo, quoad lapidescat. Effracta
olla lapilli formentur inde.

Citissime operabitur hoc modo paratum:

℞. Sublimati ℥ ii. ℞.
lapid. hematid. ℥ ℞.
opii gr. v.
vnguenti populeonis ℥ iij. misce fiat vn-
guentum.

Aliud, quo Chirurgi Patauini vtuntur com-
muniter:

℞. Lixiui cinerum quorumuis, calcis viua,
an. ℔ i.
calchanti ℥ iij.
bulliant ad consistentiam, addendo in fine
opii thebaici ℥ i.
coquantur, donec in lapidis formam indu-
rentur,

quem lapidem aliqui infernalem vocare solent.

Aliud

℞. Calcis viua recentis ℔ i. ℞.
sinerum clauellatarum ℔ j.
ponantur in olla vitreata, dissolue omnia in
duab. mensuris lixiui barbitonsoris, &
olla diligenter cooperiatur, bulliant simul
omnia, mediocri ebullitione, auferatur ab
igne, stet per quatuor aut quinque dies in
olla bene tecta. Postea accipe capitelli clari
mediam partem, pone in patellam ferream,
& bulliat, quousque incipiat inspisci.
dein aufer patellam ab igne, & capitelli
clari partem aliam impone, & iterum
bulli-

bulliant ad inspissationem & exiccationem, tunc lapides induratos in patella inuenies, quos vitro indes, & diligenter obturabis.

Aliud.

℥. Calcis viue partes ii.
minii partem i.
puluerizentur simul, & cum sapone fullon.
q.s. misce, globulos efforma.

huiusmodi sunt cauteria potentialia, quæ tamen non sunt antiquorum cauteria, sed ruptoria.

Vsus multiplex, præcipuus tamen ad materias auertendas & euacuandas, & abscessus aperiendos. Materiam diuertimus à parte nobiliore ad ignobiliorem trahendo, quod fieri consuevit in diuturnis catarrhis à capite delabentibus, vel in oculis, nasos, aures, pulmones. Abscessus vero siue bubones in membris his aperiuntur, in iis, qui vel ignem vel ferrum metuunt. Quod si vero applicare velimus, primo totum corpus euacuandum, ne impetu humor in partem labatur, vel inflammatio excitetur. Secundo cauendum, ne parti nobiliori vel applicemus, vt si capiti, cauendum est ab omnibus futuris. Quinetiam cauere oportet à membro exquisito sensu prædito.

Quod si vero diuersionis gratia applicentur, locus aptus eligendus. Et si à capite longius derivare velimus, tibiam eligendam. Si magis propinque, brachia. Si propinquius, ipsam ceruicem. Hæc enim tria sunt loca, quibus communiter applicari consueuere.

Locus autem conueniens in ceruice quidem

T 2 est

est in nucha, in brachiis vero quatuor digitis infra caput humeri parte interiore, inter duos musculos, quod ex cavitare deprehenditur. In ipsis vero cruribus, quatuor digitis transuersis infra genu, parte potissimum externa. Semper autem capita musculorum, venas, arterias, & nervos præsertim maiores præcauere oportet, alias hæmorrhagia, dolor & conuulsio causari posset.

Quod si vero abscessus seu bubones aperiendi, locus decliuior eligendus, quo facta apertione sanies commode effluere possit.

Loco cognito vt commodius applicari possit, pili amouendi sunt, dein locus atramento notandus, mox ad defensionem vicinarum partium emplastrum ex tripharmaco, vel emplastro contra rupturam applicandum, quod in medio ad magnitudinem pisi perforatum sit, postmodum pyroticum magnitudine pisi imponendum, parte tamen detecta prius salua humectata. Denique aliud emplastrum superponendum, & etiam splenium, seu charta luforia duplicata, compressionis gratia, & fascia circumiicienda. Sic relinquendum, donec medicamentum operetur, quod communiter horis iii, aut iiii, prout delicatiora sunt corpora, absoluitur.

Tempore hoc elapso, remouenda omnia, & eschara siue crusta leuiter incidenda. Dein laxantia medicamenta applicanda, vt est butyrum recens, vel pinguedo gallinæ, imponendo folium brassicæ, vel quod præstantius est, emplastrum diapalma, bis in die renouandum, vsque dum eschara circulum efficiat inter ipsam & carnem sanam.

sanam. Quod si bis eschara non recedat, cataplasma tale paratur:

℞. Rad. alth. ℥.ij.

herbar. malua. m. j.

flor. chamomel. meliloti an. p. j.

coquantur in sufficiente quantitate aquae, terantur, cribro transmittantur, deinde

adde farinae fœnogr. lini, lupinor. an. ℥. j.

iterum ad crassitiem coctis adde olei chamomelini, anethini, rosac. an. ℥. j. β.

axungia & adipis gallin. an. ℥. j. misce, fiat cataplasma.

Eschara elapsa, imo etiam antequam excidat, intra foueam, quæ proprie fontanella dicitur, vel fonticulus (ne rursus carne subcrecente repleatur) pisum vel granum ciceris, vel medullam sambuci, vel spongiolam indere oportet, & id non tantum, ut retineatur locus apertus, sed ut & humorem imbibat, & alliciat. Alii pilulam ceream intrudunt. Minus vero recte ii, qui pilula buxea vel argentea utuntur, cum his alteri tantum scopo satis fiat. Hæc quotidie bis, mane & vespere remouenda, locus abstergendus & piso indito hederæ folium, vel paruum emplastrum ex diapalma superaddendum. Quod si vero caro increscens pisum extrudat, tunc pilula ex cera & pipere confecta indenda. Si vero vlcus maius sit, quam necessum, pilula minor indenda, & pulvis exiccans aspergendus. At si fœteat fontanella, tunc liteolum in aq. rosarum madefactum, in quo granum vnum vel alterum moschi dissolutum, vel pisum tantillum in ea humectandum & imponendum.

Quod

Quod si vlcus putrescat, emplastra frigida leuiter exiccantia, vt est ceratum album & infrigidans Galeni, superponenda.

Si denique dolor succedat, dolorem mitigantibus & leuiter refrigerantibus & siccantibus vtendum, quale est linimentum simplex ex altera parte infrigidantis Galeni, & altera emplastri albi.

Seruantur fonticuli pro consilio Medici in vnum vel alterum annum; Aliquando toto vitæ tempore, præsertim vbi humores in pulmones delabuntur.

Quod si vero abscessus aliquis aperiatur, vt fit in bubonibus tam pestiferis, quam venereis, in delicatis, tunc remotis emplastris, eschara incidenda, vsque dum sanies effluat, remota eschara vlcus purgandum, & ex arte curandum erit.

Hæc ad DEI opt. max. laudem, proximi vtilitatem, & gratiam iuniorum dicta sunt. Vni trino sit laus, honor & gloria in æternum.

F I N I S.

frigidula leuiter
de infirmitatibus

rem mitigan-
tibus v.
plex ex altera
era amplius

Medici in v-
do toto vire
pulmones de-

riantur, vi. fu-
venesset, in
schara inci-
er afflicta

praxim v-
lura. Vni-
uo

